

FUNGICIDA

GRUPO 3
GRUPO 11

ATANOR PROTIOCONAZOLE+AZOXISTROBINA 17,5 + 16 SC

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

protioconazole: (RS)-2-[2-(1-clorociclopropil)-3-(2-clorofenil)-2-hidroxipropil]-2,4-dihidro-1,2,4-triazol-3-iona.....	17,5 g
azoxistrobina: metil (E)-2-{2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-iloxi]fenil}-3-metoxiacrilato.....	16 g
coadyuvantes y solvente c.s.p.....	100 cm ³

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

Inscrito en el SENASA con el 41.278

Lote N°: Ver en el envase

Vencimiento: ver en el envase

NO INFLAMABLE

INDUSTRIA ARGENTINA

Contenido Neto:

ATANOR S.C.A.

Colectora panamericana 1804, Villa Adelina, Buenos Aires (1607)

Tel. 011 4721-3400 – Fax: 011 4721-3480

www.albaughllc.com/ar

AVISO DE RESPONSABILIDAD LEGAL: ATANOR S.C.A. no se responsabiliza por los efectos y/o resultados que deriven de no haberse ajustado estrictamente a las especificaciones del presente rótulo.

Banda de categoría toxicológica: verde Pantone 347C.



CUIDADO



CASA CENTRAL Edificios Lumina Thames

Domicilio comercial, fiscal y legal.

Colectora Panamericana 1804
Sector Sur - Torre B - Piso 2°
Villa Adelina, Bs As - Código postal 1607
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721 - 3400/7400

PLANTA PILAR

Colle 3 y 8 - (1629)
Parque industrial Pilar- Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/n° y Avda. Savio
- (5850) Río III - Córdoba
TE: -54 (3571) 42 - 1400/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
+ (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442 - 3848/3878/4631/2743

RECOMENDACIONES DE USO

GENERALIDADES DEL PRODUCTO:

ATANOR PROTIOCONAZOLE+AZOXISTROBINA 17,5 + 16 SC es un fungicida foliar de acción prolongada con efecto preventivo y curativo. Debido al mecanismo complementario de sus ingredientes activos, posee movimiento sistémico y mesostémico.

Protioconazole tiene acción sistémica y de contacto, actúa en forma preventiva, y principalmente curativa y erradicante. Azoxistrobina posee actividad mesostémica y sistémica. Es de acción preventiva, curativa y antiesporulante, y es particularmente activo sobre la germinación de esporas y el desarrollo inicial del hongo.

El producto otorga una prolongada persistencia de acción y reduce el riesgo de resistencia. De todas formas, como práctica general de manejo de resistencia siempre es recomendable rotar el uso de este producto con otros fungicidas inscriptos que presenten un modo y/o sitio diferente de acción.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

PREPARACIÓN: Agitar el envase antes de usar y respetar las siguientes instrucciones:

- Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen. Poner a funcionar el sistema de agitación. Antes de abrir el envase de **ATANOR PROTIOCONAZOLE+AZOXISTROBINA 17,5 + 16 SC**, invertirlo lentamente varias veces, para obtener una suspensión homogénea.
- Añadir la cantidad necesaria de **ATANOR PROTIOCONAZOLE+AZOXISTROBINA 17,5 + 16 SC** de acuerdo con la calibración realizada, directamente al tanque y sin dilución previa. Verificar que el producto se disuelva completamente.
- Completar el volumen remanente de agua.
- Corroborar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la suspensión. Utilizar siempre agua limpia.

CASA CENTRAL Edificios Lumina Thames

Domicilio comercial, fiscal y legal.

Colectora Panamericana 1804
Sector Sur - Torre B - Piso 2º
Villa Adelina, Bs As - Código postal 1607
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721 - 3400/7400

PLANTA PILAR

Colle 3 y 8 - (1629)
Parque industrial Pilar- Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio
- (5850) Río III - Córdoba
TE: -54 (3571) 42 - 1400/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
+ (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442 - 3848/3878/4631/2743

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:

ATANOR PROTIOCONAZOLE+AZOXISTROBINA 17,5 + 16 SC puede ser aplicado con equipos pulverizadores convencionales de arrastre o autopropulsados siempre que estén provistos de un agitador mecánico. Efectuar una buena cobertura del follaje, hasta punto de goteo; para ello, se debe logra aplicar entre 50 y 70 gotas /cm²; empleando un volumen de agua mínimo de 100 litros por hectárea en aplicaciones terrestres y 20 litros de agua por hectárea en aplicaciones aéreas.

Se recomienda verificar el correcto funcionamiento del equipo previo a la aplicación y calibrarlo con agua sobre el mismo terreno en que se va a utilizar.

Suspender las aplicaciones con vientos superiores a 15 km/hora. Tampoco se debe aplicar el producto en cultivos bajo situaciones de estrés (sequía prolongada, baja fertilidad, heladas o bajas temperaturas, humedad relativa ambiente por debajo de 60%, temperaturas mayores a 25°C) para evitar efectos negativos sobre el cultivo.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDADES	DOSIS	RECOMENDACIONES
Maní	Viruela Temprana (<i>Cercospora arachidicola</i> Hori) Viruela Tardía (<i>Nothopassalora personata</i> , syn <i>Cercosporidium personatum</i>)	600-700 cm ³ /ha	Tratamiento foliar, aplicar al momento de las primeras manchas, repetir entre los 21 y 28 días. En años con condiciones predisponentes y alta presión de la enfermedad, puede reducirse el intervalo entre aplicaciones. No se recomienda aplicar en mezclas con aceites y/o herbicidas que necesiten aceite en su aplicación.
Soja	Mancha marrón (<i>Septoria glycines</i>) Mancha Púrpura de la semilla (<i>Cercospora kikuchi</i>) Roya asiática de la soja (<i>Phakopsora pachyrhizi</i>)	300-400 cm ³ /ha	Aplicar desde R3 (inicio de formación de vainas) y hasta R5.5, cuando se observen los primeros síntomas, en función de los umbrales existentes para cada enfermedad y con condiciones ambientales favorables para el desarrollo de las mismas, Para <i>Cercospora</i> y <i>Septoria</i> , es especialmente importante la ocurrencia de lluvias mayores a 7 mm y una acumulación de al menos 20/30 mm desde R3. No se recomienda aplicar en condiciones de

CASA CENTRAL Edificios Lumina Thames

Domicilio comercial, fiscal y legal.

Colectora Panamericana 1804
Sector Sur - Torre B - Piso 2º
Villa Adelina, Bs As - Código postal 1607
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721 - 3400/7400

PLANTA PILAR

Colle 3 y 8 - (1629)
Parque industrial Pilar- Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio
- (5850) Río III - Córdoba
TE: -54 (3571) 42 - 1400/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
+ (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442 - 3848/3878/4631/2743

			stress hídrico del cultivo y aguardar el umbral hídrico mencionado.
--	--	--	---

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDADES	DOSIS	RECOMENDACIONES
Trigo	Mancha amarilla (<i>Dreschlera tritici-repentis</i>) Roya anaranjada (<i>Puccinia triticina</i>) Septoriosis de la hoja (<i>Septoria tritici</i>)		<p><u>En trigo:</u> Se recomienda aplicar con hasta 5% de incidencia foliar en roya de la hoja y 20% de incidencia para manchas foliares a partir de fin de macollaje - inicio de encañazon.</p> <p><u>En cebada:</u> Se aconseja aplicar con un 20% de incidencia foliar a partir de fin de macollaje.</p>
Cebada	Mancha en red (<i>Dreschlera teres</i>) Roya de la hoja (<i>Puccinia hordei</i>) Escaldadura (<i>Rhynchosporium secalis</i>) Mancha borrosa (<i>Bipolaris sorokiniana</i>) Ramularia o salpicado necrotico de la cebada (<i>Ramularia collo-cygnis</i>)	500-700 cm3/ha	<p>Utilizar la dosis de 500 cc/ ha ante menor presión o riesgo de las enfermedades, aplicaciones ante la aparición de los primeros síntomas, cultivares más tolerantes y condiciones climáticas no tan favorables para el desarrollo de las enfermedades.</p> <p>Utilizar la dosis de 600 cc/ ha ante presiones intermedias de las enfermedades, aplicaciones ante la aparición de los primeros síntomas, cultivares moderadamente susceptibles y condiciones climáticas favorables para el desarrollo de las enfermedades.</p> <p>Utilizar la dosis de 700 cc/ ha en aquellos casos que presenten condiciones de presión alta de las enfermedades, aplicaciones ante la aparición de los primeros síntomas con condiciones de alto potencial de rendimiento, cultivares altamente susceptibles y condiciones climáticas muy favorables para el desarrollo de las enfermedades.</p>

CASA CENTRAL Edificios Lumina Thames

Domicilio comercial, fiscal y legal.

Colectora Panamericana 1804
Sector Sur - Torre B - Piso 2º
Villa Adelina, Bs As - Código postal 1607
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721 - 3400/7400

PLANTA PILAR

Colle 3 y 8 - (1629)
Parque industrial Pilar- Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio
- (5850) Rio III - Córdoba
TE: -54 (3571) 42 - 1400/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
+ (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442 - 3848/3878/4631/2743

CULTIVO	ENFERMEDADES	DOSIS	RECOMENDACIONES
Maíz	Roya común (<i>Puccinia sorghi</i>)	700 cm ³ /ha	Con factores de mayor riesgo como ser, en lotes de siembra temprana, con híbridos susceptibles a Roya Común y ambientes frescos, se aconseja aplicar en VT – R1, contando entre 5 y 8 pústulas promedio de la Hoja de la espiga (He), He+1 y He-1. También, se puede aplicar en estado vegetativo si se cuentan 8 pústulas promedio en todas las hojas, con las condiciones mencionadas anteriormente.
	Tizón foliar (<i>Exserohilum turcicum</i>)		Con factores de mayor riesgo como ser, en lotes de siembra tardía, con híbridos susceptibles a Tizón foliar, bajo siembra directa, monocultivo de maíz, y sin déficit hídrico, se aconseja aplicar desde V8 cuando el promedio de la mancha del tizón entre la Hoja de la espiga (He), He+1 y He-1, mide más de 1 cm de longitud (UDA, Umbral de Acción).

En Trigo, Cebada, Soja y Maíz: Aplicar con agregado de coadyuvante a dosis de marbete.

CASA CENTRAL Edificios Lumina Thames

Domicilio comercial, fiscal y legal.

Colectora Panamericana 1804
Sector Sur - Torre B - Piso 2º
Villa Adelina, Bs As - Código postal 1607
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721 - 3400/7400

PLANTA PILAR

Colle 3 y 8 - (1629)
Parque industrial Pilar- Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio
- (5850) Río III - Córdoba
TE: -54 (3571) 42 - 1400/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
+ (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442 - 3848/3878/4631/2743

RESTRICCIONES DE USO

Período de carencia:

Entre la última aplicación y la cosecha, deben dejarse transcurrir 15 días, para maní; 30 días para trigo, cebada y soja; 60 días para maíz.

En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Tiempo de reingreso al área tratada:

No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas. Se recomienda esperar un mínimo de 4 horas para ingresar al sector tratado sin equipo de protección personal.

Prevención y manejo de resistencias:

Dado que las aplicaciones de fungicidas efectuadas de forma incorrecta o repetida dan a lugar a procesos de resistencia de estos productos, es importante evitar la aplicación de los productos en forma aislada. Se recomienda que cuando por necesidad, se tenga que repetir la aplicación, se realice con otros productos y/o mezclas de diferentes modos/sitios de acción. Si se observa reducción en la eficacia de un fungicida, reservar este producto para ser utilizado en mezclas o en alternancia con otros más efectivos. Nunca bajar las dosis propuestas, ni aplicar en momentos no recomendados. Tener en cuenta además que la aplicación de fungicidas no es la única herramienta para el manejo de las enfermedades en el cultivo, se necesita también el uso de variedades resistentes o tolerantes, buenas prácticas agrícolas, higiene de los equipos utilizados, tratamiento de semillas, rotación de cultivos, etc.

COMPATIBILIDAD

ATANOR PROTIOCONAZOLE+AZOXISTROBINA 17,5 + 16 SC es compatible con un amplio rango de productos usados en agricultura, incluyendo insecticidas, fungicidas y fertilizantes. Sin embargo, como no existe información de compatibilidad biológica o química para cada mezcla en particular, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa en pequeña escala, antes de utilizar cualquier tipo de mezcla a campo.

CASA CENTRAL Edificios Lumina Thames

Domicilio comercial, fiscal y legal.

Colectora Panamericana 1804
Sector Sur - Torre B - Piso 2º
Villa Adelina, Bs As - Código postal 1607
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721 - 3400/7400

PLANTA PILAR

Colle 3 y 8 - (1629)
Parque industrial Pilar- Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio
- (5850) Río III - Córdoba
TE: -54 (3571) 42 - 1400/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
+ (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442 - 3848/3878/4631/2743

FITOTOXICIDAD

ATANOR PROTIOCONAZOLE+AZOXISTROBINA 17,5 + 16 SC no es fitotóxico en los cultivos que se recomienda, si se utiliza de acuerdo con las indicaciones de la etiqueta.

En el cultivo de maní, bajo determinadas condiciones climáticas, y en mezclas de tanque con graminicidas y aceites, se pueden observar síntomas de fitotoxicidad, por lo que no se recomienda su mezcla. Separar las aplicaciones de fungicidas y herbicidas.

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CASA CENTRAL *Edificios Lumina Thames*

Domicilio comercial, fiscal y legal.

Colectora Panamericana 1804
Sector Sur - Torre B - Piso 2º
Villa Adelina, Bs As - Código postal 1607
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721 - 3400/7400

PLANTA PILAR

Calles 3 y 8 - (1629)
Parque industrial Pilar- Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio
- (5850) Río III - Córdoba
TE: -54 (3571) 42 - 1400/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
+ (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442 - 3848/3878/4631/2743

PRECAUCIONES

- **MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.**
- **NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.**
- **INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS**
- **EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.**
- **EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES**
- **PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.**

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:

Evitar su inhalación, el contacto con la piel, los ojos y la vestimenta. Utilizar durante la aplicación careta, antiparras, guantes y botas de goma. Usar ropa adecuada procurando que la misma esté siempre limpia, evitando emplear la que se hubiera contaminado por uso anterior, sin previo lavado cuidadoso. Finalizados los tratamientos, lavarse prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto. No pulverizar contra el viento. No fumar, comer o beber durante la aplicación. Evitar la contaminación del agua de riego y de uso doméstico. No destapar con la boca los picos obstruidos. Lavar prolijamente los utensilios empleados en la preparación del producto.

RIESGOS AMBIENTALES:

ABEJAS: Virtualmente no tóxico para abejas.

AVES: Prácticamente no tóxico para aves.

ORGANISMOS ACUÁTICOS: Ligeramente tóxico para peces: No contaminar fuentes de agua con el enjuague de los equipos de aplicación.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION:

Vacíe completamente los envases en el equipo de aplicación, efectuando un triple lavado con agua de estos. Los restos del caldo de aplicación o agua de lavado de los equipos no deben ser arrojados a fuentes de agua (canales, acequias, arroyos, etc.), deben ser aplicados en caminos de tierra alejados de centros poblados y del tránsito habitual de personas y animales.

CASA CENTRAL Edificios Lumina Thames

Domicilio comercial, fiscal y legal.

Colectora Panamericana 1804
Sector Sur - Torre B - Piso 2º
Villa Adelina, Bs As - Código postal 1607
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721 - 3400/7400

PLANTA PILAR

Colle 3 y 8 - (1629)
Parque industrial Pilar- Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio
- (5850) Río III - Córdoba
TE: -54 (3571) 42 - 1400/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
+ (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442 - 3848/3878/4631/2743

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACÍOS:

Los envases vacíos y demás desechos no pueden volverse a utilizar, ni enterrar, ni quemar a cielo abierto. Para bidones y botellas respetar las siguientes instrucciones: Realizar el Triple Lavado o lavado a presión según la Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Para el caso de envases que no pueden ser lavados como por ejemplo bolsas y envases de papel o cartón, inutilizarlos de la misma manera, perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases y bolsas inutilizadas deben enviarse a Centros de Acopio Transitorio más cercanos habilitados para su disposición final según la Ley Nacional N° 27.279, Decreto Reglamentario N° 134/18 y normativas provinciales específicas.”

ALMACENAMIENTO:

Mantener el producto en sus envases originales, bien cerrados y almacenados en lugares seguros, ventilados, frescos y alejados de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas. No almacenar en lugares habitados por personas o animales. No apilar o estibar más de tres envases.

DERRAMES:

Aislar el área y negar la entrada a personas que no sean necesarias, manteniéndolas fuera. Utilizar los elementos de protección personal recomendados para este producto. Evitar que el producto alcance corrientes o fuentes de agua. Hacer endicamientos de manera de confinar el derrame y proceder a absorberlo con una sustancia absorbente no combustible, como arena o tierra. Recoger o bombear los desperdicios en un tambor e identificarlo adecuadamente para su disposición final.

Recurra a empresas especializadas en disposición final de residuos peligrosos.

CASA CENTRAL Edificios Lumina Thames

Domicilio comercial, fiscal y legal.

Colectora Panamericana 1804
Sector Sur - Torre B - Piso 2º
Villa Adelina, Bs As - Código postal 1607
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721 - 3400/7400

PLANTA PILAR

Colle 3 y 8 - (1629)
Parque industrial Pilar- Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio
- (5850) Río III - Córdoba
TE: -54 (3571) 42 - 1400/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
+ (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442 - 3848/3878/4631/2743

PRIMEROS AUXILIOS:

En todos los casos, procurar asistencia médica inmediata y mostrar esta etiqueta al médico interviniente. Llamar a los teléfonos que figuran a continuación para la atención de emergencias. Mientras tanto, tomar las siguientes medidas de acuerdo a la vía de exposición:

En caso de inhalación: retirar a la persona afectada el aire fresco y requerir asistencia médica. Si es necesario, efectuarse respiración artificial.

En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón la superficie cutánea afectada y remover las ropas contaminadas.

En caso de contacto con ojos: lavar con abundante agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión: brindar asistencia médica de inmediato, llevando el marbete del envase, no administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

En todos los casos procurar asistencia médica y mostrar el envase con la etiqueta del producto.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:

PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO (CLASE IV).

Toxicidad inhalatoria: Categoría II (NOCIVO). Irritación dermal: No irritante dermal.

Categoría IV. Irritación ocular: Moderado irritante ocular (CUIDADO) Categoría III: Causa irritación moderada a los ojos. Sensibilización dermal: No sensibilizante.

Aplicar tratamiento sintomático y de sostén. Grupo químico: triazol, estrobirulina

SINTOMAS DE INTOXICACION AGUDA:

Malestar general, cefalea, enrojecimiento de piel, irritación bronquial.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No presenta.

CASA CENTRAL Edificios Lumina Thames

Domicilio comercial, fiscal y legal.

Colectora Panamericana 1804
Sector Sur - Torre B - Piso 2º
Villa Adelina, Bs As - Código postal 1607
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721 - 3400/7400

PLANTA PILAR

Colle 3 y 8 - (1629)
Parque industrial Pilar- Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio
- (5850) Río III - Córdoba
TE: -54 (3571) 42 - 1400/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
+ (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442 - 3848/3878/4631/2743

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES

CAPITAL FEDERAL: Unidad Toxicológica del Hospital de Niños de Bs. As Dr. Ricardo Gutiérrez: Sánchez de Bustamante 1399 (C1425DUA), Tel.: (011) 4962 2247/6666.

BUENOS AIRES: Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas: Av. Illía s/n, Palomar, Bs. As., Tel.: (011) 4469-9300 interno 1102. Línea gratuita: 0800-333-0160.

ROSARIO: Centro Toxicológico Permanente (durante todo el año, 24 horas por día). Tucumán 1544. Tel.: (0341) 448 0077 / 424 2727 o 0800 888 TOXI (8694).

CORDOBA: Hospital de Urgencias. Tel: (0351) 427-6200.

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA:

No se ha establecido la ocurrencia de procesos de potenciación, sinergismo o aditividad en mezcla con otros fitosanitarios.

CASA CENTRAL Edificios Lumina Thames

Domicilio comercial, fiscal y legal.

Colectora Panamericana 1804
Sector Sur - Torre B - Piso 2º
Villa Adelina, Bs As - Código postal 1607
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721 - 3400/7400

PLANTA PILAR

Colle 3 y 8 - (1629)
Parque industrial Pilar- Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio
- (5850) Río III - Córdoba
TE: -54 (3571) 42 - 1400/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
+ (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442 - 3848/3878/4631/2743