

Herbicida

Grupo 5

TRAC 50 FL

Suspensión concentrada (SC)

Composición:

atrazina: (2-cloro-4-etilamino-6-isopropilamino-triazina).....	50 g
agua y humectantes, c.s.p	100 ml

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

Inscrito ante el SENASA con el N° 30.228

Lote N°: ver en el envase

Contenido Neto: 20 L

Vencimiento: ver en el envase

INDUSTRIA ARGENTINA

NO INFLAMABLE

Colectora Panamericana 1804

Sector Sur - Torre B - Piso 2° Villa Adelina, Buenos Aires, 1607, Argentina

Tel: +54 11 4721-3400 www.albaugh.com.ar

AVISO DE RESPONSABILIDAD LEGAL: ATANOR S.C.A. no se responsabiliza por los efectos y/o resultados que deriven de no haberse ajustado estrictamente a las especificaciones del presente rótulo.



Banda toxicológica de color: amarillo Pantone.

Rev. 05

TRAC 50 FL

1 de 8

CASA CENTRAL
Edificios Lumina Thames

Domicilio comercial, fiscal y legal.

Colectora Panamericana 1804
Sector Sur - Torre B - Piso 2°
Villa Adelina, Bs As - Código postal 1607
Argentina. Tel: +54 (11) 4721 - 3400/7400

PLANTA PILAR

Calle 3 y 8 - (1629)
Parque industrial Pilar- Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/n° y Avda. Savio
- (5850) Rio III - Córdoba
TE: -54 (3571) 42 - 1400/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
+ (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442 - 3848/3878/4631/2743

GENERALIDADES DEL PRODUCTO

Herbicida selectivo que controla malezas de hoja ancha y gramíneas anuales en cultivos de caña de azúcar, maíz y sorgo granífero. Actúa por traslocación y tiene acción residual.

TRAC 50 FL es un herbicida a base de Atrazina que presenta las siguientes ventajas:

- No requiere pre-mezcla debiéndose agregar solamente agua, aplicándose con pulverizadores comunes en herbicidas.
- Es absorbido principalmente por las raíces y también penetra a través de las hojas traslocándose por el interior de las plantas.
- No es volátil, evitándose daños en cultivos susceptibles.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

PREPARACIÓN: **TRAC 50 FL** esta formulado como suspensión concentrada. Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:

- Agitar el envase siempre, antes de usar.
- Llenar el tanque del equipo pulverizador hasta la mitad o las tres cuartas partes de su volumen con agua limpia o filtrada.
- Agregar la dosis de **TRAC 50 FL**.
- Verter el preparado en el tanque de la pulverizadora, ya cargado con agua.
- Completar el tanque con agua hasta el volumen final.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:

Tratamientos Terrestres: **TRAC 50 FL** puede aplicarse en cobertura total sobre toda la superficie cultivada o bien en tratamientos en bandas centradas en las líneas de siembra y con un ancho variable según cultivo, significando una importante economía de producto. En los espacios no tratados deben controlarse mecánicamente las malezas.

a) Tratamientos en cobertura total. Caudal no inferior a 80 l/ha. Presión 1,7 0a 3,00 Kg/cm². Pastillas abanico plano.

b) Tratamiento en bandas. Conforme al ancho de la banda tratada de 0,30 m a 1,00 m. Caudal no inferior a 30 l/ha.

Tratamientos aéreos: debe aplicarse con un volumen de agua no menor a 3 litros por cada litro de producto a aplicar. El volumen mínimo a aplicar (producto en agua) será no inferior a 20 l/ha.

Rev. 05

TRAC 50 FL

2 de 8

CASA CENTRAL
Edificios Lumina Thames

Domicilio comercial, fiscal y legal.

Colectora Panamericana 1804
Sector Sur - Torre B - Piso 2º
Villa Adelina, Bs As - Código postal 1607
Argentina. Tel: +54 (11) 4721 - 3400/7400

PLANTA PILAR

Calle 3 y 8 - (1629)
Parque industrial Pilar- Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio
- (5850) Río III - Córdoba
TE: -54 (3571) 42 - 1400/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
+ (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442 - 3848/3878/4631/2743

En los tratamientos terrestres y aéreos se debe lograr una cobertura de 30-40 gotas/cm².

Se sugiere aplicar con condiciones ambientales adecuadas: velocidad del viento menor a 15 km/h (y mayor a 4 km/h para lograr mejor penetración y cobertura del blanco), temperatura menor a 30°C y con valores del ΔT entre 2 y 8. Trabajar con la mínima altura de botallon compatible con una buena uniformidad y calidad de aplicación, que no comprometa la exoderiva en función a las condiciones climáticas vigentes al momento de aplicación. No aplicar ante riesgo de inversión térmica. Se sugiere no pulverizar cuando no se pueda asegurar la mitigación de la exoderiva, cuando el viento sople hacia cursos de agua y/o en cercanía de áreas residenciales. Cumplir con las regulaciones provinciales y/o municipales sobre áreas de no aplicación y buffer (amortiguación).

RECOMENDACIONES DE USO:

MALEZAS QUE CONTROLA:

Abrojo (*Xanthium cavanillesi*), **Alfilerillo** (*Erodium cicutarium*), **Bolsa de pastor** (*Capsella bursa-pastoris*), **Caapiqui** (*Stellaria media*), **Cardo blanco** (*Silybum marianum*), **Cardo ruso** (*Salsola kali*), **Cepa caballo** (*Xanthium spinosum*), **Cerraja** (*Sonchus oleraceus*), **Cola de zorro** (*Setaria spp.*), **Chamico** (*Datura ferox*), **Equinocloa** (*Equinocloa spp.*), **Enredadera anual** (*Polygonum convolvulus*), **Gramilla dulce** (*Paspalum distichum*), **Gramma rodes** (*Chloris gayana*), **Lengua de vaca** (*Rumex crispus*), **Lecherón** (*Euphorbia dentata*), **Lupulina o Trébol** (*Medicago lupulina*), **Malva** (*Anoda cristata*), **Manzanilla** (*Anthemis cotula*), **Mastuerzo** (*Coronopus didymus*), **Nabo** (*Brassica spp.*), **Ortiga** (*Urtica urens*), **Pasto de invierno** (*Poa annua*), **Perejillo** (*Bowlesia incana*), **Quinoa o Avaja** (*Chenopodium spp.*), **Revienta caballo o Pocotillo** (*Solanum eleagnifolium*), **Sanguinari o Cien nudos** (*Polygonum aviculare*), **Verdolaga** (*Portulaca oleracea*), **Yuyo colorado o Ataco** (*Amaranthus spp.*), **Zapalla amargo** (*Curcubita andreana*).

MOMENTO DE APLICACIÓN

a) Pre-siembra: Preparar previamente el terreno para la siembra bien roturado y libre de malezas aplicando desde 15 días antes y hasta el momento previo a sembrar, incorporar **TRAC 50 FL** de 3 a 5 cm de profundidad utilizando rastras rotativas (2) cruzadas.

b) Pre-emergencia: Aplicar **TRAC 50 FL** luego de la siembra y previa aparición de las malezas, preferiblemente sobre terreno húmedo, antes o después de una lluvia o riego.

c) Post-emergencia temprana: La aplicación de **TRAC 50 FL** debe realizarse sobre malezas pequeñas, antes que las latifoliadas tengan no más de 3 a 5 hojas y las gramíneas no más de 1 a 2 hojas. En todos los casos debe moverse el suelo tratado lo menos posible para evitar que el herbicida pierda su eficacia al ser cubierto por tierra sin tratar.

Rev. 05

TRAC 50 FL

3 de 8

CASA CENTRAL
Edificios Lumina Thames

Domicilio comercial, fiscal y legal.

Colectora Panamericana 1804
Sector Sur - Torre B - Piso 2º
Villa Adelina, Bs As - Código postal 1607
Argentina. Tel: +54 (11) 4721 - 3400/7400

PLANTA PILAR

Calle 3 y 8 - (1629)
Parque industrial Pilar- Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio
- (5850) Río III - Córdoba
TE: -54 (3571) 42 - 1400/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
+ (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442 - 3848/3878/4631/2743



*MAIZ

TRATAMIENTO	Dosis: l/ha según el tipo de suelo					
	LIVIANO		MEDIO		PESADO	
	Total	Banda*	Total	Banda*	Total	Banda*
Pre-Siembra	4,0	-	5,0	-	5,0	-
Pre-Emergencia	3,2	2,0	4,0	2,5	5,0	3,6
Post-Emergencia	4,0	-	4,0	-	4,0	-

Zona Maicera de buenos Aires y Santa Fe. En las siembras tempranas (septiembre) o épocas de escasas lluvias, realizar tratamiento de pre-siembra incorporando el herbicida. En siembras normales (fin de septiembre/octubre) aplicar en pre-emergencia. Logrando una cobertura de 20-30 gotas/cm².

*SORGO

TRATAMIENTO	Dosis: l/ha según el tipo de suelo	
	MEDIO	PESADO
Pre-Siembra	3,2	4,8
Pre-Emergencia	2,0-4,0	2,0-4,0

Efectuar aplicaciones preferentemente en pre-siembra incorporando **TRAC 50 FL** de 2 a 3 semanas antes de la siembra o en su defecto en post-emergencia temprana (cultivo 3-4 hojas). Siempre logrando una cobertura de 20-30 gotas/cm².

Recomendamos precaución en aplicaciones de pre-emergencia luego de sembrar y cuando esta coincide con bajas temperaturas y precipitaciones abundantes, puesto que puede presentarse fitotoxicidad, sobre todo en suelos livianos.

* Banda de 35 cm.

** CAÑA DE AZUCAR

TRATAMIENTO	Dosis: l/ha según el tipo de suelo			
	MEDIO		PESADO	
	Total	Banda*	Total	Banda*
Caña Planta o Soca	6,0	40,0 (ml)	8,0	40,0 (ml)

** Banda de 70 cm por surco de 100 m de largo.

Pre-emergencia después de un riego o una lluvia.

Postemergencia de los brotes hasta que las malezas latifoliadas tengan 1 a 2 hojas.

Rev. 05

TRAC 50 FL

4 de 8

CASA CENTRAL
Edificios Lumina Thames

Domicilio comercial, fiscal y legal.

Colectora Panamericana 1804
Sector Sur - Torre B - Piso 2º
Villa Adelina, Bs As - Código postal 1607
Argentina. Tel: +54 (11) 4721 - 3400/7400

PLANTA PILAR

Calle 3 y 8 - (1629)
Parque industrial Pilar- Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio
- (5850) Río III - Córdoba
TE: -54 (3571) 42 - 1400/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
+ (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442 - 3848/3878/4631/2743

RESTRICCIONES DE USO

Período de carencia: Para todos los cultivos recomendados en esta etiqueta, entre la última aplicación y la cosecha deberán transcurrir 45 días.

En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Rotaciones: En campos con cultivos tratados con dosis superiores a 4 litros/ha, se recomienda volver a cultivar solamente sorgo o maíz. Cuando la dosis empleada ha sido menor a 4 litros/ha, deberán transcurrir entre 4-6 meses antes de implantar cualquier otro cultivo distinto a los indicados.

Tiempo de reingreso al área tratada: 24 horas.

COMPATIBILIDAD:

Sólo realice mezclas de tanque autorizadas, respetando el orden de mezcla que evite incompatibilidades físicas y/o químicas

Siempre se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa a la mezcla en el tanque, ya que las dosis utilizadas, el número de productos, el uso de coadyuvantes y la calidad de agua influyen en la probabilidad de formación de precipitados.

FITOTOXICIDAD:

No se observará si se respetan las condiciones de aplicación de este marbete.

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO.

Rev. 05

CASA CENTRAL
Edificios Lumina Thames

Domicilio comercial, fiscal y legal.

Colectora Panamericana 1804
Sector Sur - Torre B - Piso 2º
Villa Adelina, Bs As - Código postal 1607
Argentina. Tel: +54 (11) 4721 - 3400/7400

TRAC 50 FL

5 de 8

PLANTA PILAR

Calle 3 y 8 - (1629)
Parque industrial Pilar- Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio
- (5850) Río III - Córdoba
TE: -54 (3571) 42 - 1400/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
+ (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442 - 3848/3878/4631/2743

PRECAUCIONES:

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
- PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:

Se recomienda, durante la preparación y aplicación, usar ropa y elementos de protección adecuados para el uso seguro de productos fitosanitarios. Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. No aspirar las gotas de la aspersión. Lavarse bien con abundante agua y jabón después de manipular el producto. Mantenerlo alejado del alcance del calor o de la llama. No fumar, beber ni comer en el área de trabajo. La ropa usada durante estas operaciones debe ser lavada separadamente de otras prendas. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

RIESGOS AMBIENTALES:

TOXICIDAD PARA ABEJAS: virtualmente no toxico.

TOXICIDAD PARA AVES: prácticamente no toxico.

TOXICIDAD PARA PECES: ligeramente toxico. Evite la contaminación del agua de riego o de uso doméstico.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION:

Los envases deben enjuagarse por lo menos tres veces, volcando el líquido del enjuague dentro de la pulverizadora. Los restos del caldo de aplicación o agua de lavado de los equipos no deben ser arrojados a fuentes de agua (canales, acequias, arroyos, etc.), se deben asperjar sobre el lote donde se está realizando el tratamiento.

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS:

Agregar hasta 1/4 de agua en el envase, sacudir enérgicamente y verter el contenido en el tanque pulverizador, repetir esta operación tres (3) veces. Luego, inutilizar el envase para evitar su uso con otro destino y proceder de acuerdo a la normativa vigente en cada localidad.

Rev. 05

TRAC 50 FL

6 de 8

CASA CENTRAL
Edificios Lumina Thames

Domicilio comercial, fiscal y legal.

Colectora Panamericana 1804
Sector Sur - Torre B - Piso 2º
Villa Adelina, Bs As - Código postal 1607
Argentina. Tel: +54 (11) 4721 - 3400/7400

PLANTA PILAR

Calle 3 y 8 - (1629)
Parque industrial Pilar- Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio
- (5850) Rio III - Córdoba
TE: -54 (3571) 42 - 1400/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
+ (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442 - 3848/3878/4631/2743

LAVADO DE EQUIPOS:

Para el enjuague- lavado interno y externo del equipo de aplicación utilizado, una vez terminada la misma, debe utilizarse en todo momento el equipo personal de protección (EPP) adecuado según el riesgo.

Respetar las siguientes instrucciones:

Vaciar completamente el equipo. Enjuagar el tanque, mangueras y picos con agua limpia. De estar disponible, usar una lavadora a presión para limpiar el interior del tanque. Llenar el tanque hasta 1/4 de su capacidad con agua limpia. Poner en marcha el sistema de agitación y hacer recircular el agua por al menos 15 minutos. Todos los remanentes visibles deben ser eliminados del equipo de aplicación antes de un nuevo uso, ya que podrían producirse efectos no deseados en los cultivos u áreas tratadas posteriormente. Retirar los picos y pastillas y lavarlos separadamente, después de realizar los pasos precedentes. Eliminar el líquido utilizado en sitios donde no exista riesgo de contaminación de aguas superficiales ni subterráneas.

ALMACENAMIENTO:

Los fitosanitarios no son indefinidamente estables. Se aconseja el almacenamiento de los envases originales cerrados, en un lugar seco y fresco, al abrigo de la luz directa o de fuentes de calor, humedad, etc.; en lugares que mantengan la temperatura entre 0° y 35°C.

DERRAMES:

Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Recolectar el producto absorbido en bolsas o recipientes bien rotulados para su posterior destrucción en empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua del lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano o animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Rev. 05

TRAC 50 FL

7 de 8

CASA CENTRAL
Edificios Lumina Thames

Domicilio comercial, fiscal y legal.

Colectora Panamericana 1804
Sector Sur - Torre B - Piso 2°
Villa Adelina, Bs As - Código postal 1607
Argentina. Tel: +54 (11) 4721 - 3400/7400

PLANTA PILAR

Calle 3 y 8 - (1629)
Parque industrial Pilar- Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/n° y Avda. Savio
- (5850) Río III - Córdoba
TE: -54 (3571) 42 - 1400/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
+ (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442 - 3848/3878/4631/2743

PRIMEROS AUXILIOS:

Si hubo contaminación, quitarse la ropa y lavar bien la piel con agua y jabón. Por salpicaduras en piel, enjuagar con abundante agua y jabón durante 15 minutos como mínimo.

En caso de inhalación: retirar a la persona afectada el aire fresco y requerir asistencia médica. Si es necesario, efectuarse respiración artificial.

En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón la superficie cutánea afectada y remover las ropas contaminadas.

En caso de contacto con ojos: lavar con abundante agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión: brindar asistencia médica de inmediato, llevando el marbete del envase, no administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

En todos los casos procurar asistencia médica y mostrar el envase con la etiqueta del producto.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: Clase toxicológica (OMS 2009): II - Moderadamente Peligroso. Categoría inhalatoria III (CUIDADO). No irritante Dermal. LEVE IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORÍA IV. Causa irritación moderada a los ojos. NO SENSIBILIZANTE DERMAL. No se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

SINTOMAS DE INTOXICACION AGUDA:

La ingestión puede ocasionar dolores abdominales, diarrea y vómitos.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES: Unidad Toxicológica del Hospital de Niños de Bs. As Dr. Ricardo Gutiérrez: Sánchez de Bustamante 1399 (C1425DUA), Tel.: (011) 4962 2247/6666.

BUENOS AIRES: Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas: Av. Illía s/n, Palomar, Bs. As., Tel.: (011) 4469-9300 interno 1102. Línea gratuita: 0800-333-0160.

ROSARIO: Centro Toxicológico Permanente (durante todo el año, 24 horas por día). Tucumán 1544. Tel.: (0341) 448 0077 / 424 2727 o 0800 888 TOXI (8694). **CORDOBA:** Hospital de Urgencias. Tel: (0351) 427-6200.

CORDOBA: Hospital de Urgencias. Tel: (0351) 427-6200.

Rev. 05

TRAC 50 FL

8 de 8

CASA CENTRAL
Edificios Lumina Thames

Domicilio comercial, fiscal y legal.

Colectora Panamericana 1804
Sector Sur - Torre B - Piso 2º
Villa Adelina, Bs As - Código postal 1607
Argentina. Tel: +54 (11) 4721 - 3400/7400

PLANTA PILAR

Calle 3 y 8 - (1629)
Parque industrial Pilar- Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-263/683/685

PLANTA RIO III

Paula A. de Sarmiento s/nº y Avda. Savio
- (5850) Río III - Córdoba
TE: -54 (3571) 42 - 1400/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS

Román Subiza 1150 (Ex-Rivadavia)
+ (2900) San Nicolás - Buenos Aires
TE: +54 (336) 442 - 3848/3878/4631/2743