

ALTITUD®

FUNGICIDA – Registro N°: 77 – F5/NA

Grupo Químico:	Strobilurin
Ingrediente Activo:	Azoxystrobin
Concentración:	250 gramos por litro
Formulación:	Suspensión Concentrada - SC
Cat. Toxicológica:	II Moderadamente Peligroso
Formulador:	JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTDA.
Objetivo Biológico:	Mildiu vellosa, Tizón Temprano, PC de corona en banano
Modo de acción:	<u>Azoxystrobin:</u> Fungicida sistémico; protectante curativo y antiesporulante.
Mecanismo de Acción:	<u>Azoxystrobin:</u> Actúa Inhibiendo la respiración mitocondrial, la germinación de las esporas y crecimiento micelial. ribosómico.

GENERALIDADES

ALTITUD® es un fungicida para el control de patógenos en muchos cultivos. La sistemía local lenta del azoxystrobin ejerce una mayor acción de control en la germinación de las esporas y en los estados iniciales de la infección, tiene una sistemía lenta, actúa más localmente, es translaminar algo acropétalo. Azoxystrobin tiene óptima eficacia cuando se lo aplica preventiva o tempranamente en la aparición de síntomas por su control a la germinación de esporas, ya que es muy activo en el control de la infestación, germinación e infección inicial, lo que genera un excelente control de estados iniciales de infección y esporulación. Se requiere un periodo sin lluvia entre 4 y 6 horas después de aplicación para un mejor efecto de la molécula.

RECOMENDACIONES DE USO

ALTITUD® puede ser utilizado mezclado con agua, aplicado a campo abierto o bajo invernadero, siguiendo las dosis de aplicación recomendadas en este documento.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Rosas: como preventivo o al inicio de síntomas de la enfermedad, con una frecuencia de 7 a 14 días en zonas de alta presión de la enfermedad. No exceder mas de 4 aplicaciones al año.
Banano: aplicar por una ocasión en postcosecha antes de empacar el producto. **Tomate:** aplicar como preventivo, con una frecuencia de 7, 14 días hasta 4 veces por ciclo de cultivo.
Uva: realizar una aplicación foliar cuando el cultivo se encuentre en estado vegetativo.



DOSIS POR CULTIVO

CULTIVO	OBJETIVO BIOLÓGICO	DOSIS	PERIODO DE CARENCIA
Rosa (<i>Rosa</i> sp.)	Mildiu veloso (<i>Peronospora sparsa</i>)	1,5 l/ha, (1ml/L)	N/A
Tomate hortícola (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	250 ml/l	21 días
Banano <i>Musa acuminata</i> AAA.	Pudrición de la corona en post-cosecha (<i>Fusarium</i> sp.)	1,2 ml/l de agua	0 días
Uva (<i>Vitis vinifera</i>)	Oidio (<i>Oidium</i> sp.)	0,36 L/ha	7 días

*Gasto de agua: en rosa 1200 l/ha, en tomate 200 l/ha. Uva suficiente para una cobertura uniforme

PERÍODO DE REINGRESO AL AREA TRATADA

Período de reingreso después de la aplicación: 24 horas después de aplicado.

COMPATIBILIDAD

ALTITUD[®] es compatible con la mayoría de insecticidas y Fungicidas del mercado, sin embargo, en caso de mezcla con productos en la que no se conozca su selectividad al cultivo y/o compatibilidad de mezcla, recomendamos bajo responsabilidad del usuario realizar una prueba a pequeña escala, antes de la aplicación comercial.

FITOTOXICIDAD

Usado a las dosis recomendadas en este documento no presenta ningún daño en el cultivo tratado.

ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONSERVAR ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.”

Elaborado por:
Departamento Técnico ROTAM ECUADOR.
2021.

