



# **IBEROSTAR<sup>®</sup>**

**FONGICIDE**

Fongicide grandes cultures - Prothioconazole 250 g/L EC



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRECAUTION AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT



# IBEROSTAR®

Fongicide grande cultures - Prothioconazole 250 g/L EC

## Matière active clé des programmes fongicides :

- Large spectre sur céréales
- Utilisable sur Céréales, crucifères oléagineuses, Lin
- Association possible avec de nombreux fongicides du marché

## Spectre d'efficacité

| BLÉS                 | ORGES             | CRUCIFÈRES       |
|----------------------|-------------------|------------------|
| Pétiot ver           | Rhynchosporiose   |                  |
| Oïdium               | Oïdium            | Cylindrosporiose |
| Septorioses          | Rouille naine     |                  |
| Rouille jaune        | Helminthosporiose | Sclerotiniose    |
| Rouille brune        | Grillures         |                  |
| Fusarium graminearum | Ramulariose       |                  |
| Microdochium sp      |                   |                  |

## DONNÉES RÉGLEMENTAIRES ET TABLEAU DES USAGES

N° AMM : 2210166

Composition : 250 g/L Prothioconazole

Formulation : EC (Concentré émulsionnable)

Famille Chimique : Triazoles (FRAC 3)

Mode d'action : Inhibition de la synthèse des stéroïdes

DRE : 24h

### Classement :

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.

H335 : Peut irriter les voies respiratoires.

H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EU401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

### ATTENTION



| Cultures                                                                                                                                 | Usage                                                              | Dose (L/ha) | Nb App. | Stades d'applications | DAR (j) | ZNT aqua (dont DVP) | ZNT Terr. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------|---------|---------------------|-----------|
| Avoine d'hiver et de printemps                                                                                                           | Pétiot Ver                                                         | 0,8         | 1/an    |                       | 35      | 5 m (5m)            | 5         |
|                                                                                                                                          | Rouille Couronnées & Oïdium                                        | 0,8         | 2/an    | 2° app après BBCH30   | 35      | 5 m (5m)            | 5         |
| Blé tendre d'hiver et de printemps, Blé dur d'hiver et de printemps, Triticale d'hiver et de printemps, Epeautre d'hiver et de printemps | Pétiot Ver                                                         | 0,8         | 1/an    |                       | 35      | 5 m (5m)            | 5         |
|                                                                                                                                          | Rouille(s), Oïdium, Septoriose & Fusariose                         | 0,8         | 2/an    | 2° app après BBCH30   | 35      | 5 m (5m)            | 5         |
| Orge d'hiver et de printemps                                                                                                             | Pétiot Ver                                                         | 0,8         | 1/an    |                       | 35      | 5 m (5m)            | 5         |
|                                                                                                                                          | Rhynchosporiose, Helminthosporioses, Ramulariose, Rouille & Oïdium | 0,8         | 2/an    | 2° app après BBCH30   | 35      | 5 m (5m)            | 5         |
| Seigle d'hiver et de printemps                                                                                                           | Rhynchosporiose & Rouilles                                         | 0,8         | 2/an    | 2° app après BBCH30   | 35      | 5 m (5m)            | 5         |
| Crucifères Oléagineuses: Bourrache, Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Moutarde, Navette, Sésame de printemps, Sésame d'hiver                | Cylindrosporiose et Sclerotiniose                                  | 0,7         | 2/an    | 2° app après BBCH20   | 56      | 5 m (5m)            | 5         |

P261 : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P312 : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. P337+P313 : Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. P391 : Recueillir le produit répandu. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux. SP 1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. SPe3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. En cas de ruissellement possible sur la parcelle traitée, prévoir un dispositif végétalisé non traité d'une largeur de 5 mètres par rapport aux points d'eau. SPe3 : Pour protéger les plantes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente.

Iberostar® AMM n°2210166. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi, se référer à l'étiquette du produit ou [www.phytodata.com](http://www.phytodata.com). Détenteur de l'AMM : ALBAUGH TKI d.o.o. Grajski trg 21, SI-2327 Race, Slovénie. Responsable de la mise en marché : ALBAUGH TKI d.o.o. Grajski trg 21, SI-2327 Race, Slovénie.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRECAUTION AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT

© 2025 Albaugh Europe. Albaugh, le logo Albaugh et les noms de produits sont des marques déposées® d'Albaugh, LLC. ou filiales. Avril 2025, V1.