

BOSFORUS GOLD Profenofos 40% + Cypermethrin 4% EC Insecticide

Chemical Composition : Profenofos a.i. : 40.00% w/w, Cypermethrin a.i. : 4.00% w/w, Caster Oil Poly glycol ether 36/40 grade : 9.75% w/w, Dodecyl Benzene sulfonic Acid calcium salt : 5.25% w/w, Soyabean Oil, Epoxy Resin : 10.00% w/w, Solvent O-X : 0.5 % **Net : 100.00% w/w. Directions for use:** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions :** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote :** 1. Atropineize the patient immediately and maintain full atropinization by repeated doses of 2 to 4 mg. of atropine sulphate intravenously at 5 to 10 minutes interval. As much as 25 to 50 mg. of atropine may be required in a day. The need for further atropine administration is guided by the continuance of symptoms. Extent of salivation is a use ful criterion for dose adjustment. 2. Dissolve 1-2 gm of 2 PAM in 10 ml distilled water and inject intravenously very slowly for 10-15 minutes. 3. Antihistamines may be given to control allergic manifestation. **First Aid :** Please see enclosed leaflet. **Symptoms:** Please see enclosed leaflet. **Recommendation :** It is used to control bollworm complex of Cotton crops. **Caution :** 1. Not to be used on crops and pests other than mentioned on label/leaflet. 2. Not to be used for post harvest application. 3. Destroy container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area-refer to the leaflet.

बोस्फोरस गोल्ड प्रोफेनोफॉस ४०% + साइपरमेथ्रिन ४% ई.सी. कीटनाशक

रासायनिक संरचना : प्रोफेनोफोस स तत्व : ४०.००% भार/भार, साइपरमेथ्रिन स तत्व : ४.००% भार/भार, अरंडी तेल वाली वाहनोस ईथर ३६/४० ग्रेड : ९.७५% भार/भार, डोडेकिल बेन्जीन सल्फोनेक एसिड कैल्शियम साइट : ५.२५% भार/भार, सोयाबीन तेल, एपॉक्सी रेजिन : १०.००% भार/भार, सॉल्वेंट सी-१ : ०.५% भार/भार, कुल : १००.००% भार/भार। **उपयोग के लिए निर्देश :** उपयोग से पहले संलग्न लिफाफे पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ :** १. खाद्यसमयों, खाद्य सामग्री के खाद्य भागों और पशुओं के घरे से दूर रहें। २. मुँह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचावें। ३. छिड़काव की वायु को संतुलित दूर अंतर जगह से बाहर। ४. हवा की स्थिति में छिड़काव करें। ५. छिड़काव के बाद त्वचा कपड़े के अलावा जो अस्त्रों तैयार रहें। ६. छिड़काव के समय पर्याप्त खाना, पानी और कुछ चबाना भी खाएँ। ७. छिड़काव करते या मिलते समय पूरा सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विषनाशक :** १. रोगी को तुरन्त एम्बिफेन सीरीज और इन्सुलीन के मिश्रण, एक की चुपकान ५ से १० मिनेट के अंतराल पर अम्ल शिथिल द्वारा व्यापार की तरफ हटा दें। एम्बिफेन सल्फेट की अधिक से अधिक २५ से ५० मिग तक की मात्रा की आवश्यकता पड़ सकती है। एम्बिफेन सल्फेट की और मात्रा लक्षणों के बरकरार रहने की जा सकती है। एम्बिफेन की किसी एकदम देरी चाहिए इसके लिए मुँह से निकलने वाली लार एक लायदायक कंसीटी है। २. २ से ३ ग्राम २ सी एल ५० मिली आसुत खल में डालकर अम्ल शिथिल द्वारा तुरन्त पेश-पेश ५० से १०० मिनेट २ बार दोहराएँ। ३. एम्बेफीन के एन्टीडोटिक के रूप में उपयोग करें। **प्रकारित्व परीक्षण :** उपर्युक्त प्रयोग लिफाफे पढ़ें। **व्यापार :** उपर्युक्त संलग्न लिफाफे पढ़ें। **उपयोग :** इसका उपयोग कपास की छेड़ की सुईयों की संरचना के लिए किया जाता है। **चेतावनी :** १. लेबल/लिफाफे में दी गई चेतावनी के अलावा अन्य फसलों पर इसका उपयोग करना मत है। २. फसल काटने के बाद इसका उपयोग न करें। ३. उपयोग के बाद चक्क में दिने निर्दिष्टानुसार खाली डब्बों को नष्ट करें। ४. पॉली हाउस और सीलिंग छेड़ के लिए निर्देश-निर्देश और सुरक्षा चक्क पढ़ें।

बोस्फोरस गोल्ड प्रोफेनोफॉस ४०% + साइपरमेथ्रिन ४% ई.सी. कीटनाशक

रासायनिक संयोजन : प्रोफेनोफोस सक्रिय तत्व : ४०.००% w/w, साइपरमेथ्रिन सक्रिय तत्व : ४.००% w/w, कस्टर ऑयल पॉली वाहनोस ईथर ३६/४० ग्रेड : ९.७५% w/w, डोडेकिल बेन्जीन सल्फोनेक एसिड कैल्शियम साइट : ५.२५% w/w, सोयाबीन तेल, एपॉक्सी रेजिन : १०.००% w/w, सॉल्वेंट सी-१ : ०.५% w/w, कुल : १००.००% w/w। **उपयोग के लिए निर्देश :** १. खाद्यसमयों, खाद्य सामग्री के खाद्य भागों और पशुओं के घरे से दूर रहें। २. मुँह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचावें। ३. छिड़काव की वायु को संतुलित दूर अंतर जगह से बाहर। ४. हवा की स्थिति में छिड़काव करें। ५. छिड़काव के बाद त्वचा कपड़े के अलावा जो अस्त्रों तैयार रहें। ६. छिड़काव के समय पर्याप्त खाना, पानी और कुछ चबाना भी खाएँ। ७. छिड़काव करते या मिलते समय पूरा सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विषनाशक :** १. रोगी को तुरन्त एम्बिफेन सीरीज और इन्सुलीन के मिश्रण, एक की चुपकान ५ से १० मिनेट के अंतराल पर अम्ल शिथिल द्वारा व्यापार की तरफ हटा दें। एम्बिफेन सल्फेट की अधिक से अधिक २५ से ५० मिग तक की मात्रा की आवश्यकता पड़ सकती है। एम्बिफेन सल्फेट की और मात्रा लक्षणों के बरकरार रहने की जा सकती है। एम्बिफेन की किसी एकदम देरी चाहिए इसके लिए मुँह से निकलने वाली लार एक लायदायक कंसीटी है। २. २ से ३ ग्राम २ सी एल ५० मिली आसुत खल में डालकर अम्ल शिथिल द्वारा तुरन्त पेश-पेश ५० से १०० मिनेट २ बार दोहराएँ। ३. एम्बेफीन के एन्टीडोटिक के रूप में उपयोग करें। **प्रकारित्व परीक्षण :** उपर्युक्त प्रयोग लिफाफे पढ़ें। **व्यापार :** उपर्युक्त संलग्न लिफाफे पढ़ें। **उपयोग :** इसका उपयोग कपास की छेड़ की सुईयों की संरचना के लिए किया जाता है। **चेतावनी :** १. लेबल/लिफाफे में दी गई चेतावनी के अलावा अन्य फसलों पर इसका उपयोग करना मत है। २. फसल काटने के बाद इसका उपयोग न करें। ३. उपयोग के बाद चक्क में दिने निर्दिष्टानुसार खाली डब्बों को नष्ट करें। ४. पॉली हाउस और सीलिंग छेड़ के लिए निर्देश-निर्देश और सुरक्षा चक्क पढ़ें।

बोस्फोरस गोल्ड బోస్ఫోరస్ గోల్డ్

BOSFORUS GOLD Profenofos 40% + Cypermethrin 4% EC बोस्फोरस गोल्ड प्रोफेनोफॉस ४०% + साइपरमेथ्रिन ४% ई.सी.

BOSFORUS GOLD कीटनाशक

Net Content 1 Litre

शुद्ध मात्रा १ लीटर

Read enclosed the leaflet before use उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें। ઉપયોગ થી પહેલાં સંલગ્ન પત્રિકા પાંચો.

Regn. No.: CIR-282223-2022-Profenofos + Cypermethrin (EC) (442)-938

पंजी. नं.: सीआयआर-२८२२३/२०२२-प्रोफेनोफॉस + साइपरमेथ्रिन (ई.सी.) (४४२)-९३८

Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187

उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By : M/s Albaugh India Private Limited, 175, Kagalwaha House, 2nd Floor, Vidyanagar Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400089.

निर्माता और विपणनकर्ता: मे. अल्बाugh इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, १७५, कागलवाहा हाउस, दूसरी मंजिल, विद्यानगर मार्ग, कलीना, सान्ताक्रूज (पू.), होंडा शोम्स के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।

Factory Address : G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Marvati, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी: जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाद-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जीला-उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address. Tel: 18003000335, Email: contactin@albaughilc.com

Batch No. :

[illegible][illegible][illegible]

BOSFORUS® GOLD

Profenofos 40% + Cypermethrin 4% EC

बोस्फोरस गोल्ड

प्रोफेनोफॉस ४०% + साइपरमेथ्रिन ४% ई.सी.

धोरेझेरस गोल्ड బోస్‌ఫోరస్ గోల్డ్

PACKING

INSECTICIDE

कीटनाशक

ALBAUGH®

your alternative

THIS SIDE UP

Read enclosed the leaflet before use उपपत्ते से पढ़ने संलग्न पत्रिका पढ़ें। ઉપબોધને થી પહેલાં સંલગ્ન પત્રિકા વાંચો.

Regn. No. CIR-228223/2022-Profenofos + Cypermethrin (EC) (442)-938

पंजी नं./पं.नं. सीआरएन-२२८२२३/२०२२- प्रोफेनोफॉस + साइपरमेथ्रिन (ई.सी.) (४४२)-९३८

Mfg. Lic. No. MLJUDPPH/2022-23/187

उत्पादन लाइसेंस नं./ઉત્પાદન લાઇસેન્સ નં./2022-23/187

Manufactured & Marketed By: M/s Albaugh India Private Limited,
175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyapati Marg, Kalina, Santacruz (E),
Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra-400098.

निर्मित एवं बाजारवाहक: मे. अलबाugh इण्डीया प्राइवेट लिमिटेड, 175, कागलवाला हाउस, पुर्नरी मार्गेर, विद्यापति मार्गेर,
 मुंबई, महाराष्ट्र-400098.

Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Malavi,
 District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

ફેક્ટરી : ગી-1૫૫, રીઠો ઇન્ડિયલ ઍરિયા, સનવાડ-વટેહનાગર, મલવી, જીલ્લો-ઉડાપુર - ૩૧૩૨૦૫, રાજસ્થાન, ભારત.

Batch No./બેચ નં./બેચ નં.:

Mfg. Date / તારીખ નિર્મિત :

Exg. Date / તારીખ નિર્મિત :

અવધી અપાઈની તારીખ:

Maximum retail price ₹:

Includation of all taxes

કર્મીઆલ ક્યુઆ પ્રમા રૂ :

એવો ક્યાં સર્લિસ

વધુત્વ વધુ ટેક્સ ઉમેરત રૂ :

કર્મીઆલ ક્યાં પ્રમા રૂ :

@Registered Trademark Re-entry: 48 hours પુનઃપ્રવેશ: ૪૮ ઘંટો

Keep in dry place away from open heat or open flame

સૂકી ઓર ઢંઢી જગહ માં આગ સે દૂર રાખે

For Agricultural Use Only. કેવલ કૃષિ ઉપયોગ કે લિયે।

Imitation of label graphics is a punishable offence.

ફાલ કૃષિ ઉપયોગ માં ઓર

