IXUS®

Fipronil 5% SC **(Systemic and Contact Insecticide)**

Read enclosed leaflet before use. Chemical Composition: Wetting agent Naphthalene sulfonate: 3.00 % w/w, Suspending agent Sodium Ligno sulphonate: 8.00 % w/w,Sticking/Stabilizing agent: Carboxy Methyl Cellulose 4.00 % w/w, Dispersing agent Sodium salt of Dinaphthyl methanol sulphonic acid: 3.00 % w/w, Blend of emulsifiers (Proprietary blend of alkyl phenol ethoxylate),triglyceride ethoxylate, calcium alkyl benzyl sulphonate): 8.00 % w/w, Water: Q.S. % w/w, Fipronil, A.I. (Minimum purity 90%): 5.00 % w/w, Sunflower oil: 5.00 % w/w, **Total: 100 % w/w. Direction Of Use:** Please read enclose leaflet before use. **Precautions:** 1. Keep away from foodstuff container and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin 3. Avoid inhalation of the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat, and chew anything while spraying 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote:** No specific antidote is known. treat symptomatically. **First Aid:** Please see enclosed leaflet. **Symptoms:** Please see enclosed leaflet. **Recommendations:** Fipronil 5% SC is an insecticide which is used to control insects like Stem Borer, Brown Plant Hopper, Green Leaf Hopper, Rice Leaf Folder, Rice Gall Midge, White Backed Plant Hopper and Whorl Maggot etc. in Rice, Diamond Back Moth in Cabbage, Thrips, Aphid, Fruit Borer in Chilli, Early Root & Shoot Borer of Sugarcane and Aphids,Jassids,Thrips,White fly & Boll Worm in Cotton crop. **Caution:** 1. Not to be used on Crops other than Specified on this Label/Leaflet. 2. Not to be used for Post-harvest Application. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area-refer to the leaflet.

इक्सस

फिप्रोनिल ५% एस. सी. **अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक**

उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढें। रासायनिक संरचना: वैटिंग एजेन्ट नैप्थालीन सल्फोनेट: ३.०० %भार/भार, सस्पैंडिंग एजेन्ट सोडियम लिग्नो सल्फोनेट: ८.०० % भार/भार, स्टिकिंग/स्टेबिलाइजिंग एजेन्ट कारबोक्सी मिथाइल सेल्युलोज: ४.०० % भार/भार, डिसपर्सिंग एजेन्ट सोडियम साल्ट ऑफ डाईलेप्थाईल मेथानोल सल्फोनिक अम्ल: ३.०० % भार/भार, ब्लेन्ड ऑफ एमल्सीफायर्स प्रोपाईटरी ब्लेन्ड ऑफ एल्किईल फीनोल एथोक्सीलेट, ट्राईग्लीसराइड एथोक्सीलेट, कैल्सियम एल्काईल बैन्जाईल सल्फोनेट: ८.०० % भार/भार, पानी: पर्याप्त मात्रा % भार/भार, फिप्रोनिल ए.आई.: ५.०० % भार/भार, सूरजमूखी तेल: ५.०० % भार/भार, **कुल: १००% भार/भार. उपयोग के लिए दिशा–निर्देश:** इस्तेमाल करने से पहलें सलंग्न लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री, के खाली बर्तनों और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुंह, आँखो, त्वचा को सम्पर्क से बचाये। ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचाये। हवा की दिशा में छिड़काव करे। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धुम्रपान, खाना पीना और कुछ चबाना नही चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहने। **विष नाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** कृपया संलग्न लीफलेट देखें। **लक्षण:** कृपया संलग्न लीफलेट देखें। **उपयोग:** फिप्रोनिल ५ प्रतिशत एस.सी. कीटनाशक धान पर होने वाले तना छेदक, भूरा तना छेदक, हरी पत्ती का फुदका, धान का पत्ता लपेटक, गाल मिज, सफेद पीट वाला पौध फुदका, गोभ की मक्खी, बंदगोभी के हीरा पीठ पतंगा, मिर्ची का चुरदा, माहु, फल छेदक , गन्ना के अग्रिम तना व जड़ छेदक व कपास के चुरदा, तेल, माहु, सफेद मक्खी व डोडे की सुडी आदि कीटों की रोकथाम में प्रभावकारी है। **चेतावनी:** १) लेबल और सूचना पत्रक पर सूचित फसलों और कीटों के अलावा अन्य किसी के फसल या कीटों पर इस्तेमाल ना करें. २) फ़सल कटाई के बाद के कामों के लिए इस्तेमाल ना करें. ३) पत्रक पर दिए गए निर्देशों के अनुसार कंटेनर नष्ट करें. ४) पॉली हाउसेस और बंद इलाका और मात्रा के बारे में निर्देशों के लिए–पत्रक देखें.

ઈક્સસ

ફિપ્રોનિલ ૫% એસ. સી. **આંતરપ્રવાહી અને સ્પર્શીય કીટનાશક**

ઉપયોગ કરતા પહિલા પત્રિકા વાંચો. રાસાયણીક સંયોજન : ફિપ્રોનિલ સક્રિય તત્વ (લઘુત્તમ શુદ્ધતા ૯૦%): ૫.૦૦% વ/વ, સુર્યમુખી તેલ : ૫.૦૦% વ/વ, વેટિંગ ઘટક (નેપથેલીન સલ્ફોનેટ) : ૩.૦૦% વ/વ, સસ્પેન્ડિંગ ઘટક (સોડિયમ લિગ્નોસલ્ફેટ)ઃ ૮.૦૦% વ/વ, સ્ટીકીંગ/સ્ટેબિલાઈઝિંગ ઘટક (કાર્બોકસી મિથાઈલ સેલ્યૂલોજ) : ૪.૦૦% વ/વ ડિસ્પરસીંગ ઘટક (ડાયનેપ્થાઈલ મેથાનોલ સલ્ફોનિક એસિડનું સોડિયમ સોલ્ટ): ૩.૦૦% વ/વ ઈમલ્સીફાયરનું મિશ્રણ (અલ્કાઈલ ફિનોલ એથોકસીલેટ, ટ્રાયગ્લીસરાઈડ એથોકસીલેટ કેલ્શિયમ અલ્કાઈલ બેન્ઝાઈલ સલ્ફોનેટ) : ૮.૦૦% ૧/વ, પાણી : પર્યાપ્ત માત્રા, **કુલ : ૧૦૦.૦૦%વ/વ. ઉપયોગ માટે નિર્દેશઃ** કુપા કરીને ઉપયોગ કરતાં પહેલાં આ સાથે આપેલ પત્રિકા વાંચી જાવ. **પ્રયોગકર્તાઓ માટે સાવધાઙ્ગી** : ૧.ખાદય પદાર્થ, ખાધ પદાર્થના ખાલી વાસણો અને પશુ આહારથી દૂર રાખો. ૨. મોં, આંખો અને ચામડી સાથે સંપર્ક ટાળો. ૩. છંટ્કાવના બિંદુ શ્વાસમાં જતાં ટાળવા. પવનની દિશામાં છંટકાવ કરો. ૪. છંટકાવ પછી દૂષિત કપડાં અને શરીરના ભાગો સંપૂર્ણપણે ધોવા. ૫. છંટકાવ દરમ્યાન ધૂમ્રપાન કે ખાવા પીવાની ક્રિયા ના કરવી. ૬. દ્રાવણ બનાવતો અને છંટકાવ દરમ્યાન સંપૂર્ણ રક્ષણાત્મક કપડાં પહેરો. **ઝેરનું મારણ :** ઝેરનું કાઈ ચાકકસ મારણ ધ્યાનમાં નથી. લક્ષણો ટ ઉપચાર કરો. **પ્રાથમિક સારવાર અને લક્ષણો :** કૃપયા સાથે આપેલ પત્રિકા જુઓ. **ભલામણ :** ફિપ્રોનિલ ૫% એસ. સી. એક જંતુનાશક છે જે ડાંગરમાં ગાભમારાની ઈયળ, ભૂખરાં ચૂસિયાં, પાનનાં લીલાં ચૂસિયાં, પાન વાળનારી ઈયળ, ગોલ મીજ, સફેદ પીઠવાળા ચૂસિયાં, વ્હર્લ મેગટ, કોબીજની હીરા ફૂદાની ઈયળ, મરચીમાં મોલો, શ્રિપ્સ અને ફળ ખાનાર ઈયળ, શેરડીમાં શરૂઆતની ડૂંખ તેમ જ મૂળ કોરનાર ઈયળ, કપાસમાં મોલો, તડતડિયાં, શ્રિપ્સ, સફેદ માખી અને જીંડવાની ઈયળના નિયંત્રણ માટે વાપરી શકાય. **સાવધાની :** ૧. લેબલ/માહિતી પત્રિકામાં આપેલ પાક અને જીવાત સિવાય અન્ય કોઈ પાક કે જીવાત માટે ઉપયોગ કરવો નહી. ૨. પાકની કાપણી પછી પાકની જાળવણી માટે આનો ઉપયોગ ન કરવો. ૩. માહિતી પત્રિકામાં આપેલ સૂચના મુજબ ખાલી ડબ્બાઓનો નાશ કરો.

Keep in cool, dry place away from heat and open flame

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

ઈક્સસ | ఇక్సస్

IXUS®

Fipronil 5% SC

इक्सस

फिप्रोनिल ५% एस. सी.


KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
बच्चों की पहुँच से दूर रखिए
जहर
POISON
ઝેર
બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો

SYSTEMIC AND CONTACT INSECTICIDE

अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक

Net Content 250 ml

शुध्द मात्रा २५० मि. ली.

ALBAUGH™
your alternative

Regn. No. : CIR-228081/2022-Fipronil (SC) (442)-1188

पंजी. नं. / રજિ.નં.: सीआयआर-२२८०८१/२०२२-फिप्रोनिल (एस सी) (४४२)-११८८

Mfg. Lic No. : ML/JDPP/2022-23/187 **उत्पादन लाइसेंस नं. / ઉ.લા.ન.:** एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By : M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.

निर्माता एवं विपणनकर्ता : मे. रोटैम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड,१७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांतांक्रुज (पू.), होंडा शोरुम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।

Factory : G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad-Fatehnagar, Tal.- Mavli, Dist.-Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जीला-उदयपूर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

Batch No. / बैच नं. / બેચ નં.:

Mfg. Date / उत्पादन तिथि :
ઉત્પાદન તારીખઃ

Exp. Date / समापन तिथि :
અવધી સમાપ્તિની તારીખઃ

Maximum retail price ₹:
inclusive of all taxes
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
सभी करों सहित
વધુમાં વધુ રીટેલ કિંમત ₹ઃ
કરવેરા સાથે
Unit Sale price per ml

Net Content : 250 ml शुध्द मात्रा : **२५० मि. ली.**

For any Complaint contact, Customer Care Executive
at Registered office address,
Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

QR Code
15 x 15 mm

®-Registered Trademark

FOR AGRICULTURAL USE. कृषि उपयोग के लिए।



206 x 77 mm

PANTONE 2012 C PANTONE 654 C

IXUS®

Fipronil 5% SC

(Systemic and Contact Insecticide)

Read enclosed leaflet before use. Chemical Composition: Wetting agent Naphthalene sulfonate: 3.00 % w/w, Suspending agent Sodium Ligno sulphonate: 8.00 % w/w,Sticking/Stabilizing agent: Carboxy Methyl Cellulose 4.00 % w/w, Dispersing agent Sodium salt of Dinaphthyl methanol sulphonic acid: 3.00 % w/w, Blend of emulsifiers (Proprietary blend of alkyl phenol ethoxylate),triglyceride ethoxylate, calcium alkyl benzyl sulphonate): 8.00 % w/w, Water: Q.S. % w/w, Fipronil, A.I. (Minimum purity 90%): 5.00 % w/w, Sunflower oil: 5.00 % w/w, **Total: 100 % w/w. Direction Of Use:** Please read enclose leaflet before use. **Precautions:** 1. Keep away from foodstuff container and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin 3. Avoid inhalation of the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat, and chew anything while spraying 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote:** No specific antidote is known. treat symptomatically. **First Aid:** Please see enclosed leaflet. **Symptoms:** Please see enclosed leaflet. **Recommendations:** Fipronil 5% SC is an insecticide which is used to control insects like Stem Borer, Brown Plant Hopper, Green Leaf Hopper, Rice Leaf Folder, Rice Gall Midge, White Backed Plant Hopper and Whorl Maggot etc. in Rice, Diamond Back Moth in Cabbage, Thrips, Aphid, Fruit Borer in Chilli, Early Root & Shoot Borer of Sugarcane and Aphids,Jassids,Thrips,White fly & Boll Worm in Cotton crop. **Caution:** 1. Not to be used on Crops other than Specified on this Label/Leaflet. 2. Not to be used for Post-harvest Application. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area-refer to the leaflet.

इक्सस

फिप्रोनिल ५% एस. सी.

अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक

उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढें। रासायनिक संरचना: वैटिंग एजेन्ट नैप्थालीन सल्फोनेट: ३.०० %भार/भार, सस्पैंडिंग एजेन्ट सोडियम लिग्नो सल्फोनेट: ८.०० % भार/भार, स्टिकिंग/स्टेबिलाइजिंग एजेन्ट कारबोक्सी मिथाइल सेल्युलोज: ४.०० % भार/भार, डिसपर्सिंग एजेन्ट सोडियम साल्ट ऑफ डाईलेप्थाईल मेथानोल सल्फोनिक अम्ल: ३.०० % भार/भार, ब्लेल्ड ऑफ एमल्सीफायर्स प्रोपाईटरी ब्लेल्ड ऑफ एल्किईल फीनोल एथोक्सीलेट, ट्राईग्लीसराइड एथोक्सीलेट, कैल्सियम एल्काईल बैन्जाईल सल्फोनेट: ८.०० % भार/भार, पानी: पर्याप्त मात्रा % भार/भार, फिप्रोनिल ए.आई.: ५.०० % भार/भार, सूरजमूखी तेल: ५.०० % भार/भार, **कुल: १००% भार/भार. उपयोग के लिए दिशा–निर्देश:** इस्तेमाल करने से पहलें सलंग्न लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री, के खाली बर्तनों और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुंह, आँखो, त्वचा को सम्पर्क से बचाये। ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचाये। हवा की दिशा में छिड़काव करे। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धुम्रपान, खाना पीना और कुछ चबाना नही चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहने। **विष नाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** कृपया संलग्न लीफलेट देखें। **लक्षण:** कृपया संलग्न लीफलेट देखें। **उपयोग:** फिप्रोनिल ५ प्रतिशत एस.सी. कीटनाशक धान पर होने वाले तना छेदक, भूरा तना छेदक, हरी पत्ती का फुदका, धान का पत्ता लपेटक, गाल मिज, सफेद पीट वाला पौध फुदका, गोभ की मक्खी, बंदगोभी के हीरा पीठ पतंगा, मिर्ची का चुरदा, माहु, फल छेदक , गन्ना के अग्रिम तना व जड़ छेदक व कपास के चुरदा, तेल, माहु, सफेद मक्खी व डोडे की सुडी आदि कीटों की रोकथाम में प्रभावकारी है। **चेतावनी:** १) लेबल और सूचना पत्रक पर सूचित फसलों और कीटों के अलावा अन्य किसी के फसल या कीटों पर इस्तेमाल ना करें. २) फ़सल कटाई के बाद के कामों के लिए इस्तेमाल ना करें. ३) पत्रक पर दिए गए निर्देशों के अनुसार कंटेनर नष्ट करें. ४) पॉली हाउसेस और बंद इलाका और मात्रा के बारे में निर्देशों के लिए–पत्रक देखें.

ઈક્સસ

ફિપ્રોનિલ ૫% એસ. સી.

આંતરપ્રવાહી અને સ્પર્શીય કીટનાશક

ઉપયોગ કરતા પહિલા પત્રિકા વાંચો. રાસાયણીક સંયોજન : ફિપ્રોનિલ સક્રિય તત્વ (લઘુત્તમ શુદ્ધતા ૯૦%): ૫.૦૦% વ/વ, સુર્યમુખી તેલ : ૫.૦૦% વ/વ, વેટિંગ ઘટક (નેપથેલીન સલ્ફોનેટ) : ૩.૦૦% વ/વ, સસ્પેન્ડિંગ ઘટક (સોડિયમ લિગ્નોસલ્ફેટ)◌ઃ ૮.૦૦% વ/વ, સ્ટીકીંગ/સ્ટેબિલાઈઝિંગ ઘટક (કાર્બોકસી મિથાઈલ સેલ્યૂલોજ) : ૪.૦૦% વ/વ ડિસ્પરસીંગ ઘટક (ડાયનેપ્થાઈલ મેથાનોલ સલ્ફોનિક એસિડનું સોડિયમ સોલ્ટ): ૩.૦૦% વ/વ ઈમલ્સીફાયરનું મિશ્રણ (અલ્કાઈલ ફિનોલ એથોકસીલેટ, ટ્રાયગ્લીસરાઈડ એથોકસીલેટ કેલ્શિયમ અલ્કાઈલ બેન્ઝાઈલ સલ્ફોનેટ) : ૮.૦૦% ૧/વ, પાણી : પર્યાપ્ત માત્રા, **કુલ : ૧૦૦.૦૦%વ/વ. ઉપયોગ માટે નિર્દેશઃ** કુપા કરીને ઉપયોગ કરતાં પહેલાં આ સાથે આપેલ પત્રિકા વાંચી જાવ. **પ્રયોગકર્તાઓ માટે સાવધાઙ્ગી :** ૧.ખાદય પદાર્થ, ખાદ્ય પદાર્થના ખાલી વાસણો અને પશુ આહારથી દૂર રાખો. ૨. મોં, આંખો અને ચામડી સાથે સંપર્ક ટાળો. ૩. છંટ્કાવના બિંદુ શ્વાસમાં જતાં ટાળવા. પવનની દિશામાં છંટકાવ કરો. ૪. છંટકાવ પછી દૂષિત કપડાં અને શરીરના ભાગો સંપૂર્ણપણે ધોવા. ૫. છંટકાવ દરમ્યાન ધૂમ્રપાન કે ખાવા પીવાની ક્રિયા ના કરવી. ૬. દ્રાવણ બનાવતો અને છંટકાવ દરમ્યાન સંપૂર્ણ રક્ષણાત્મક કપડાં પહેરો. **ઝેરનું મારણ :** ઝેરનું કાઈ ચાકકસ મારણ ધ્યાનમાં નથી. લક્ષણો ટ ઉપચાર કરો. **પ્રાથમિક સારવાર અને લક્ષણો :** કૃપયા સાથે આપેલ પત્રિકા જુઓ. **ભલામણ :** ફિપ્રોનિલ ૫% એસ. સી. એક જંતુનાશક છે જે ડાંગરમાં ગાભમારાની ઈયળ, ભૂખરાં ચૂસિયાં, પાનનાં લીલાં ચૂસિયાં, પાન વાળનારી ઈયળ, ગોલ મીજ, સફેદ પીઠવાળા ચૂસિયાં, વ્હર્લ મેગટ, કોબીજની હીરા ફૂદાની ઈયળ, મરચીમાં મોલો, શ્રિપ્સ અને ફળ ખાનાર ઈયળ, શેરડીમાં શરૂઆતની ડૂંખ તેમ જ મૂળ કોરનાર ઈયળ, કપાસમાં મોલો, તડતડિયાં, શ્રિપ્સ, સફેદ માખી અને જીંડવાની ઈયળના નિયંત્રણ માટે વાપરી શકાય. **સાવધાની :** ૧. લેબલ/માહિતી પત્રિકામાં આપેલ પાક અને જીવાત સિવાય અન્ય કોઈ પાક કે જીવાત માટે ઉપયોગ કરવો નહી. ૨. પાકની કાપણી પછી પાકની જાળવણી માટે આનો ઉપયોગ ન કરવો. ૩. માહિતી પત્રિકામાં આપેલ સૂચના મુજબ ખાલી ડબ્બાઓનો નાશ કરો.

Keep in cool, dry place away from heat and open flame

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

ઈક્સસ | ఇక్సస్

IXUS®

Fipronil 5% SC

इक्सस

फिप्रोनिल ५% एस. सी.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

बच्चों की पहुँच से दूर रखिए

जहर

POISON

ઝેર

બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો

SYSTEMIC AND CONTACT INSECTICIDE

अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक

Net Content 1 Ltr.

शुध्द मात्रा १ ली.

ALBAUGH™

your alternative

Regn. No. : CIR-228081/2022-Fipronil (SC) (442)-1188

पंजी. नं. / રજિ.નં.: सीआयआर-२२८०८१/२०२२-फिप्रोनिल (एस सी) (४४२)-११८८

Mfg. Lic No. : ML/JDPP/2022-23/187

उत्पादन लाइसेंस नं. / ઉ.લા.ન.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By : M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd.,
175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.

निर्माता एवं विपणनकर्ता : मे. रोटैम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांतांक्रुज (पू.), होंडा शोरुम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।

Factory : G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad-Fatehnagar, Tal.- Mavli, Dist.-Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जीला-उदयपूर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

Batch No. / बैच नं. / બેચ નં.:

Mfg. Date / उत्पादन तिथि :
ઉત્પાદન તારીખઃ

Exp. Date / समापन तिथि :
અવધી સમાપ્તિની તારીખઃ

Maximum retail price ₹:
inclusive of all taxes
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
सभी करों सहित
વધુમાં વધુ રીટેલ કિમંત ₹ઃ
કરવેરા સાથે
Unit Sale price per ml

Net Content : 1 Ltr. **शुध्द मात्रा : १ ली.**

For any Complaint contact, Customer Care Executive at Registered office address,
Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

®-Registered Trademark

QR Code
15 x 15 mm

FOR AGRICULTURAL USE. **कृषि उपयोग के लिए।**



HDPE Bottle 1 Ltr Size 281mm x 140mm

ఈక్సస్

ఫిప్రోనిల్ 5% ఎస్.సీ.

(అంతర్ప్రవాహ మరియు స్పర్శనీయ శిలీంధ్రనాశిని)

ఫిప్రోనిల్ 5 శాతం ఎస్‌సీ ఒక కీటకనాశిని. వరిని ఆశించే కాండం తొలిచే పురుగు, బ్రౌన్ ప్లాంట్ హాపర్, గ్రీన్ లీఫ్ హాపర్, రైస్ లీఫ్ హాపర్, రైస్ గాల్ మిడ్జ్, వైట్ బ్యాక్డ్ ప్లాంట్ హాపర్, వోర్ల్ మగ్గోట్, క్యాబేజీని ఆశించే డీబీఎం, మిర్చిని ఆశించే థ్రిప్స్, అఫిడ్స్ మరియు పండు తొలిచే పురుగు, చక్కెరని ఆశించే ఎర్లీ షూట్ బోరర్ మరియు వేళ్లని తొలిచే పురుగు మరియు ప్రత్తిని ఆశించే అఫిడ్స్, జస్సిడ్స్, థ్రిప్స్, తెల్ల దోమ మరియు బోల్ వర్మ్ వంటి కీటకాల్ని నియంత్రించడానికి ఉపయోగించబడే కీటకనాశిని.

సిఫారసు:

పంట	కీటకం సాధారణ నామం	మోతాదు/హెక్టారుకి		నీటిలో మిశ్రమం (లీ.)	చివరి పిచికారీ కోతలకు కోతలకు మధ్య వేచి ఉండే సమయం (రోజులు)
		ఏ.ఐ. (గ్రా.)	సూత్రీకరణ (మి.లీ.)		
క్యాబేజీ	డైమండ్ బ్యాక్ పురుగు	40-50	800-1000	500	7
మిర్చి	థ్రిప్స్, అఫిడ్, పండు తొలిచే పురుగు	40-50	800-1000	500	7
వరి	కాండం తొలిచే పురుగు, బ్రౌన్ ప్లాంట్ హాపర్, గ్రీన్ లీఫ్ హాపర్, ఆకు ముడత పురుగు రైస్ గాల్ మిడ్జ్, వోర్ల్ మగ్గోట్, వైట్ బ్యాక్డ్ ప్లాంట్ హాపర్,	50-75	1000-1500	500	32
చెరకు	వేరు తొలిచే పురుగు, ఎర్లీ షూట్ పురుగు	75-100	1500-2000	500	9 నెలలు
ప్రత్తి	అఫిడ్స్, జస్సిడ్స్, థ్రిప్స్, తెల్ల దోమ	75-100	1500-2000	500	6
ప్రత్తి	బోల్ వర్మ్	100	2000	500	6

ఉపయోగించడానికి సూచనలు: మొక్కల్ని కాపాడే సామగ్రి: అధిక పరిమాణం గల నాజల్ అమర్చిన న్యాప్-సాక్ స్ప్రేయర్, ఎయిర్ ప్రెషర్ ఫుట్ పంప్, హార్డ్ రాకర్ లేదా పవర్‌తో పని చేసే పిచికారీ యంత్రం వంటివి ఉపయోగించవచ్చు.

ఉపయోగించాల్సిన సమయం:

వరి: తిరిగి నాటిన తరువాత 25 నుండి 30 రోజుల మధ్య ఫిప్రోనిల్ ఉపయోగించాలి.

క్యాబేజీ: మొదటి పిచికారీని తిరిగి నాటిన తరువాత 30 నుండి 35 రోజులకి లేదా తెగులు ఘటనని గుర్తించినప్పుడు, ఏది ముందు జరిగితే దాని ప్రకారం ఇవ్వాలి. 7 నుండి 10 రోజుల విరామంతో 2 నుండి 3 పిచికారీల్ని పునరావృతం చేయాలి.

మిర్చి: తిరిగి నాటిన తరువాత 40 నుండి 50 రోజుల మధ్య లేదా తెగులు కనిపించినప్పుడు, ఏది ముందు జరిగితే దాని ప్రకారం మొదటి పిచికారీ ఇవ్వాలి. 7 నుండి 10 రోజుల విరామంతో 2 నుండి 3 పిచికారీలు పునరావృతం చేయాలి.

చెరకు: ఎర్లీ షూట్ బోరర్ కోసం నాటిన (డీఏపీ) తరువాత 35 రోజులకు ఆకులపై ఉపయోగించాలి మరియు వేరు తొలిచే పురుగు కోసం మొక్కల మొదళ్లల్లో పిచికారీ చేయాలి.

ముందు జాగ్రత్తలు: 1. ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీ ఆహార పదార్థాల కంటైనర్లు మరియు జంతువుల ఆహారాలకు దూరంగా ఉంచాలి. 2. నోరు, కళ్లు, చర్మాలకు తగలనీయరాదు. 3. పిచికారీ పొగని పీల్చరాదు. గాలి వీచే దిశలో పిచికారీ చేయాలి. 4. పిచికారీ చేసిన తర్వాత కలుషితమైన దుస్తుల్ని మరియు శరీర భాగాల్ని బాగా కడకాలి. 5. పిచికారీ చేసేటప్పుడు ఏదీ తినరాదు, తాగరాదు, పొగ తాగరాదు, నమలరాదు. 6. విష వాయువును పీల్చకుండ ఉండేందుకు వీలుగా తగన రీతిలో దుస్తులు వేసుకోవాలి.

హెచ్చరిక: ఫిప్రోనిల్ తేనెటీగలుకు, జలచరాలకు విషపూరితమైనది. కాబట్టి జలాశయాలు, చేపలు పెంచే చోట ఉపయోగించరాదు. తేనెటీగలు ఆహారం సంపాదించే సమయంలో పిచికారీని ఉపయోగించరాదు.

విషపూరితం లక్షణాలు: చికాకు, బద్ధకం, కండరాలు ఒణకడం, మూర్ఛలు కలగవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స: 1. మెడ వెనుక చెక్కిలిగిలి పెట్టి వాంతి చేయించండి మందు బయటకు వచ్చే వరకు వాంతి చేయించండి. 2. శరీరంపై పడితే, ధారాళంగా నీటితో శుభ్రం చేయాలి. 3. మందు కళ్ళల్లో పడితే 10-15 ని॥లు ఎక్కువ నీటితో కళ్ళు శుభ్ర పరచండి. 4. విష వాయువును పీల్చిన వ్యక్తిని, ధారాళంగా స్వచ్ఛమైన గాలి వీచే ప్రదేశానికి తీసుకు వెళ్ళండి.

విషపూరితం: సిఫారసు చేసిన ప్రకారం ఉపయోగిస్తే విషపూరితం కాదు.

విరుగుడు: ప్రత్యేకమైన విరుగుడు కనుగొనబడలేదు. విష లక్షణములను బట్టి చికిత్స జరిపించండి.

కంటైనర్లని పడవేయడం: 1. ప్యాకేజీలు లేదా మిగులు సామగ్రిల్ని, యంత్రాల్ని కడిగిన నీటిని పర్యావరణం మరియు నీటికి హాని కలగకుండా పడవేయడం కీటకనాశినిల తయారీదార్లు, సూత్రీకరణదార్లు, ఆపరేటర్ల బాధ్యత. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీల్ని తిరిగి ఉపయోగించకుండా నివారించటానికి వాటిని బయట పడవేయరాదు. 3. నివాసిత ప్రాంతాలకి దూరంగా ప్యాకేజీల్ని విరగ్గొట్టి పాతిపెట్టాలి.

భద్రపరిచే పరిస్థితులు: 1. కీటకనాశని ఉన్న ప్యాకేజీల్ని వేరే గదులు, ప్రాంగణాల్లో ముఖ్యంగా ఆహార పదార్థాల్ని, ఇతర వస్తువుల్ని భద్రపరిచే గదులు, ప్రాంగణాలకు దూరంగా, కీటకనాశని స్వభావం మరియు పరిమాణాన్ని బట్టి అల్మైరాలో పెట్టి తాళం వేయాలి. 2. కీటకనాశనిని భద్రపర్చిన గదులు, ప్రాంగణాలు చక్కటి గాలి, వెలుతురుతో, పొడిగా, కావల్సినంత కొలతల్ని కలిగి ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమం:

ఫిప్రోనిల్ ఏ.ఐ. (కనీస స్వచ్ఛత 90 శాతం)	5.00 శాతం భా/భా
పొద్దు తిరుగుడు నూనె	5.00 శాతం భా/భా
వెట్టింగ్ ఏజెంట్ (నాఫ్తలిన్ సల్ఫోనేట్)	3.00 శాతం భా/భా
సస్పెండింగ్ ఏజెంట్ (సోడియం లిగ్నో సల్ఫోనేట్)	8.00 శాతం భా/భా
జిగురు/స్టెబిలైజింగ్ ఏజెంట్ (కార్బోక్సి మిథైల్ సెల్యులోజ్)	4.00 శాతం భా/భా
డిస్పెర్సింగ్ ఏజెంట్ (డైనఫ్థైల్ మెథనాల్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ సోడియం లవణం)	3.00 శాతం భా/భా
ఎమల్సిఫైర్స్ మిశ్రమం (ఆల్కైల్ ఫినోల్ ఇథోక్సిలేట్, ట్రైగ్లిజరైడ్ ఇథోక్సిలేట్, కాల్షియం ఆల్కైల్ బెంజైల్ సల్ఫోనేట్ యాజమాన్యపు మిశ్రమం)	8.00 శాతం భా/భా
నీరు	క్యూఎస్ శాతం
మొత్తం:	**100.00 శాతం భా/భా**

హెచ్చరిక: 1. లేబుల్ మరియు కరపత్రం పై పేర్కొనబడిన పంటలు మరియు తెగుళ్ల పై మాత్రమే ఉపయోగించాలి. 2. కోతలు తరువాత ఉపయోగించరాదు. 3. ఉపయోగించిన తరువాత కరపత్రం పై సూచించిన విధంగా కంటైనర్‌ని నాశనం చేయాలి. 4. పాలీ హౌస్‌లు మరియు పరిమిత ప్రదేశాలు కోసం మోతాదు మరియు సూచనలు కోసం కరపత్రం చూడండి.

Telugu

ಈಕ್ಸಸ್

ಫಿಪ್ರೋನಿಲ್ 5% SC

(ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಕೀಟನಾಶಕ)

ಫಿಪ್ರೋನಿಲ್ 5% SC ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಭತ್ತ ಬೆಳೆಗೆ ಬರುವ ಕಾಂಡ ಕೊರಕ, ಕಂದು ಜಿಗಿ ಹುಳ, ಹಸಿರು ಎಲೆ ಕೊರಕ, ಭತ್ತ ಗಾಲ್ ಮಿಡ್ಜ್, ಬಿಳಿ ಬೆನ್ನಿನ ಜಿಗಿ ಹುಳ, ವೋರ್ಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ಗೋಟ್, ಮೊಟ್ಟೆಕೋಸಿಗೆ ಬರುವ DBM, ಮೆಣಸು ಬೆಳೆಗೆ ಬರುವ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳ, ಆಫಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಕೊರಕ, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗೆ ಬರುವ ಆರಂಭಿಕ ರೆಂಬೆ ಕೊರಕ ಮತ್ತು ಬೇರು ತಿನ್ನುವ ಹುಳ ಹಾಗೂ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗೆ ಬರುವ ಆಫಿಡ್ಸ್, ಜ್ಯಾಸ್ಸಿಡ್ಸ್, ಕೊರೆಯುವ ಹುಳ, ಬಿಳಿ ನೊಣ ಮತ್ತು ಗುಂಡು ಹುಳಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸ್ಸು:

ಬೆಳೆ	ಕೀಟಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್/ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ		ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ (ಲೀಟರ್)	ಹಿಂದಿನ ಸಿಂಪರಣೆ ಕೊಯ್ಯುವಿಕೆ ನಡುವೆ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
		ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾಂ)	ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಮಿಲೀ)		
ಮೊಟ್ಟೆಕೋಸು	ವಜ್ರ ಪತಂಗದ ಹುಳ	40–50	800–1000	500	7
ಮೆಣಸು	ಕೊರೆಯುವ ಹುಳ, ಆಫಿಡ್, ಹಣ್ಣ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳ	40–50	800–1000	500	7
ಭತ್ತ	ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳ, ಕಂದು ಜಿಗಿ ಹುಳ, ಹಸಿರು ಎಲೆ ರಕೊರಕ, ಎಲೆ ಮಡಚುವ ಹುಳ, ಭತ್ತ ಗಾಲ್ ಮಿಡ್ಜ್, ವೋರ್ಲ್ ಮೋಗ್ಗೋಟ್, ಬಿಳಿ ಬೆನ್ನಿನ ಜಿಗಿ ಹುಳ	50–75	1000–1500	500	32
ಕಬ್ಬು	ಬೇರು ತಿನ್ನುವ ಹುಳ, ಆರಂಭಿಕ ಕಾಂಡ ಕೊರಕ,	75–100	1500–2000	500	9 ತಿಂಗಳುಗಳು
ಹತ್ತಿ	ಆಫಿಡ್ಸ್, ಜ್ಯಾಸ್ಸಿಡ್ಸ್ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳ, ಬಿಳಿ ನೊಣ	75–100	1500–2000	500	6
ಹತ್ತಿ	ಗುಂಡು ಹುಳ	100	2000	500	6

ಬಳಕೆಗಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು: ಸಸ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಉಪಕರಣಗಳು: ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ನೋಜಲ್ ಜೋಡಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಪ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಏರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಫೂಟ್ ಪಂಪ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕರ್ ಅಥವಾ ಪವರ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮೆಷಿನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯ:

ಭತ್ತ: ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 25–30 ದಿನಗಳ ನಡುವೆ ಫಿಪ್ರೋನಿಲ್ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು

ಮೊಟ್ಟೆಕೋಸು: ಮೊದಲನೇ ಸಿಂಪರಣೆಯನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 30 ರಿಂದ 35 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತದೆಯೋ, ಆವಾಗ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. 7 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ರಿಂದ 3 ಸಿಂಪರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು

ಮೆಣಸು: ಮೊದಲನೇ ಸಿಂಪರಣೆಯನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 40 ರಿಂದ 50 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತದೆಯೋ, ಆವಾಗ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. 7 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ರಿಂದ 3 ಸಿಂಪರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಕಬ್ಬು: ಆರಂಭಿಕ ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳಗಳಿಗಾಗಿ ಸಸ್ಯ ನೆಟ್ಟ (DAP) 35 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೇರು ತಿನ್ನುವ ಹಳಗಳಿಗಾಗಿ ಸಸ್ಯ ನೆಡುವಾದ ಸಾಯಿಲ್ ಡ್ರೆಂಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ಬಳಕೆದಾರರ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ: 1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಪಶು ಆಹಾರ ಇದನ್ನು ಇಡಬಾರದು. 2. ವಿಡೀಸೈಡ್‌ನು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ತಗುಲದಂತೆ, ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಸೋಕದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸ ಬೇಕು. 3. ವಿಷ ಮಾಯುವಿನ ಪ್ರವೇಷವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. 4. ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಕೀಟನಾಶನಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿರಿ. 5. ಈ ಕೀಟನಾಶನಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ತಿನ ಬಾರದು, ಕುಡಿಯುಬಾರದು. ಹೊಗೆ ಕುಡಿಯ ಬಾರದು ಎಲೆ ತಿನ್ನ ಬಾರದು. 6. ಸ್ಪ್ರೇಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೈಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಫಿಪ್ರೋನಿಲ್ ಜೇನ್ನೊಣಗಳು, ಮೀನುಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಕ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಜಲಚರ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಇರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆನಾಶಕದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೇನ್ನೊಣಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆನಾಶಕ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

ವಿಷವೇರಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ತುರಿಕೆ, ಲೆಥಾರ್ಗಿ, ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನ ಮತ್ತು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ನಗುವುದು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: 1. ರೋಗಿಯ ಕತ್ತಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಚಗುಳಿ ಇಟ್ಟು, ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ. ವಾಂತಿಯ ದ್ರವ ಸ್ವಷ್ಟವಾಗುವ ವರೆಗಾ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. 2. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದರೆ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ತೊಳೆದು. 3. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೋಕಿಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗ ಶುಭ್ರವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 10–15 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 4. ವಿಷ ವಾಯುವನ್ನು ಹೀರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ.

ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಕ: ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಕವಲ್ಲ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿರಿ.

ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ: 1. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು, ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೆಷಿನ್‌ನಿಂದ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ಪಾದಕರು, ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಟರರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬಾರದು, ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿರೋಧಿಸಬೇಕು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಗಿಯಬೇಕು.

ಸಂಗ್ರಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: 1. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅದರದ್ದೇ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಡುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಆವರಣಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹಾಗಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು. 2. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕೊಠಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆವರಣಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು, ತೇವ ರಹಿತವಾಗಿರಬೇಕು, ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುವಂತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಕಲುಷಿತವಾಗದ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ:

ಫಿಪ್ರೋನಿಲ್ ಎ.ಐ (ಕನಿಷ್ಠ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ 90%)	5.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಸನ್‌ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್	5.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ತೇವಗೊಳಿಸುವ ಸತ್ವಗಳು (ನ್ಯಾಪ್ತಾಲೀನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್)	3.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಸಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ (ಸೋಡಿಯಂ ಲಿಗ್ನೋ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್)	8.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್/ಸ್ಟಾಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ (ಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿ ಮೆಥಿಲ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್)	4.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಹರಡುವ ಸತ್ವಗಳು (ಡಿನಾಫ್ತಿಲ್ ಮೆಥಾನೋಲ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್‌ನ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್)	3.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಎಮ್ಯುಲ್ಸಿಫಯರ್ಸ್ ಮಿಶ್ರಣ: (ಆಲ್ಕಿಲ್ ಫೆನೋಲ್ ಎಥೋಕ್ಸಿಲೇಟ್, ಟ್ರೈಗ್ಲೈಸೆರೈಡ್ ಎಥೋಕ್ಸಿಲೇಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಲ್ಕಿಲ್ ಬೆಂಜಿಲ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್‌ಗಳ ಪ್ರಾಪ್ರೈಟರಿ ಮಿಶ್ರಣ)	8.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ನೀರು	QS %
ಒಟ್ಟು:	**100.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು**

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: 1. ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಭಿತ್ತಿಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆಯವುಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. 2. ಕೊಯ್ಲು ಬಳಿಕದ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. 3. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕಂಟೈನರನ್ನು ಭಿತ್ತಿಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು. 4. ಏಕಾಂತ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನಗಳು–ಭಿತ್ತಿಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿರಿ.

Kannada

ഇക്സസ്

ഫിപ്രോണിൽ 5% എസ്.സി.

(ആന്തരവ്യാപനസമ്പർക്ക പ്രാണിനാശിനി)

ഫിപ്രോണിൽ 5% എസ് സി ഒരു കീടനാശിനിയാണ്, തണ്ടുതുരപ്പൻ, വിട്ടിൽ, ഇലചുരുട്ടിപ്പുഴു, പച്ചിലപ്പുഴു, ചെള്ള്, നെല്ലിലെ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പലവിധ കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കാബേജ് ചെടി, അഫിഡ്, മുളകിലെ തുരപ്പൻ പുഴു, നാമ്പ്തീനി, കരിമ്പിന്റെ വേര് തുരക്കുന്ന കീടം, ജാസിഡ്, ത്രിപ്,വെള്ളീച്ച, പരുത്തിയിലെ ചുരുളൻ പുഴു എന്നിവക്കുള്ള ഡിബിഎം.

ശുപാർശ:

വിള	കീടങ്ങളുടെ സാധാരണ പേര്	ഡോസേജ്/ഹെ.		വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിക്കൽ (ലി.)	അവസാന സ്പ്രേ മുതൽ വിളവെടുപ്പ് വരെ കാത്തിരുപ്പ് സമയം (ദിവസം)
		സ.ഘ. (ഗ്രാം)	രൂപീകരണം (മി.ല്ലി.)		
കാബേജ്	വരയൻ പുഴു	40-50	800-1000	500	7
മുളക്	വണ്ട്, പുഴു, പഴംതീനിപ്പുഴു	40-50	800-1000	500	7
നെല്ല്	തണ്ടുതുരപ്പ, ചെടിയിലെ തുരപ്പൻ പുഴു, പച്ചക്കുതിര, ഇലചുരുട്ടിപ്പുഴു, നെല്ലിലെ ചെള്ള്, വണ്ട്, വരയൻ വിട്ടിൽ,	50-75	1000-1500	500	32
കരിമ്പ്	വേര് തുരപ്പൻ, നാമ്പ്തീനിപ്പുഴു	75-100	1500-2000	500	9 മാസം
പരുത്തി	അഫിഡ്, ജാസ്സിഡ്, ത്രിപ്, വെള്ളീച്ച	75-100	1500-2000	500	6
പരുത്തി:	ചുരുളൻ പുഴു	100	2000	500	6

പ്രയോഗ നിർദ്ദേശം: ചെടി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ: അളവ് കൂടുതൽ കൊള്ളുന്ന നോസിൽ ഘടിപ്പിച്ച നാപ്-സാക്ക് പോലുള്ള സ്പ്രേ.ർ, എയർ പ്രഷർ ഫുട്ട് പമ്പ്, ഹാർഡ് റോക്കർ, അഥവാ വൈദ്യതി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്പ്രേ. മെഷീൻ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാം.

പ്രയോഗിക്കേണ്ട സമയം:

നെല്ല്: ഫിപ്രോണിൽ പ്രയോഗം ഞാറ് നട്ട് 25 - 30 ദിവസങ്ങൾക്കിടയിൽ നടത്തണം.

കാബേജ്: ആദ്യത്തെ സ്പ്രേ നട്ട് 30-35 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കീടബാധ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുമ്പോൾ, ഇതിൽ ആദ്യം ഏതാണോ വരിക അപ്പോൾ 7 മുതൽ 10 ദിവസത്തെ ഇടവേളയിൽ 2 മുതൽ 3 സ്പ്രേ ആവർത്തിക്കുക.

മുളക്: ആദ്യത്തെ സ്പ്രേ നട്ട് 40 മുതൽ 50 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കീടബാധ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുമ്പോൾ, ഇതിൽ ആദ്യം ഏതാണോ വരിക അപ്പോൾ നടത്തണം. 7 മുതൽ 10 ദിവസത്തെ ഇടവേളയിൽ 2 മുതൽ 3 സ്പ്രേ ആവർത്തിക്കുക.

കരിമ്പ്: നാമ്പ്തീനിപ്പുഴുവിന് നട്ടതിന് ശേഷം 35 ദിവസമാകുമ്പോൾ (ഡിഎപി) ഇലയിൽ തളിക്കണം, വേര് തുരപ്പന് നടുന്ന സമയത്ത് മണ്ണിൽ ഇളക്കണം.

മുൻകരുതൽ: 1. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, ഒഴിഞ്ഞ ഭക്ഷ്യവസ്തു കണ്ടെയ്നറുകൾ, മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം എന്നിവയിൽ നിന്ന് അകറ്റിവയ്ക്കുക. 2. വായ, കണ്ണുകൾ. ചർമ്മം ഇവയുമായി സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക. 3. സ്പ്രേ ബാഷ്പം ശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കാറ്റിന്റെ ദിശയിൽ തളിക്കുക. 4. തളിച്ചതിനു ശേഷം മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങളും ശരീരഭാഗങ്ങളും നന്നായി കഴുകുക. 5. തളിക്കുന്ന സമയത്ത് പുകവലിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ ചവക്കുകയോ അരുത്. 6. മിശ്രണം തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും തളിക്കുമ്പോഴും പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക.

മുന്നറിയിപ്പ്: ഫിപ്രോണിൽ തേനീച്ചകൾ, മത്സ്യത്തിനും ജലജീവികൾക്കും വിഷകരം, അതിനാൽ ജലാശയങ്ങൾക്കും ജലകൃഷിക്കും മത്സ്യകൃഷിക്കും സമീപം പ്രയോഗിക്കരുത്. തേനീച്ചകൾ ആഹാരം തേടുന്ന സമയത്ത് സ്പ്രേ പ്രയോഗം ഒഴിവാക്കണം.

വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ: അസ്വസ്ഥത, അവശത, പേശി വേദന, ചുഴലി എന്നിവ ഉണ്ടാകാം.

പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ: 1. വിഴുങ്ങിയാൽ തൊണ്ടയിൽ പിന്നിൽ ഇക്കിളിയിട്ട് ഛർദ്ദിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക. ഛർദ്ദി തെളിഞ്ഞതാകുന്നതു വരെ അത് ആവർത്തിക്കുക. 2. വസ്ത്രങ്ങളും ചർമ്മവും മലിനമായാൽ, വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റി മലിനമായ ചർമ്മം സോപ്പും ധാരാളം വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചു കഴുകുക. 3. കണ്ണുകൾ മലിനമായാൽ, 10 മുതൽ 15 മിനിട്ട് നേരത്തേക്ക് ധാരാളം ശുദ്ധജലം/ഉപ്പുവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ധാരകോരുക. 4. ശ്വസിച്ചാൽ, രോഗിയെ ശുദ്ധവായു ഉള്ളിടത്തേക്ക് മാറ്റുക.

സസ്യവിഷത്വം: ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ വയലിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ ഉൽപ്പന്നം സസ്യവിഷത്വമുള്ളതല്ല.

മറുമരുന്ന്: അറിയപ്പെടുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട മറുമരുന്നില്ല. ലക്ഷണമനുസരിച്ച് ചികിത്സിക്കുക.

കണ്ടെയ്നറുകൾ നശിപ്പിക്കൽ: 1. പാക്കേജ് തകർത്ത് ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്ത സ്ഥലത്തുനിന്ന് അകലെയായി കുഴിച്ചുമൂടണം. 2. ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ പായ്ക്കറ്റുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് തടയാനായി അവ പുറമെ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. 3. പരിസ്ഥിതിയോ വെള്ളമോ മലിനമാകാത്ത വിധം സുരക്ഷിതമായ രീതിയിലായിരിക്കണം മിച്ചമുള്ള വസ്തുക്കളും പാക്കേജും യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ കഴുകിയ വെള്ളവും നശിപ്പിക്കുന്നത്.

സ്റ്റോർ ചെയ്യൽ: 1. പ്രാണിനാശിനികൾ അടങ്ങുന്ന പാക്കേജുകൾ പ്രാണിനിശാനിയുടെ അളവിനെയും സ്വഭാവത്തെയും ആശ്രയിച്ച് മറ്റ് വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മുറികൾ അഥവാ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലെയായി പ്രത്യേകം മുറികളിൽ അഥവാ പരിസരങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകം അലമാരകളിൽ താഴിട്ടുപൂട്ടി വേണം സൂക്ഷിക്കാൻ. 2. പ്രാണിനാശിനി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മുറികൾ അഥവാ പരിസരങ്ങൾ അവ നീരാവിയുമായി കലർന്ന് മലിനമാകുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഉറപ്പായി നിർമ്മിച്ചതും വരണ്ടതും നല്ല പ്രകാശമുള്ളതും വായുസഞ്ചാരമുള്ളതും പര്യാപ്തമായ നീളവും വീതിയും ഉയരവുമുള്ളതും ആയിരിക്കണം.

രാസഘടന:

ഫിപ്രോണിൽ എ.ഐ (മിനിമം ശുദ്ധത 90%)	5.00% ഭാ/ഭാ
സൺഫ്ളവർ ഓയിൽ	5.00% ഭാ/ഭാ
നനയ്ക്കാനുള്ള ഘടകം (നാഫ്തലീൻ സൾഫോനേറ്റ്)	3.00% ഭാ/ഭാ
സസ്പെൻഡിംഗ് ഘടകം (സോഡിയം ലിഗനോ സൾഫോനേറ്റ്)	8.00% ഭാ/ഭാ
ഒട്ടിപ്പിക്കുന്ന/സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന ഘടകം (കാർബൊക്സി മീതൈൽ സെല്ലുലോസ്)	4.00% ഭാ/ഭാ
വിന്യാസ ഘടകം (ഡിനാഫ്തിൽ മെതനോൾ സൾഫോണിക് ആസിഡിന്റെ സോഡിയം സോൾട്ട്)	3.00% ഭാ/ഭാ
ഇമൽസിഫയേഴ്സിന്റെ മിശ്രിതം (ആൽക്കിൽ ഫിനോൾ എതോക്സിലേറ്റ്, ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് എതോക്സിലേറ്റ്, കാത്സിയം ആൽക്കിൽ ബെൻസിൽ സൾഫോണേറ്റ്)	8.00% ഭാ/ഭാ
വെള്ളം	Q.S %
ആകെ:	**100.00% ഭാ/ഭാ**

മുൻകരുതൽ: 1. ഈ ലേബലിൽ/ലഘുലേഖയിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവ ഒഴികെ മറ്റ് വിളകളിൽ പ്രയോഗിക്കരുത്. 2. വിളവെടുപ്പിനു ശേഷമുള്ള പ്രയോഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കരുത്. 3. ഉപയോഗത്തിനു ശേഷം ലഘുലേഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ കണ്ടെയ്നർ നശിപ്പിക്കണം. 4. പോളി ഹൗസിനും അടച്ചുകെട്ടിയ പ്രദേശങ്ങൾക്കുമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ഡോസജും - ലഘുലേഖ കാണുക.

Malalayam

ইক্সাস

ফিপ্রোনিল 5% এস.সি.

(অন্তর্প্রবাহী ও স্পর্শীয় কীটনাশক)

ফিপ্রোনিল 5% এস.সি. এমন এক ধরনের কীটনাশক যা কান্ড ছেদক বা স্টেম বোরার, ব্রাউন প্ল্যান্ট হপার, গ্রীন লিফ হপার, ধানের পাতা মোড়া, ধানের গাল মিজ, হোয়াইট ব্যাকড প্ল্যান্ট হপার ও ধানের হোর্ল ম্যাগট, বাঁধাকপির থ্রিপস DBM, অ্যাফিডস, ও লঙ্কার ফ্রুট বোরার, আখের আর্লি শুট বোরার ও রুট বোরার ও তুলার অ্যাফিডস, জ্যাসিডস, থ্রিপস, হোয়াইট ফ্লাই ও বল ওয়ার্ম এর উপর দারুন কাজ করে।

অনুমোদনঃ

ফসল	পতঙ্গের সাধারণ নাম	মাত্রা/এইচ		জলের দ্রবণ (লিটার)	অন্তিম স্প্রে ও ফসল তোলার মধ্যেকার সময় (দিন)
		এ.আই. (গ্রা.)	এ ফর্মূলেশন (মিলি.)		
বাধাকপি	ডায়মন্ড ব্যাক মথ	40-50	800-1000	500	7
লঙ্কা	থ্রিপস, অ্যাফিড, ফ্রুট বোরার	40-50	800-1000	500	7
ধান	স্টেম বোরার, ব্রাউন প্ল্যান্ট হপার, গ্রিন লিফ হপার, লিফ ফোল্ডার, রাইস গল মিজ, হোর্ল ম্যাগট, হোয়াইট ব্যাকড প্ল্যান্ট হপার	50-75	1000-1500	500	32
আখ	রুট বোরার, আর্লি শুট বোরার,	75-100	1500-2000	500	9 মান্থস
তুলা	অ্যাফিডস, জ্যাসিডস, থ্রিপস, হোয়াইট ফ্লাই	75-100	1500-2000	500	6
তুলা	বল ওয়ার্ম	100	2000	500	6

ব্যবহারের বিধিঃ উদ্ভিদের সুরক্ষা সরঞ্জামঃ বেশী মাত্রায় স্প্রে করার জন্য নজল লাগানো ন্যাপস্যাক, এয়ার প্রেসার ফুট পাম্প, হার্ড রকার অথবা বিদ্যুৎ চালিত স্প্রে মেশিন ব্যবহার করা যেতে পারে।

ব্যবহারের সময়ঃ

ধানঃ প্রতিস্থাপনের 25 থেকে 30 দিনের মধ্যে ফিপ্রোনিলের ব্যবহার করতে হবে।

বাঁধাকপিঃ প্রথম স্প্রে হবে প্রতিস্থাপনের 30 থেকে 35 দিন পর অথবা যখনি আক্রমণের বিষয়টি নজরে পড়বে, যেটি আগে হবে। 7 থেকে 10 দিনের ব্যবধানে 2 থেকে 3টি স্প্রে ফের করুন।

লঙ্কাঃ প্রথম স্প্রে হবে প্রতিস্থাপনের 40 থেকে 50 দিন পর অথবা যখনি আক্রমণের বিষয়টি নজরে পড়বে, যেটি আগে হবে। 7 থেকে 10 দিনের ব্যবধানে 2 থেকে 3টি স্প্রে ফের করুন।

আখঃ প্রাথমিক শুট বোরার এর আক্রমন ঠেকাতে গাছ লাগানোর (DAP) 35 দিন পর এবং রুট বোরারের ক্ষেত্রে গাছ লাগানোর সময়।

ব্যবহারকারীদের সতর্কতাঃ 1. খাদ্যসামগ্রী, খাদ্য সামগ্রীর খালি পাত্র এবং পশু চারা থেকে দূর রাখবেন। 2. আগাছানাশক শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে প্রবেশ না করে সেইদিকে লক্ষ্য রাখবেন, গায়ে চামড়া অথবা মুখ দূরে রাখবেন। 3. সর্বদা হাওয়ার দিকে ব্যবহার করিবেন। বিপরীতে ব্যবহার করবেন না। যাতে শরীরের উপর না এসে পড়ে। 4. ব্যবহারের সময় খাওয়া, পানীয় বস্তু, ধূম্রপান, অথবা চিবোনো কিছু করবেন না। 5. স্প্রে করার সময় খাদ্যগ্রহন, পানীয় গ্রহণ বা ধূমপান করবেন না। 6. ব্যবহার করার সময় নিরাপত্তামূলক পোষাক ব্যবহার করবেন।

সাবধানতাঃ ফিপ্রোনিল মৌমাছির, জলজ জীব এর জন্য বিষাক্ত তাই জলাশয়, মাছ চাষ হয়েছে এমন জলাশয় বা পিসিকালচার হয়েছে এমন এলাকার কাছাকাছি ব্যবহার করা উচিত নয়। তাই মৌমাছিদের মধু সংগ্রহের সময়কালে স্প্রে এড়ানো উচিত।

বিষক্রিয়ার লক্ষণঃ অস্বস্তিভাব, আলস্য, মাংসপেশিতে কম্পন, মৃগী হতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসাঃ 1. গিলে ফেললে গলার ভেতরে সুড়সুড়ি দিয়ে বমি করিয়ে দিন। 2. দূষিত চামড়া এবং পোষাককে পরিষ্কার জলে ধুয়ে নেবেন। 3. ছিটানোর পরে চোখে ভালো ভাবে 10-15 মিনিট থেকে জলের দ্বারা ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখুন। 4. রোগীর নিশ্বাসের সাথে চলে গেলে, সাথে সাথে মুক্ত হাওয়ায় নিয়ে আসুন।

উদ্ভিদে বিষক্রিয়তাঃ প্রস্তাবিত মাত্রায় ব্যবহার করলে কোন বিষক্রিয়তা হয় না।

প্রতিষেধকঃ কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষেধক জানা নেই, লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করান।

খালি পাত্র বিনষ্ট করণ: 1. এটি কীটনাশক নির্মাতা বা ব্যবহারকারীর কর্তব্য যে খালি পাত্র বা প্যাকেটের বিনষ্টকরন যাতে সুসংবদ্ধ ভাবে করা যায় তা নিশ্চিত করা। এর থেকে যাতে পরিবেশ দূষিত না হয় সেদিকেও নজর দেওয়া জরুরী। 2. ব্যবহার করা হয়েছে এমন পাত্র/প্যাকেট এদিকে ওদিক ফেলবেন না। 3. পাত্র/প্যাকেটকে বিনষ্ট করার জন্য জনবসতি থেকে দূরে মাটিতে পুঁতে দিন।

সংরক্ষণের শর্তাবলীঃ 1. কীটনাশকের পাত্রকে খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা স্থানে সংরক্ষন করবেন না। এটিকে আলাদা ঘরে বা আলাদা ভাবে তালাবন্ধ আলমারিতে রাখুন। 2. এই ধরণের কক্ষ মজবুত, শুকনো, সূর্যালোক বা হাওয়া চলাচল করতে পারে এবং বাষ্প থেকে যাতে দূষণ না ছড়ায় তা দেখতে হবে।

রাসায়নিক গঠনঃ

ফিপ্রোনিল এ.আই (ন্যুনতম সুদ্ধতা 90%)	5.00% ওজন/ওজন
সূর্যমুখী তেল	5.00% ওজন/ওজন
ওয়েটিং এজেন্ট (ন্যাপথালিন সালফোনেট)	3.00% ওজন/ওজন
সাসপেন্ডিং এজেন্ট (সোডিয়াম লিগনো সালফোনেট)	8.00% ওজন/ওজন
স্টিকিং/স্টেবিলাইজিং এজেন্ট (কার্বোক্সি মিথাইল সেলুলোজ)	4.00% ওজন/ওজন
ডিসপার্সিং এজেন্ট (সোডিয়াম সল্ট অফ ডিনাফথিল মিথানল সালফোনিক অ্যাসিড)	3.00% ওজন/ওজন
ব্লেন্ড অফ ইমালসিফায়ার (প্রোপ্রাইটোরি ব্লেন্ড অফ অ্যালকিল ফেনল ইথোক্সিলেট, ট্রাইগ্লিসারাইড ইথোক্সাইলেট, ক্যালসিয়াম অ্যালকিল বেঞ্জাইল সালফোনেট)	8.00% ওজন/ওজন
জল	পর্যাপ্ত মাত্রা %
মোটঃ	**100.00% ওজন/ওজন**

সতর্কতাঃ 1. লেবেল ও লিফলেটে নির্দেশিত ফসল ও কীটপতঙ্গ ব্যতিত অন্য কোন ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য নয়। 2. ফসল-কাটার পর ব্যবহারের জন্য নয়। 3. লিফলেটে দেওয়া নির্দেশ মতো ব্যবহারের পর খালি পাত্র বিনষ্ট করে ফেলতে হবে। 4. পলিহাউস এবং বদ্ধ স্থানে ব্যবহার ও উপযুক্ত মাত্রার জন্য-লিফলেট দেখুন।

Bengali

ইক্সাছ

ফিপ্র'নিল 5% SC

(অন্তর্প্ৰৱাহী আৰু স্পৰ্শীয় কীটনাশক)

ফিপ্র'নিল 5% SC হৈছে এবিধ কীটনাশক যিটো ধান খেতিত ষ্টেম ব'ৰাৰ, ব্ৰাউন প্লেণ্ট হ'পাৰ, গ্ৰীণ লীফ হ'পাৰ, ৰাইচ লীফ ফ'ল্ডাৰ, ৰাইচ গ'ল মিজ, হোৱাইট বেকেড প্লেণ্ট হ'পাৰ, হ'ৰ্ল মেগ'ট আদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। লগতে বন্ধাকবিৰ ডিবিএম, জলকীয়াৰ থ্ৰিপছ, এফিড আৰু ফ্ৰুট ব'ৰাৰ, কুঁহিয়াৰৰ আৰ্লি শ্বুট ব'ৰাৰ আৰু ৰুট ব'ৰাৰ আৰু কপাহ খেতিৰ এফিড, জেছিড, থ্ৰিপছ, হোৱাইট ফ্লাই আৰু ব'ল ৱৰ্ম নিয়ন্ত্ৰণ কৰে।

অনুমোদন সমূহঃ

শস্য	ৰোগৰ সাধাৰণ নাম	ড'জ/হেক্টৰ		পানীত দ্ৰৱণ (লিটাৰ)	শেষবাৰ ছটিওৱাৰ পৰা দোৱালৈকে অপেক্ষাৰ সময় (দিন)
		এ.আই. (গ্ৰাম)	ফৰ্মূলেশ্যন (মিলি)		
বন্ধাকবি	ডায়মণ্ড বেক ম'থ	40-50	800-1000	500	7
জলকীয়া	থ্ৰিপছ, এফিড, ফ্ৰুট ব'ৰাৰ	40-50	800-1000	500	7
ধান	ষ্টেম ব'ৰাৰ, ব্ৰাউন প্লেণ্ট হ'পাৰ, গ্ৰীণ লীফ হ'পাৰ, লীফ ফ'ল্ডাৰ, ৰাইচ গ'ল মিজ, হোৱাইট বেকেড প্লেণ্ট হ'পাৰ, হ'ৰ্ল মেগ'ট, হোৱাট বেকেড প্লেণ্ট হ'পাৰ	50-75	1000-1500	500	32
কুঁহিয়াৰ	ৰুট ব'ৰাৰ, আৰ্লি শ্বুট ব'ৰাৰ	75-100	1500-2000	500	9 মাহ
কপাহ	এফিড, জেছিড, থ্ৰিপছ, হোৱাইট ফ্লাই	75-100	1500-2000	500	6
কপাহ	বল ৱ'ৰ্ম	100	2000	500	6

ব্যৱহাৰৰ নিৰ্দেশঃ উদ্ভিদ সুৰক্ষা সঁজুলি: হাই ভলিউম ন'জল যুক্ত স্প্ৰেয়াৰ যেনে নেপ-ছেক, এয়াৰ প্ৰেছাৰ ফুট পাম্প, হাৰ্ড ৰকাৰ বা পাৱাৰ অপাৰেটেড স্প্ৰেয়িং মেচিন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি।

প্ৰয়োগৰ সময়ঃ

ধানঃ ফিপ্র'নিলৰ প্ৰয়োগ ৰোপণৰ 25ৰ পৰা 30 দিনৰ ভিতৰত দিব লাগে।

বন্ধাকবিঃ প্ৰথম স্প্ৰেটো ৰোপণৰ 30-35 দিনৰ ভিতৰত বা কীটৰ প্ৰভাব, যিটোৱেই আগতে দেখা যায়, তেতিয়া দিয়া উচিত। 7 ৰ পৰা 10 দিনৰ ব্যৱধানত 2ৰ পৰা 3 বাৰ স্প্ৰে পুনৰাবৃত্তি কৰিব।

জলকীয়াঃ প্ৰথম স্প্ৰেটো ৰোপণৰ 40-50 দিনৰ ভিতৰত বা কীটৰ প্ৰভাব, যিটোৱেই আগতে দেখা যায়, তেতিয়া দিয়া উচিত। 7 ৰ পৰা 10 দিনৰ ব্যৱধানত 2ৰ পৰা 3 বাৰ স্প্ৰে পুনৰাবৃত্তি কৰিব।

কুঁহিয়াৰঃ আৰ্লিয়াৰ শ্বুট ব'ৰাৰ ফ'লিয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ৰোপণৰ (DAP) 35 দিন পাছত আৰু ৰুট ব'ৰাৰৰ বাবে ৰোপণৰ সময়ত মাটি ভিজাওঁতে।

ব্যৱহাৰকৰ্তাৰ বাবে সতৰ্কতাঃ 1. খাদ্য সামগ্ৰী, খোলা বাচন আৰু পশুৰ আহাৰৰ পৰা দূৰত ৰাখিব। 2. মুখ, ছাল আৰু চকুৰ পৰা বচাওক। 3. ছটিওৱাৰ পাছত বাষ্পখিনি উশাহত ভিতৰলৈ যাবলৈ নিদিব। বতাহৰ দিশতে সিঞ্চন কৰক। 4. দূষিত কাপোৰ আৰু শৰীৰৰ অংগবিলাক ভালদৰে চাবোনেৰে ধোৱক। 5. ব্যৱহাৰ কৰোঁতে ধূম্ৰপান, খোৱা, পানী বা আন একো চোবাব নালাগে। 6. ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষাত্মক কাপোৰ পিন্ধিব।

সতৰ্কবাণীঃ ফিপ্র'নিল জলজ প্ৰাণী আৰু মৌমাইখিৰ বাবে বিষাক্ত, সেয়ে জলজ কৃষি বা মৌমাখিৰ ফুৰাৰ সময়ত প্ৰয়োগ নকৰিব।

বিষৰ লক্ষণঃ খজুৰতি, এলাহ, পেশীৰ কঁপনি, কনভালশ্যন আদি।

প্ৰাথমিক চিকিৎসাঃ 1. যদি গিলি পায়, তেতিয়া বমি নকৰাব বা তৰল পদাৰ্থ নিদিব। 2. যদি কাপোৰ আৰু ছাল দূষিত হয়, তেন্তে দূষিত কাপোৰ খুলি পেলাওক আৰু ছালখন যথেষ্ট চাবোন আৰু পানীৰে ধুই পেলাব। 3. যদি চকু দূষিত হয়, তেতিয়া অনেক পৰিমাণত ছেলাইন/পৰিস্কাৰ পানীৰে প্ৰায় 10-15 মিনিট ধুব। 4. যদি উশাহত ভিতৰলৈ গৈছে, তেন্তে ৰোগীগৰাকীক বিশুদ্ধ বতাহলৈ লোলি যাওক।

ফায়টাটোক্সিটিঃ প্ৰস্তাৱিত মাত্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰলে কোন বিষক্ৰিয়তা হয় না।

বিষ প্ৰতিষেধকঃ কোনো নিৰ্দিষ্ট এণ্টিড'টৰ কথা জনা নাযায়, সেয়ে লক্ষণ অনুসৰি উপচাৰ কৰিব। এলাৰ্জী নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ এণ্টিহিষ্টেমাইন দিব পৰা যায়।

ব্যৱহৃত পাত্ৰৰ স্কিাষণঃ 1. পৰিবেশ আৰু জল প্ৰদূষণ নহ'বৰ বাবে কীটনাশকৰ নিৰ্মাতা, ফৰ্মূলেটৰ আৰু অপাৰেটৰৰ দায়িত্ব যে পেকেজসমূহ বা অতিৰিক্ত সামগ্ৰীবিলাক তেওঁলোকে নিৰাপদভাৱে নিষ্পত্তি কৰে। 2. ব্যৱহৃত বাচনখিনি/পেকেজ বাহিৰত নাৰাখিব, যাতে পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। 3. পাত্ৰটো ভাঙি পেলাই বসতিৰ পৰা আঁতৰত পুতি পেলাব।

সংৰক্ষণৰ পৰিস্থিতিঃ 1. কীটনাশক ৰখা পেকেজসমূহ পৃথক কোঠালি বা ঘৰত সংৰক্ষণ কৰিব, বিশেষকৈ অন্য সামগ্ৰী সংৰক্ষণ কৰা স্থানৰ পৰা আঁতৰত, আৰু আহাৰ আদি সামগ্ৰীখিনি কীটনাশকৰ মাত্ৰা আৰু প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পৃথক আলমাৰিত তলা-চাবি মাৰি ৰাখিব লাগে। 2. কীটনাশক ৰাখিবলগীয়া কোঠালি বা স্থানখিনি ভালদৰে নিৰ্মিত, শুকান, ভালদৰে পোহৰ আৰু বায়ু চলাচল কৰা তথা পৰ্যাপ্ত আয়তনৰ হোৱা উচিত যাতে বাষ্পীভূত হৈ দূষিত হৈ নপৰে।

ৰাসায়নিক সংৰচনাঃ

ফিপ্র'নিল এ.আই. (নিম্নতম বিশুদ্ধতা 90%)	5.00% w/w
ছানফ্লাৱাৰ অইল	5.00% w/w
বেটিং এজেণ্ট (নেপথালিন ছালফ'নেট)	3.00% w/w
ছাছপেণ্ডিং এজেণ্ট (ছডিয়াম লিগন' ছালফনেট)	8.00% w/w
ষ্টিকিং/ষ্টেবিলাইজিং এজেণ্ট (কাৰ্বক্সি মিথাইল চেলুল'জ)	4.00% w/w
ডিছপাৰ্ছিং এজেণ্ট (ছডিয়াম ছল্ট অৱ ডাইনেপথাইল মিথানল ছালফনিক এচিড)	3.00% w/w
ব্লেণ্ড অৱ ইমালছিফায়াৰছ (প্ৰপ্ৰিয়েটেৰী ব্লেণ্ড অৱ এলকাইল ফিন'ল ইথ'ক্সিলেট, ট্ৰাইগ্লিচাৰাইড ইথ'ক্সিলেট, কেলচিয়াম এলকাইল বেঞ্জাইল ছালফ'নেট)	8.00% w/w
পানী	কিউ.এস. %
মোটঃ	**100.00% w/w**

সতৰ্কতাবাণীঃ 1. লেবেল বা লীফলেটত উল্লেখ নথকা শস্যত প্ৰয়োগ নকৰিব। 2. শস্য ছপোবাৰ পাছৰ প্ৰয়োগ হিচাপে ব্যৱহাৰ নকৰিব। 3. লীফলেটত দিয়া অনুসৰি প্ৰয়োগৰ পাছত পাত্ৰটো নষ্ট কৰি পেলাব। 4. পলি-হাউছ আৰু আবদ্ধ অঞ্চলৰ নিৰ্দেশ আৰু ড'জৰ বাবে- লীফলেটখন চাওক।

Asami

اکسس

فپرونیل %5 ایس سی

(اندرجاکےاورلگتےہی اثرکرنےوالا دود کش)

فپرونیل %5 ایس سی ایک ایسا دودکش ہےجس کا استعمال جڑوں کوچھیدنےوالے، پودوں کےبھورے ٹڈے، پتیوں کےہرے ٹڈے، دھان کی پتیوں کوفولڈکرنےوالے، دھا ن کےگال مج، سفید پیٹھ والے ٹڈے، دھا ن میں گوبھ کی مکھی، بند گوبھی میں ہیرےکی پیٹھ والے کیڑے، مرچی میں قملے، رس چوس، پھل کو چھیدنےوالےکیڑوں، گنّے کی ننھی جڑوں اورجڑوں کوچھیدنےوالےکیڑوں اور کپاس میں رس چوس ، جوں، قملے، سفید مکھی اورسنڈی کو کنٹرول کرنے کے لئے کیا جاتا ہے –

سفارش :

فصل	بیماری کا عام نام	خوراک/ہکٹر		پانی میں گھول (ltr.)	انتظارکی مدت آخری چھڑکاؤ سےکٹائی تک (دنوں میں)
		اے آئی (gm)	محلول (ml)		
بند گوبھی	ہیرےکی پیٹھ والے کیڑے	40-50	800-1000	500	7
مرچی	قملے، رس چوس، پھل کو چھیدنےوالےکیڑے	40-50	800-1000	500	7
دھا ن	تنےکو چھیدنے والےکیڑے، پودوں کےبھورے ٹڈے، پتیوں کےہرے ٹڈے، پتیوں کوفولڈکرنےوالےکیڑے، دھا ن کےگال مج، گوبھ کی مکھی، سفید پیٹھ والے ٹڈے	50-75	1000-1500	500	32
گنا	جڑوں کوچھیدنےوالےکیڑے، ننھی جڑوں کوچھیدنےوالے کیڑے،	75-100	1500-2000	500	9 مہینے
کپا س	رس چوس، جوں، قملے، سفید مکھی	75-100	1500-2000	500	6
کپا س	سنڈی	100	2000	500	6

طریقہ استعما ل: پودوں کی حفاظت کے آلات : نوزل لگےہوئےہائی ویلوم اسپریئرجیسے نیپ سیک، ایرپریسرفٹ پمپ، ہارڈ روکریا پاورسےچلنےوالی مشین کا استعمال کیا جاسکتا ہے-

استعمال کا وقت:

دھا ن: روپائی کے بعد فپرونیل کا چھڑکاؤ 25 سے 30 دنوں کےدرمیا ن ہونا چاہئے-

بند گوبھی: پہلا چھڑکاؤ روپائی کے بعد 30 سے 35 دنوں کےدرمیا ن ہونا چاہئےیا کیڑے نظرآنے لگیں- ان میں جو بھی پہلےہو- 7 سے 10 د ن کےوقفےسےاسے 2 یا 3 با رچھڑکاؤ کریں –

مرچی: پہلا چھڑکاؤروپائی کے بعد 40 سے 50 دنوں کےدرمیا ن ہوناچاہئےیا کیڑے نظرآنےلگیں- ان میں جو بھی پہلےہو- 1 سے10 د ن کےوقفےسےاسے2 سے 3 با رچھڑکاؤکریں –

گنا: ننھی جڑوں کوچھیدنےوالےکیڑوں کے لئےفصل اگانے کے 35 دن بعد اور جڑچھیدنے والے کیڑوں کے لئے اسے مٹی میں ملائیں –

احتیاط : 1- اسے کھانے پینے کی چیزوں، کھانےپینےکےخالی برتنوں اور جانوروں کے چارے سے دور رکھیں- 2 - اسےآنکھ ،منہ اورجلد پرنہ لگنےدیں- 3- اس کی بھاپ کو نگلنےسےبچیں اورہواکی سمت میں اسپرے کریں- 4- کام ختم ہونےکےبعدآلودہ کپڑوں اورمتاثرہ جسم کوصابن سےاچھی طرح دھلیں- 5- اسپرےکرتےوقت سگریٹ نوشی، کھانےپینےاورکسی چیزکو چبانے سےبچیں– 6- اسپرے کرتےوقت پورے حفاظتی کپڑے پہنیں –

انتباہ: یا مچھلیوں اورپانی کی مصنوعات کے لئے بھی زہریلا ہے اس لئے اسے مچھلی پالن اور پانی کی جگہوں پراستعمال نہ کریں- یہ شہد کی مکھیوں کے لئے زہریلا ہے اس لئے جب مکھیاں پھول چوسنے میں سرگرم ہوں اس کا اسپرے نہ کریں-

زہرکی علامات: چڑچڑا پن، سستی، اعصاب میں کپکپاہٹ اورتشنج پیدا ہوسکتا ہے-

ابتدائی طبی علاج :1- اگرنگل لیا ہوتومریض کوتازہ ہوامیں لےجائیں– 2- پیٹ میں چلی گئی ہوتوگدی پر ہلکی ضرب لگا کےقئی کرائیں- 3- آلودہ کپڑوں کواتارکےآلودہ جلداورکپڑوں کوصابن اورپانی سےاچھی طرح دھلیں- 4- اگر آنکھوں میں لگ جائےتواسے 15 منٹ تک صاف پانی سےدھلیں-

پودوں کی سمیت: اگراوپربتائےگئےطریقوں سےاستعمال کیا گیا تو اس میں کوئی –

تریاق: اس کا کوئی خاص تریاق نہیں ہے- علامات کےمطا بق علاج کریں-

خالی ڈبوں کو ضائع کرنا: 1- یہ دودکش بنانےوالوں اوراستعمال کرنےوالوں کی ذمہ داری بنتی ہےکہ وہ خالی ڈبوں اورزائد مواد کواس طرح ضائع کریں یا دھلیں کہ اس سے ماحولیات اورپانی آلودہ نہ ہو– 2- خالی ڈبوں کےدوبارہ استعمال سےبچنےکےلئےانہیں باہرنہ ڈال دیں- 3 – ڈبوں کوتوڑکےآبادی سےدوردفن کردیں –

ڈبوں کواسٹورکرنا –1- تیارشدہ مواد کےڈبوں کوان کےاصل ڈبوں میں الگ کمرے یا الماری میں کھانےپینےکی چیزوں سےدورتالے چابی کےاندررکھیں– اسے بچوں، گھریلوجانوروں اور پالتو کتوں کی دسترست سےدوررکھیں– 2- ان دودکش مواد کوخشک، روشن ، کشادہ اورہوا دارجگہ میں رکھیں تاکہ اس کی بھاپ سےآلودگی نہ پیدا ہو-

کیمیائی اجزائے ترکیبی:

فپرونیل اےآئی (کم ازکم %90 خالص ہو)	%5.00 ڈبلو/ ڈبلو
سورج مکھی کا تیل	%5.00 ڈبلو/ ڈبلو
وٹنگ ایجنٹ (نیپتھا لین سلفونیٹ)	%3.00 ڈبلو/ ڈبلو
سسپنڈ نگ ایجنٹ (سوڈیم لگنوسلفونیٹ)	%8.00 ڈبلو/ ڈبلو
اسٹیکنگ/ اسٹیبلائزنگ (کاربوکسی میتھائیل سیلولوز)	%4.00 ڈبلو/ ڈبلو
ڈسپرسنگ ایجنٹ (سوڈیم سالٹ آف ڈیناپ تھائیل میتھا نول سلفونک ایسڈ)	%3.00 ڈبلو/ ڈبلو
بلنڈ آف ایملسی فائر(پروپرائٹری بلنڈ آف الکائل فینول اتھوکسی لیٹ، ٹریگ لائڈ سرائڈ اتھوکسی لیٹ، کیلسیم الکائل بنزائل سلفونیٹ)	%8.00 ڈبلو/ ڈبلو
پانی	Q.S. %
ٹوٹل:	**%100.00 ڈبلو/ ڈبلو**

وارننگ: 1- اس کا استعمال صرف انہیں فصلوں اورکیڑوں پرکریں جن کا ذکرلیبل یا پرچی میں کیا گیا ہو- 2- فصل کی کٹائی کےبعد اس کا استعمال نہ کریں- 3– پرچی میں دی گئی ہدایت کےمطابق خالی ڈبوں کوضائع کرد یں– 4- پولی اوربند مکانوں کے لئے پرچی میں درج خوراک اورہدایات پرعمل کریں-

Urdu

READ ENTIRE LEAFLET BEFORE USE.

प्रयोग से पहले पूरी पत्रिका ध्यानपूर्वक पढ़े।

IXUS®

Fipronil 5% SC

(Systemic and Contact Insecticide)

ईक्सस

फिप्रोनिल 5% एस.सी.

(अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक)

Manufactured & Marketed By :
M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd.,
175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri
Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda
Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.

निर्माता एवं विपणनकर्ता :
मे. रोटैम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड,
१७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग,
कलीना, सांताक्रुज (पू.), होंडा शोरुम के पीछे,
मुंबई, महाराष्ट्र – ४०००९८।

Factory : G-155, RIICO Industrial Area,
Sanwad-Fatehnagar, Tal.- Mavli, Dist.-
Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी : जी–१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया,
सनवाड–फतेहनगर, तेहसिल–मावली,
जीला–उदयपूर – ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaint contact, Customer Care Executive at Registered office address,
Tel: 180030003335,
Email: contactin@albaughllc.com

For Agricultural Use

कृषि उपयोग के लिए



ALBAUGH™

your alternative

IXUS®

Fipronil 5% SC

(Systemic and Contact Insecticide)

Fipronil 5% SC is an insecticide which is used to control insects like stem borer, brown plant hopper, green leaf hopper, rice leaf folder, rice gall midge, white backed plant hopper, whorl maggot in rice. DBM in cabbage, thrips, aphids & fruit borer in chilli, early shoot borer & root borer in sugarcane and Aphids, Jassids, Thrips, White fly and Boll worm in Cotton.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA A.I. (gm)	Dosage/HA Formulation (ml)	Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (days)
Cabbage	Diamond back moth	40-50	800-1000	500	7
Chilli	Thrips, Aphid, Fruit borer	40-50	800-1000	500	7
Rice	Stem borer, Brown plant hopper, Green leaf hopper, leaf folder, Rice gall midge, Whorl maggot, White backed plant hopper	50-75	1000-1500	500	32
Sugarcane	Root borer, Early shoot borer	75-100	1500-2000	500	9 months
Cotton	Aphids, Jassids, Thrips, White fly	75-100	1500-2000	500	6
Cotton	Boll Worm	100	2000	500	6

Direction of use: Plant Protection Equipments: High volume nozzle fitted to sprayers like knap-sack, Air pressure Foot Pump, Hard rocker or power operated spraying machine may be used.

Time of application:

Rice: The Fipronil application must be given between 25 to 30 days after transplanting.

Cabbage: The first spray is to be given at 30 to 35 days after transplanting or when pest incidence is noticed, which-ever is earlier. Repeat 2 to 3 sprays at 7 to 10 days interval.

Chilli: First spray is to be given at 40 to 50 days after transplanting or when pest incidence is noticed, which-ever is earlier. Repeat 2 to 3 sprays at 7 to 10 days interval.

Sugarcane: For earlier shoot borer foliar application at 35 days after planting (DAP) and for root borer drenching of soil at planting.

Precautions: 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Warning: Fipronil is toxic to aquatic animals & honey bee hence avoid the use near aquatic environment & during to reasing period of honey bee.

Symptoms of Poisoning: Irritability, lethargy, muscle tremors, convulsions may occur.

First Aid: 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity: The product is not phytotoxic when used as per recommendations.

Antidote: No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of Used Container: 1. It shall be the duty of manufactures formulators and operator to dispose packages or surplus materials and washing from the machine and container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and burried away from habitation.

Storage Conditions: 1. The packages containing the Insecticides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly food articles of or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the nature of the Insecticide. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticides shall be well lit, well built, dry, cool, ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition:

Fipronil A.I. (Minimum purity 90%)	5.00% w/w
Sunflower oil	5.00% w/w
Wetting agent (Naphthalene sulfonate)	3.00% w/w
Suspending agent (Sodium Ligno sulphonate)	8.00% w/w
Sticking/Stablizing agent (Carboxy Methyl Cellulose)	4.00% w/w
Dispersing agent (Sodium salt of Dinaphthyl methanol sulphonic acid)	3.00% w/w
Blend of emulsifiers (Proprietary blend of alkyl phenol ethoxylate, triglyceride ethoxylate, calcium alkyl benzyl sulphonate)	8.00% w/w
Water	Q.S. %
Total:	**100.00% w/w**

Cautionary Statement: 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on this label/leaflets. 2. Not to be used for Post-Harvest Applications. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly houses and confined area-refer the leaflet.

ईक्सस

फिप्रोनिल 5% एस.सी.

(अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक)

फिप्रोनिल 5% एस.सी. एक उदरीय, स्पर्शीय एवं अंतर्प्रवाही असरवाला कीटनाशक है। इसकी सिफारिश धान में लगने वाले कीटों जैसे तना छेदक, भूरा पौध का फुदका, हरी पत्ती का फूदका, धान का पत्ता लपेटक, गाल मिज, गोभ की मक्खी, बंद गोभी के हीरा पीठ पतंगा कीट एवं मिर्ची के चुरदा, माहू और फल छेदक, गन्ना के अग्रिम तना छेदक व जड़ छेदक एवं कपास के चुरदा, तेला, माहू, सफेद मक्खी एवं डोडे की सुंडी के नियंत्रण के लिए की गयी है।

उपयोगः

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व (ग्राम)	प्रति हैक्टेयर मात्रा संरचना (मि.ली.)	पानी की मात्रा (लीटर)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिन)
बंदगोभी	हीरा पीठ पतंगा	40–50	800–1000	500	7
मिर्ची	चुरदा, माहू, फल छेदक	40–50	800–1000	500	7
धान	तना छेदक, भूरा फुदका, हरे पत्तों का फुदका, पत्ता मोड़क, गाल मिज, गोभ की मक्खी, सफेद पीठ का पौध फुदका	50–75	1000–1500	500	32
गन्ना	जड़ छेदक, अग्रिम तना छेदक	75–100	1500–2000	500	9 महीने
कपास	चुरदा, तेला, माहू, सफेद मक्खी	75–100	1500–2000	500	6
कपास	डोडे की सुंडी	100	2000	500	6

उपयोग के लिए निर्देशः कृषि रक्षा संबंधी यंत्रः कीटों का सफलता पूर्वक नियंत्रण के लिए उच्च क्षमता के छिड़काव यंत्र जैसे की नैपसेक, दाबयुक्त हवा, पांव से चलने का पंप या यंत्र शक्ति से चलने वाले छिड़काव यंत्र जुड़े हों।

प्रयोग का समयः

धानः फिप्रोनिल 5% एस.सी. का छिड़काव धान रोपाई के बाद 25 से 30 दिन के अंदर करना चाहिए।

बंद गोभीः पहला छिड़काव रोपाई के 30 से 35 दिन बाद करें या फसल में कीड़ा लगने के बाद, दोनों में जो भी पहले हो। पुनः 2 से 3 बार छिड़काव 7 से 10 दिनों के अंतराल पर करें।

मिर्चीः पहला छिड़काव रोपाई के 40 से 50 दिन बाद करें या फसल में कीड़ा लगने के बाद, दोनों में जो भी पहले हो। पुनः 2 से 3 बार छिड़काव 7 से 10 दिनों के अंतराल में करें।

गन्नाः पूर्व तना छेदक पर फसल उगाने के 35 दिन बाद और जड़ छेदक का मिट्टी में मिलाकर रोपण करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियांः 1. खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। 2. मुंह, त्वचा और आंखों के संपर्क से बचाएं। 3. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अंदर जाने से बचाएं। हवा की दिशा में छिड़काव करें। 4. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। 5. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। 6. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

चेतावनीः मधुमक्खियों एवं जलीय जीवों के लिए विषाक्त है, अतः इसका उपयोग जलीय जीवों एवं परागण के समय न करें।

विष के लक्षणः चिड़चिड़ापन, आलस्य, मांसपेशियों में कंपन, झटके (मिर्गी) हो सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्साः 1. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें, यह क्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाये। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराये। 2. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़े उतार दें और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। 3. यदि आंखें दूषित हो जाए तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग 10–15 मिनट तक धोएं। 4. यदि सांस द्वारा अंदर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जाएं।

पौध विशाक्तताः सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौध विशाक्त नहीं है।

विष नाशकः कोई विशिष्ट विष नाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटाराः 1. कीटनाशक निर्माताओं का कर्तव्य है कि डिब्बों या पात्रों को तोड़–फोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए। 2. प्रयोग किए गए डिब्बों को दुबारा उपयोग के लिए बाहर खुला न छोड़ें। 3. डिब्बों या बची हुई कीटनाशक तथा यंत्रों के धोवन का निपटारा इस प्रकार करें कि जिससे आस–पास की आबादी व पीने का पानी विषैला न हो।

संग्रहण की शर्तेंः 1. कीटनाशक के डिब्बों का संग्रहण अलग कमरे या स्थान पर, अन्य वस्तुओं विशेषकर खाद्य पदार्थों के संग्रहण कक्ष से दूर किया जाना चाहिए या कीटनाशक की मात्रा और स्वभाव पर निर्भर करते हुए डिब्बों को अलग अलमारी में ताला चाबी लगाकर रखें। 2. संग्रहण का कमरा लंबा, चौड़ा, मजबूत, साफ खुला तथा हवादार होना चाहिए। कमरे में रोशनी का पूर्ण प्रबंध होना चाहिए। कमरा शुष्क तथा ठंडा होना चाहिए जिससे वाष्प द्वारा वायु प्रदूषण न हो सके।

रासायनिक संरचनाः

फिप्रोनिल ए.आई. (न्यूनतम शुद्धता 90%)	5.00% भार/भार
सूरजमूखी तेल	5.00% भार/भार
वैटिंग एजेंट (नैथ्थालीन सल्फोनेट)	3.00% भार/भार
सस्पैंडिंग एजेंट (सोडियम लिग्नो सल्फोनेट)	8.00% भार/भार
स्टिंकिंग/स्टेबिलाइजिंग एजेंट (कारबोक्सी मिथाइल सेल्युलोज)	4.00% भार/भार
डिसपर्सिंग एजेंट (सोडियम साल्ट ऑफ डाईनेप्थाईल मेथानोल सल्फोनिक अम्ल)	3.00% भार/भार
ब्लेंड ऑफ एमल्सीफायर्स (प्रोपराईटरी ब्लेंड ऑफ एल्किईल फीनोल एथ्रोक्सीलेट ट्राईरग्लीसराइड एथोक्सीलेट, कैल्सियम एल्काईल बैन्जाईल सल्फोनेट)	8.00% भार/भार
पानी	पर्याप्त मात्रा %
कुलः	**100.00% भार/भार**

सावधानियां कथनः 1. इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। 2. फसल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें। 3. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बे) को नष्ट कर दें। 4. पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक–पर्ची देखें।

ਇਕਸਸ

ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ 5% ਐਸ.ਸੀ.

(ਅੰਤਰਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ)

ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ 5% ਐਸ.ਸੀ. ਇੱਕ ਪੇਟ, ਸਪਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਸਰ ਵਾਲਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਾ ਛੇਦਕ, ਭੂਰਾ ਪੌਦੇ ਦਾ ਟਿੱਡਾ, ਹਰੀ ਪੱਤੀ ਦਾ ਟਿੱਡਾ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟਕ, ਗਾਲ ਮਿਜ, ਗੋਭ ਦੀ ਮੱਖੀ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਦੇ ਹੀਰਾ ਪਿੱਠ ਪਤੰਗਾ ਕੀਟ ਅਤੇ ਮਿਰਚੀ ਦੇ ਚੁਰਦਾ, ਤੇਲਾ ਅਤੇ ਮਾਹੋਂ ਅਤੇ ਫਲ ਛੇਦਕ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਾ ਛੇਦਕ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਚੁਰਦਾ, ਤੇਲਾ, ਮਾਹੋਂ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਟਿੰਡੇ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਪਯੋਗਃ

ਫ਼ਸਲ	ਕੀਟ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਨਾਂਅ	ਮਾਤਰਾ/ਹੈਕ ਏ.ਆਈ. (ਗ੍ਰਾ.)	ਮਾਤਰਾ/ਹੈਕ ਫਾਰਮੁਲੇਸ਼ਨ (ਮਿ.ਲੀ.)	ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ (ਲੀਟਰ)	ਅੰਤਮ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਾਲ (ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ)
ਬੰਦਗੋਭੀ	ਹੀਰਾ ਪਿੱਠ ਪੰਤਗਾ	40–50	800–1000	500	7
ਮਿਰਚ	ਚੁਰਦਾ, ਮਾਹੋਂ, ਫਲ ਛੇਦਕ	40–50	800–1000	500	7
ਝੋਨਾ	ਤਨਾ ਛੇਦਕ, ਭੂਰਾ ਟਿੱਡਾ, ਹਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਟਿੱਡਾ, ਪੱਤਾ ਮੋੜਕ, ਗਾਲ ਮਿਜ, ਗੋਭ ਦੀ ਮੱਖੀ, ਚਿੱਟੀ ਪਿੱਠ ਦਾ ਪੌਦ ਟਿੱਡਾ	50–75	1000–1500	500	32
ਗੰਨਾ	ਜੜ ਛੇਦਕ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਾ ਛੇਦਕ	75–100	1500–2000	500	9 ਮਹੀਨੇ
ਕਪਾਹ	ਚੁਰਦਾ, ਤੇਲਾ, ਮਾਹੋਂ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ	75–100	1500–2000	500	6
ਕਪਾਹ	ਟਿੰਡੇ ਦੀ ਸੁੰਡੀ	100	2000	500	6

ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਃ ਖੇਤੀ ਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਯੰਤਰ : ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਯੰਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਪਸੈਕ, ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਹਵਾ, ਪੈਰ ਨਾਲ ਚਲਣ ਦਾ ਪੰਪ ਜਾਂ ਯੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਛਿੜਕਾਅ ਯੰਤਰ ਜੁੜੇ ਹੋਣ।

ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂਃ

ਝੋਨਾਃ ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ 5% ਐਸ.ਸੀ. ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਝੋਨਾ ਰੁਪਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ 25 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੰਦ ਗੋਭੀਃ ਪਹਿਲਾ ਛਿੜਕਾਅ ਰੁਪਾਈ ਦੇ 30 ਤੋਂ 35 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ। ਦੋਬਾਰਾ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਛਿੜਕਾਅ 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਕਰੋ।

ਮਿਰਚਃ ਪਹਿਲਾ ਛਿੜਕਾਅ ਰੁਪਾਈ ਦੇ 40 ਤੋਂ 50 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ। ਦੋਬਾਰਾ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਛਿੜਕਾਅ 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਕਰੋ।

ਗੰਨਾਃ ਅਗੇਤੇ ਤਨਾ ਛੇਦਕ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ ਦੇ 35 ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜੜ ਛੇਦਕ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੋਪਣ ਕਰੋ।

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂਃ 1. ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖੋ। 2. ਮੂੰਹ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅਖੱਾਂ ਦੇ ਛੋਹ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। 3. ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਭਾਫ ਨੂੰ ਸਾਹ ਰਾਹੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀਓ। ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। 4. ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਬਾਦ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਧੋਵੋ। 5. ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧੁਮਰਪਾਨ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਚਬਾਉਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। 6. ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਸੁਰਖਿਅੰਤ ਕਪੜੇ ਪਾਓ।

ਚਿਤਾਵਨੀਃ ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ ਮਧੁਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੇੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਮਧੁਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਪ੍ਰੇ ਨਾ ਕਰੋ।

ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣਃ ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ, ਆਲਸ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਬਣੀ, ਝਟਕੇ (ਮਿਰਗੀ) ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁਢਲਾ ਇਲਾਜ਼ਃ 1. ਜੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇਵਿਚ ਉਂਗਲ ਪਾ ਕੇ ਉਲਟੀ ਕਰਾਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਲਟੀ ਸਾਫ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੱਦ ਤਕ ਇਸ ਕ੍ਰਿਯਾ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਰੋਗੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਾਓ। 2. ਜੇ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦੀਓ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਚੋਖੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ। 3. ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੋਖੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸੇਲਾਈਨ/ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਟੋ-ਘੱਟ 10–15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਧੋਵੋ। 4. ਜੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਓ।

ਪੌਦਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣਃ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੌਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜ਼ਹਿਰ ਤੋੜਃ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾਃ 1. ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲਕਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੱਬਿਆਂ/ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੁਗਿਰਦਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਏ। 2. ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੱਬਿਆਂ/ਪੈਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਂਜ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 3. ਡੱਬਿਆਂ/ਪੈਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂਃ 1. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਲਗ ਤੋਂ ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁੱਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਸ਼ਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਘਟਨਃ

ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ ਏ ਆਈ (ਘੱਟੋਘੱਟ ਸ਼ੁੱਧਤਾ 90%)	5.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ	5.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਵੈਟਿੰਗ ਏਜੰਟ (ਨੈਪਥਾਲੀਨ ਸਲਫੋਨੇਟ)	3.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਸਸਪੈਂਡਿੰਗ ਏਜੰਟ (ਸੋਡੀਅਮ ਲਿਗਨੋ ਸਲਫੋਨੇਟ)	8.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਸਟਿਕਿੰਗ/ਸਟੈਬਿਲਾਇਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ (ਕਾਰਬੋਕਸੀ ਮਿਥਾਈਲ ਸੈਲੈਲੋਜ਼)	4.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਡਿਸਪਰਸਿੰਗ ਏਜੰਟ (ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ ਔਂਫ ਡਾਈਨੇਪਥਾਈਲ ਮੇਥਾਨੋਲ ਸਲਫੋਨਿਕ ਅਮਲ)	3.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਬਲੈਂਡ ਔਂਫ ਇਸਲਸੀਫਾਇਰਸ (ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਬਲੈਂਡ ਔਂਫ ਐਲਕਾਈਲ ਫੀਨੋਲ ਏਥ੍ਰੋਕਸੀਲੇਟ ਟ੍ਰਾਈਗਲੀਸਰਾਈਡ ਏਥ੍ਰੋਕਸੀਲੇਟ, ਕੈਲਸ਼ਿਅਮ ਐਲਕਾਈਲ ਬੈਂਜਾਈਲ ਸਲਫੋਨੇਟ)	8.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਪਾਣੀ	ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ %
ਕੁਲਃ	**100.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ**

ਚਿਤਾਵਨੀਃ 1. ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਲੀਫਲੈਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। 2. ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। 3. ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਫਲੈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। 4. ਪੋਲੀ ਹਾਉਸਿਸ ਅਤੇ ਬੰਦ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਲਈ-ਲੀਫਲੈਟ ਦੇਖੋ।

Punjabi

इक्सस

फिप्रोनिल 5% एस.सी.

(अंतर्प्रवाही आणि स्पर्शीय कीटकनाशक)

फिप्रोनिल 5% एस.सी. हे एक असं कीटकनाशक आहे ज्याचा वापर भातावरील स्टेम बोरर, ब्राऊन प्लांट हॉपर, ग्रीन लीफ हॉपर,राईस लीफ हॉपर, राईस गॉल मिज, व्हाईट बेक्ड प्लांट हॉपर, व्होर्ल मेगॉट, कोबीवरील डीबीएम, मिरचीवरील थ्रिप्स, एफिड्स आणि फ्रूट बोरर, ऊसावरील अर्ली शूट बोरर आणि रूट बोरर आणि कापसावरील एफिड्स, जेसिड्स, थ्रिप्स, व्हाईट फ्लाय आणि बॉल वर्म सारख्या कीटकांच्या नियंत्रणासाठी केला जातो.

वापराच्या पद्धतिः

पीक	कीटकांचे सामान्य नांव	मात्रा/एचए ए.आय (ग्रा.)	मात्रा/एचए रचना (मि.लि.)	पाण्यात पातळ करणे (लि.)	कापणी आणि शेवटच्या फवारणी मधील कालावधी (दिवसात)
कोबी	डायमंड बेक मॉथ	40–50	800–1000	500	7
मिरची	थ्रिप्स, एफिड्स आणि फ्रूट बोरर	40–50	800–1000	500	7
भात	स्टेम बोरर, ब्राऊन प्लांट हॉपर, ग्रीन लीफ हॉपर, लीफ फोल्डर राईस गॉल मिज, व्होर्ल मेगॉट, व्हाईट बेक्ड प्लांट हॉपर	50–75	1000–1500	500	32
ऊस	रूट बोरर, अर्ली शूट बोरर,	75–100	1500–2000	500	9 महीने
कापूस	एफिड्स, जेसिड्स, थ्रिप्स, व्हाईट फ्लाय	75–100	1500–2000	500	6
कापूस	बॉल वर्म	100	2000	500	6

वापरण्यासाठी निर्देशः रोप संरक्षक उपकरणेः उच्च क्षमतेची नोझल बसवलेली उपकरणे उदाहरणार्थ नेपसेक स्प्रेयर, एयर प्रेशर फुट पंप, हार्ड रॉकर किंवा विजेवर चालणारी स्प्रेइंग मशीन्स वापरावी.

वापरण्याची वेळः

भातः फिप्रोनिल 5% एस.सी.ची फवारणी भाताच्या पेरणीनंतर 25 ते 30 दिवसात करावा.

कोबीः पहिली फवारणी पेरणीनंतर 30 ते 35 दिवसात किंवा पिकाला कीड लागल्यावर, दोन्हीपैकी जे आधी असेल, तेव्हां करावी. पुन्हा 2 ते 3 वेळा फवारणी 7 ते 10 दिवसांनी करावी.

मिरचीः पहिली फवारणी पेरणीच्या 40 ते 50 दिवसानंतर करावी किंवा पिकाला कीड लागल्यावर, जे आधी असेल तेव्हां करावी. पुन्हा 2 ते 3 वेळा फवारणी 7 ते 10 दिवसांनी करावी.

ऊसः शूट बोररसाठी पीक उगवल्यानंतर 35 दिवसांनी आणि रूट बोरर साठी मातीत मिसळून रोपणी करा.

वापराणाऱ्यानी घ्यावयाची काळजीः 1. खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री, खाली पात्र आणि पशु आहारच्या दूर राखून. 2. श्वासो–श्वास वाटे घेऊ नये त्वचेवर पडू देऊ नये किंवा तोंडा समोर घेऊ नये. 3. नेहमी हवेच्या दिशेने ही फवारणी करा. हवेच्या विरुद्ध दिशेने फवारणी करु नये. कारण फवाऱ्याचे शितोंडे आपल्या अंगावर उडू नये. 4. प्रयोगानंतर लगेचच कपडे धुवा व स्नान करा. 5. प्रयोग करतेवेळी खाणे, पिणें धूम्रपान करण तथा पान चघळणे इत्यादी करू नये. 6. फवारणी करते वेळी सुरक्षा साधन कपडे घालावे.

इशाराः फिप्रोनिल मधमाशा आणि जलचरांसाठी विषारी असल्यामुळे जलाशयांजवळ आणि मत्स्यपालन होत असलेल्या ठिकाणी वापरू नये. दिवसा मधमाशा कार्यरत असताना फवारणी करु नका.

विषबाधेची लक्षणेः चिडचिड, आळस, स्नायूंमध्ये कंप, झटके, इत्यादी लक्षणे दिसू शकतात.

प्रथमोपचाराचे उपायः 1. गिळले गेल्यास घशात बोटे घालून उलटी काढा होत जो पर्यंत गिळले गेलेले संपुर्ण द्रव्य बाहेर येत नाहीं. 2. जर शरीरावर पडल्यास खूप पाण्याने धुवावे. 3. भरपूर ताजे पाणी वापरून डोळे 10–15 मिनिट सुधी हबके मारून धुवा. 4. जर श्वासनात, गेल्यास, रोग्याला मोकळ्या हवेत न्या.

झाडांना विषबाधाः निर्धारित प्रमाणात प्रयोग केलात तर झाडाला विषबाधा होत नाही.

विषनाशकः कोणतेही विष प्रतिरोधक नाही. लक्षणानुसार उपचार करावा.

डब्यांची विल्हेवाटः 1. कीटकनाशकांचे रिकामे डबे आणि उरलेलं कीटकनाशक नष्ट करणं आणि सुरक्षितपणे डबे धुणं ही कीटकनाशक तयार करणारे, निर्माते आणि वापरणाऱ्यांची जवाबदारी आहे ज्यामुळे पर्यावरण आणि जल प्रदूषण होणार नाही. 2. वापरलेले डबे/पाकिटे तसेच बाहेर टाकू नये. 3. डबे/पाकिटे वस्तीपासून दूर गाडून टाकावे

संग्रह करण्याच्या अटीः 1. कीटकनाशकांचे डबे हे इतर सामुग्री किंवा खाण्यापिण्याच्या खोलीपासून दूर ठेवावे आणि डबे बंद खोलीमध्ये व कुलुपबंद वेगळया आलमारित ठेवावे. 2. कीटकनाशक ठेवलेली खोली हवेशीर असावी त्यात भरपूर प्रकाश यावा, त्यात सूर्यप्रकाश असावा. जागा मोकळी असावी आणि ती प्रदूषणापासून दूर असावी.

रासायनिक रचनाः

फिप्रोनिल स.त. (किमान शुद्धता 90%)	5.00% भार/भार
सनफ्लॉवर तेल	5.00% भार/भार
वेटिंग एजंट (नेफ्थेलीन सल्फोनेट)	3.00% भार/भार
सस्पेनडिंग एजंट (सोडियम लिग्नो सल्फोनेट)	8.00% भार/भार
स्टिकिंग/स्टेबीलायझिंग एजंट (कार्बोक्सी मिथाईल सेल्युलोज)	4.00% भार/भार
डिस्पर्सिंग एजंट (सोडियम सॉल्ट ऑफ डायनेफ्थाइल मेथानोल सल्फोनिक एसिड)	3.00% भार/भार
ब्लेंड ऑफ इमल्सिफायर (प्रोप्रायटरी ब्लेंड ऑफ अल्काईल फिनोल एथ्रोक्सीलेट ट्रायग्लीसराइड इथोक्सीलेट, केल्शियम अल्काईल बेन्झाइल सल्फोनेट)	8.00% भार/भार
पाणी	पुरेसे प्रमाण %
एकूणः	**100.00% भार/भार**

इशाराः 1. लेबल आणि निर्देश पत्रिकेत उल्लेख असलेल्या कीटक आणि पिकांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कीटक आणि पिकासाठी याचा वापर करू नये. 2. कापणी नंतर वापरू नये. 3. वापरल्यानंतर रिकामे डबे निर्देश पत्रिकेत सांगितल्याप्रमाणे नष्ट करावे. 4. पॉलि हाऊसेस आणि निर्धारित क्षेत्रासाठी निर्देश आणि प्रमाण–निर्देश पत्रिका बघा.

Marathi

ઇક્સસ

ફિપ્રોનિલ 5% એસ.સી.

(પદ્ધતિસરનું અને સ્પર્શીય જંતુનાશક)

ફિપ્રોનિલ 5% એસ.સી. એ એક એવું જંતુનાશક છે, જેનો ઉપયોગ ડાંગરના પાકમાં સ્ટીમ બોરર, બ્રાઉન પ્લાન્ટ હોપર, ગ્રીન લીફ હોપર, રાઈસ લીફ ફોલ્ડર, રાઈસ ગૉલ મીજ, વ્હાઈટ બેક્ડ પ્લાન્ટ હોપર, વ્હોર્લ મેગોટ, કોબીઝમાં ડાયમંડ બ્લેક મોથ, મરચાંમાં થ્રિપ્સ, એફિડ અને ફ્રુટ બોરર, શેરડીમાં અર્લી શૂટ બોરર અને રૂટ બોરર અને કપાસમાં એફિડ, જેસિડ, થ્રિપ્સ, વ્હાઈટ ફ્લાય અને બૉલ વૉર્મ પર અંકુશ માટે થાય છે.

વપરાશ:

પાક	જીવાતનું સામાન્ય નામ	પ્રતિ હેક્ટર માત્રા સ.ત. (ગ્રામ)	પ્રતિ હેક્ટર માત્રા ફોર્મ્યુલેશન (મિ.લી.)	પાણીની માત્રા (લી.)	પાક પરના બે છંટકાવ વચ્ચે નું અંતર (દિવસો)
કોબીઝ	ડાયમંડ બ્લેક મેથ	40-50	800-1000	500	7
મરચાં	થ્રિપ્સ, એફિડ અને ફ્રુટ બોરર	40-50	800-1000	500	7
ડાંગર	સ્ટીમ બોરર, બ્રાઉન પ્લાન્ટ હોપર, ગ્રીન લીફ હોપર, રાઈસ લીફ ફોલ્ડર, રાઈસ ગૉલ મીજ, વ્હાઈટ બેક્ડ પ્લાન્ટ હોપર, વ્હોર્લ મેગોટ,	50-75	1000-1500	500	32
શેરડી	રૂટ બોરર, અર્લી શૂટ બોરર	75-100	1500-2000	500	9 મહિના
કપાસ	એફિડ, જેસિડ, થ્રિપ્સ, વ્હાઈટ ફ્લાય	75-100	1500-2000	500	6
કપાસ	બૉલ વૉર્મ	100	2000	500	6

ઉપયોગ માટેના નિર્દેશ: છોડ રક્ષક ઉપકરણો: હાઈ વોલ્યુમ નોઝલ ફિટ કરેલ સ્પ્રેયર-નેપ્સેક સ્પ્રેયર, એર પ્રેશર ફૂટ પંપ, હાર્ડ રોકર અથવા પાવર ઓપરેટેડ સ્પ્રેયિંગ મશીન વગેરેનો ઉપયોગ કરી શકાય.

ઉપયોગનો સમય:

ડાંગર: ફિપ્રોનિલનો ઉપયોગ રોપણી પછીના 25-30 દિવસોમાં કરવો જોઈએ.

કોબીઝ: પ્રથમ છંટકાવ રોપણી પછીના 30-35 દિવસોમાં અથવા જંતુઓ જોવા મળે ત્યારે, બેમાંથી જે પહેલું હોય તે વખતે કરવો જોઈએ. 7 થી 10 દિવસના અંતરે 2 થી 3 વાર સ્પ્રે કરવો જોઈએ.

મરચાં: પ્રથમ છંટકાવ રોપણી પછીના 40-45 દિવસોમાં અથવા જંતુઓ જોવા મળે ત્યારે, બેમાંથી જે પહેલું હોય તે વખતે કરવો જોઈએ. 7 થી 10 દિવસના અંતરે 2 થી 3 વાર સ્પ્રે કરવો જોઈએ.

શેરડી: અર્લીયર શૂટ બોરર માટે રોપણીના 35 દિવસમાં ઉપયોગ કરો અને રૂટ બોરર માટે માટીમાં ભેળવીને રોપણી કરો.

વાપનાર માટે સાવચેતી: 1. ખાદ્ય પદાર્થ, ખાદ્ય સામગ્રીના ખાલી પાત્ર અને પશુઓના ચારાથી દૂર રાખો. 2. મુખ, ત્વચા અને આંખ ને સંપર્કથી બચાવો. 3. છંટકાવના શ્વાસ માં જવાથી બચાવો અને હવાની દિશા માં છંટકાવ કરો. 4. છંટકાવ ના પછી દૂષિત કપડા અને ચામડીને ધોઈ લેવા. 5. છાંટણ વખતે, ખાવા પીવાનું, તંબાકુ-બીડી સીગરેટ પીવાનું બંધ કરો. 6. વાપરનારે સંપૂર્ણપણે સુરક્ષાત્મક કપડાં પહેરવા જોઇએ.

ચેતવણી: ફિપ્રોનિલ મધમાખીઓ અને જળચર જીવસૃષ્ટિ માટે ઝેરીલું હોઈ શકે છે. આથી જલાશયોની આસપાસના વિસ્તારમાં તેનો ઉપયોગ/છંટકાવ કરશો નહીં. દિવસ દરમિયાન મધમાખીઓ ખોરાક એકઠો કરી રહી હોય ત્યારે છંટકાવ કરશો નહીં.

ઝેરનાં લક્ષણો: ચીડીયો સ્વભાવ, આળસ, માંસપેશીઓમાં કંપારી, મૂર્છા (વાઈ) નો હુમલો આવી શકે છે.

પ્રાથમિક ચિકિત્સા: 1. ગળાની પાછળ ગલીપચી કરીને ઉલ્ટી કરાવો. જ્યાં સુધી સાફ ઉલ્ટી ના થાય, એમ ચાલુ રાખો. 2. પ્રભાવિત ચામડી અને કપડાનું પાણીથી ધુઓ. 3. આંખોમાં જાય તો ચોખ્ખા પાણી થી વધારે માત્રામાં 10-15 મિનિટ સુધી ધુઓ. 4. શ્વાસમાં ગઈ હોય તો દરદીને ખુલ્લી હવામાં લઈ જાવ.

છોડની વિષયુક્તતા: જરૂરી માત્રામાં ઉપયોગ કરવાથી છોડને ઝેર ચઢતું નથી.

વિષનાશક: કોઈ વિષનાશક જણાતું નથી. લક્ષણો મુજબ સારવાર કરો.

ખાલી ડબ્બાનો નિકાલ: 1. આ જન્તુનાશકના નિર્માતા અને ઉપયોગકર્તાની એ ફરજ છે કે તે ડબ્બા/પેકેજ કે બચેલ જંતુનાશક તથા સાધનોના ધોવાણનો નિકાલ સુરક્ષિત રીતે કરે. જેથી વાતાવરણ કે પાણી પ્રદૂષિત ન થાય. 2. ખાલી ડબ્બા અને પેકેટોને જેમ-તેમ ખૂલ્લી જગ્યામાં રાખવાં ન જોઇએ. 3. ખાલી ડબ્બા અને પેકેટોને તોડીને વસ્તીથી દૂર જમીનમાં ખાડો કરીને તેમાં દાટી દેવા જોઈએ.

સંગ્રહની શરતો: 1. જીવાતનાશકના ડબ્બાઓને અન્ય ખાવા-પીવાની ચીજો રાખવાના રૂમ અને મકાનોથી દૂર અલગ રૂમ અને મકાનમાં અથવા અલગ તાળાબંધ કબાટમાં રાખવા જોઈએ. 2. જીવાતનાશકના ડબ્બાઓને રાખવાના રૂમ અને મકાન મજબૂત, સૂકાં, પ્રકાશિત અને હવાઉજાસવાળાં હોવાં જોઈએ તથા તેનું વરાળના રૂપે હવા પ્રદૂષણ ન થાય તે માટે પૂરતી જગ્યા હોવી જોઈએ.

રાસાયણિક બનાવટ:

ફિપ્રોનિલ એ.આઈ. (લઘુત્તમ શુદ્ધતા 90%)	5.00% ભાર/ભાર
સૂર્યમૂખીનું તેલ	5.00% ભાર/ભાર
વેટિંગ એજંટ (નેપ્થાલિન સલ્ફોનેટ)	3.00% ભાર/ભાર
સસ્પેંડિગ એજંટ (સોડિયમ લિગ્નો સલ્ફોનેટ)	8.00% ભાર/ભાર
સ્ટિકિંગ/સ્ટેબિલાઈઝિંગ એજંટ (કાર્બોક્સિ મિથાઈલ સેલ્યુલોઝ)	4.00% ભાર/ભાર
ડિસ્પર્ઝિંગ એજંટ (સોડિયમ સોલ્ટ ઓફ ડાયનેપ્થાઈલ મિથેનોલ સલ્ફોનિક એસિડ)	3.00% ભાર/ભાર
બ્લેંડ ઓફ ઈમલ્સીફાયર્સ (પ્રોપ્રાયટરી બ્લેંડ ઓફ આલ્કાઈલ ફિનોલ ઈથોક્સિલેટ ટ્રાય ગ્લીસરાઈડ ઈથોક્સિલેટ, કેલ્શિયમ આલ્કાઈલ બેંઝાઈલ સલ્ફોનેટ)	8.00% ભાર/ભાર
પાણી	પુરતી માત્રા %
કૂલ:	**100.00% ભાર/ભાર**

ચેતવણી: 1. લેબલ અને લિફ્લેટમાં દર્શાવ્યા હોય તે સિવાયના પાકો અને જીવાત પર આ ઉત્પાદનનો છંટકાવ (ઉપયોગ)કરવો ન જોઈએ. 2. કાપણી/લણણી પછીના છંટકાવ માટે તેનો ઉપયોગ કરવો ન જોઈએ. 3. આ ઉત્પાદનનો છંટકાવ (ઉપયોગ) કર્યા પછી ખાલી કન્ટેનરનો લિફ્લેટમાં જણાવ્યા મુજબ નાશ કરો. 4. પોલી હાઉસ તેમજ કન્ફાઈંડ વિસ્તાર માટેનાં સૂચનો અને માત્રા અંગેની જાણકારી માટે લિફ્લેટ વાંચો.

Gujarati

ଇକ୍ସସ୍

ଫିପ୍ରୋନିଲ 5% ଏସ୍.ସି.

(ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶୀୟ କୀଟନାଶକ)

ଫିପ୍ରୋନିଲ 5% ଏସ୍.ସି. ହେଉଛି ଏକ ସ୍ପର୍ଶଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ତପ୍ରବାହୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା କୀଟନାଶକ। ଏହାର ଉପଯୋଗ ଧାନରେ ହେଉଥିବା କୀଟ ଯେପରିକି ଡ଼େମ୍ଫ କଣା କରୁଥିବା କୀଟ, ପତ୍ର ଖାଉଥିବା କୀଟ, ଧାନ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା କୀଟ, ଗ୍ରୀନ୍ ଲିଫ ହପର, ରାଇସ ଲିଫ ଫୋଲଡର, ରାଇସ ଗଲ ମିଜ, ହ୍ୱାଇଟ ବେକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହପର ଇତ୍ୟାଦି କୀଟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କରାଯାଏ।ବନ୍ଧା କୋବି ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା କୀଟ, ଆଫିଡ, ଫଳ କଣା କରୁଥିବା କୀଟ, ଆଖୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା କୀଟ, ଆଖୁ ଅଗ୍ରଭାଗ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା କୀଟ, ଲଙ୍କା ଗଛ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା କୀଟଗୁଡ଼ିକ ଯେପରିକି ଧଳା ମାଛି, ତେଲା ମାହୁ ଜାତୀୟ କୀଟଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଔଷଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ।

ଉପଯୋଗ:

ଫସଲ	କୀଟର ସାଧାରଣ ନାମ	ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ମାତ୍ରା ସ.ତ. (ଗ୍ରାମ୍)	ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ମାତ୍ରା ସଂରଚ୍ଚନା (ମିଲି.)	ପାଣିର ମାତ୍ରା (ଲି.)	ଅନ୍ତିମ ସ୍ପ୍ରେ ତଥା ଫସଲ କାଟିବା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ (ଦିନ)
ବନ୍ଧାକୋବି	ଡାଇମଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ ମୋଥ	40-50	800-1000	500	7
ଲଙ୍କା	ଥ୍ରିପ୍ସ, ଆଫିଡ, ଫ୍ରୁଟ ବୋରର (ଡ଼େମ୍ଫ କଣା କରୁଥିବା)	40-50	800-1000	500	7
ଧାନ	ଡ଼େମ୍ଫ କଣା କରୁଥିବା କାଟ, ବ୍ରାଉନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହପର, ଗ୍ରୀନ୍ ଲିଫ ହପର, ଲିଫ୍ ଫୋଲଡର, ରାଇସ୍ ଗଲ ମିଜ୍, ହୋଲ୍ ମେଗଟ, ହ୍ୱାଇଟ ବେକ୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହପର	50-75	1000-1500	500	32
ଆଖୁ	ରୁଟ ବୋରର (ମୂଳ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା), ଆର୍ଲି ଶୁଟ ବୋରର,	75-100	1500-2000	500	9 ମାସ
କପା	ଆଫିଡ୍, ଜାସିଡ୍ସ, ଥ୍ରିପ୍ସ, ଧଳା ମାଛି	75-100	1500-2000	500	6
କପା	ଜିଆ ଜାତୀୟ କୀଟ	100	2000	500	6

ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ: ଚାରା ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପକରଣ: କୀଟଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାର ସହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାଯୁକ୍ତ ସ୍ପ୍ରେ ଉପକରଣ ଯେପରିକି ନ୍ୟାପସେକ, ଏୟାର ପ୍ରେସର ଫୁଟ ପମ୍ପ, ହାର୍ଡ ରକର ଏବଂ ପାୱାର ଅପରେଟେଡ ସ୍ପ୍ରେୟିଙ୍ଗ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ।

ପ୍ରୟୋଗ ସମୟ:

ଧାନ: ଫିପ୍ରୋନିଲ୍ 5% ଏସ୍.ସି. ଧାନ ଲଗାଇବାର 25 ରୁ 30 ଦିନ ଭିତରେ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯିବା ଉଚିତ୍।

ବନ୍ଧା କୋବି: ପ୍ରଥମ ସ୍ପ୍ରେ, ଫସଲ ଲଗାଇବାର 30 ରୁ 35 ଦିନ ପରେ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫସଲରେ କୀଟ ଲାଗିବା ପରେ, ଉଭୟ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଆସେ। ତାପରେ 7 ରୁ 10 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ 2-3 ଥର ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ।

ଲଙ୍କା: ପ୍ରଥମ ସ୍ପ୍ରେ ଲଙ୍କା ଗଛ ଲଗାଇବାର 40 ରୁ 50 ଦିନ ପରେ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫସଲରେ କୀଟ ଲାଗିବା ଦେଖିଲେ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମେ ହୁଏ। ତାପରେ 7 ରୁ 10 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ 2-3 ଥର ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ।

ଆଖୁ: ଡ଼େମ୍ଫ କଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଫସଲ ଆସିବାର 35 ଦିନ ପରେ ଏବଂ ମୂଳ ନଷ୍ଟ ନହେବା ପାଇଁ ଏହି ଔଷଧ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ।

ପ୍ରୟୋଗକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାବଧାନତା: 1. ଖାଦ୍ୟସାମଗ୍ରୀ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ବାସନକୁସନ, ଏବଂ ପଶୁଚାରାଠାରୁ ଏହା ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। 2. ମୁହଁ, ତ୍ୱଚା ଏବଂ ଆଖିଠାରୁ ଏହା ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। 3. ସ୍ପ୍ରେ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ପାଟି ଭିତରେ ପଶିନଯାଏ ସାବଧାନ ରହନ୍ତୁ। ପବନ ବୋହୁଥିବା ଦିଗରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। 4. ସ୍ପ୍ରେ କରିସାରିବା ପରେ ଦୂଷିତ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 5. ସ୍ପ୍ରେ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧୂମ୍ରପାନ, ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଏବଂ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଟିରେ ଚୋବେଇବା ନିଷେଧ। 6. ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ସମୟରେ ବା ମିଶ୍ରଣ ମିକ୍ସ କଲାବେଳେ ସୁରକ୍ଷାଯୁକ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ।

ସତର୍କତା: ଫିପ୍ରୋନିଲ ମହୁମାଛ ଏବଂ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବିଷାକ୍ତ ଅଟେ। ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଏବଂ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମହୁମାଛି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହା ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ବିଷ ଲକ୍ଷଣ: ବିରକ୍ତିଭାବ, ଆଳସ୍ୟ, ମାଂସପେଶୀରେ କମ୍ପନ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯିବା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖା ଦେଇପାରେ।

ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା: 1. ଯଦି ନିଃଶ୍ୱାସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭିତରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିବେ ତାହେଲେ ରୋଗୀକୁ ବାହାରକୁ ସତେଜ ପବନକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। 2. ଢ଼ୋକି ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଟି ଭିତରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଭର୍ତ୍ତିକରି ବାନ୍ତି କରାନ୍ତୁ। 3. ଦୂଷିତ ବସ୍ତ୍ର ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୂଷିତ ଶରୀର ତଥା ବସ୍ତ୍ରକୁ ସାବୁନ ଏବଂ ପାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 4. ଯଦି ଆଖି ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣିରେ 10-15 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖିକୁ ଧୁଅନ୍ତୁ।

ଉଦ୍ଭିଦ ବିଷାକ୍ତତା: ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ କୌଣସି ଉଦ୍ଭିଦ ବିଷାକ୍ତ ହେବନାହିଁ।

ବିଷନାଶକ: କୌଣସି ବିଶେଷ ପ୍ରତିବିଷ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ।

ଖାଲି ଡ଼ବାଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ କରିବା: 1. ଏହି କୀଟନାଶକର ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଉପଯୋଗକାରୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଡ଼ବା/ପ୍ୟାକେଜ କିମ୍ବା ବଳି ଯାଇଥିବା କୀଟନାଶକର ଡ଼ବାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ବାତାବରଣ ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବନାହିଁ। 2. ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଡ଼ବା/ପ୍ୟାକେଟଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗିବା ଅନୁଚିତ୍। 3. ଡ଼ବା/ପ୍ୟାକେଟଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି କରି ଜନଗହଳି ଠାରୁ କିମ୍ବା ବାସସ୍ଥାନରୁ ଦୂରରେ ମାଟି ଭିତରେ ପୋତି ଦେବା ଉଚିତ୍।

ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ପ୍ରଣାଳୀ: 1. କାଟନାଶକ ଡ଼ବାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା କୋଠରୀଠାରୁ ବା ସେହି ସ୍ଥାନଠାରୁ ଦୂରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀରେ କିମ୍ବା ତାଲା ଦେଇ ଆଲମାରୀରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍। 2. କୀଟନାଶକ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା କୋଠରୀ ବା କାଛ ମଜବୁତ, ଶୁଖିଲା ଏବଂ ବାୟୁ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ସେହି କୋଠରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ହେବା ଉଚିତ୍ ଯଦ୍ୱାରା ବାଷ୍ପର ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବନାହିଁ।

ରାସାୟନିକ ସଂରଚ୍ଚନା:

ଫିପ୍ରୋନିଲ ସକ୍ରିୟ ତତ୍ତ୍ୱ (ନ୍ୟୁନତମ ଶୁଦ୍ଧତା 90 ପ୍ରତିଶତ)	5.00% ଓଜନ/ଓଜନ
ସୂର୍ଯ୍ୟମୂଖୀ ତେଲ	5.00% ଓଜନ/ଓଜନ
ୱେଟିଙ୍ଗ ଏଜେଣ୍ଟ (ନେପଥାଲିନ୍ ସଲଫୋନେଟ)	3.00% ଓଜନ/ଓଜନ
ସସ୍ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଏଜେଣ୍ଟ (ସୋଡ଼ିୟମ ଲିଗ୍ନୋ ସଲଫୋନେଟ)	8.00% ଓଜନ/ଓଜନ
ଷ୍ଟିକିଙ୍ଗ/ଷ୍ଟାବିଲାଇଜିଙ୍ଗ ଏଜେଣ୍ଟ (କାର୍ବୋକ୍ସି ମିଥାଇଲ ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ)	4.00% ଓଜନ/ଓଜନ
ଡ଼ିସପର୍ସିଙ୍ଗ ଏଜେଣ୍ଟ (ସୋଡ଼ିୟମ ସଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଡ଼ାଇନେପଥାଇଲ ମିଥାନୋଲ ସଲଫୋନିକ୍ ଏସିଡ)	3.00% ଓଜନ/ଓଜନ
ବ୍ଲେଣ୍ଡ ଅଫ ଏମୁଲସିଫାୟରସ (ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟୋରୀ ବ୍ଲେଣ୍ଡ ଅଫ ଅଲକାଇଲ ଫିନୋଲ ଏଥୋକ୍ସିଲେଟ, ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସେରାଇଡ ଏଥୋକ୍ସିଲେଟ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଲକାଇଲ୍ ବେଞ୍ଜାଇଲ ସଲଫୋନେଟ)	8.00% ଓଜନ/ଓଜନ
ପାଣି	ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରା %
ସମୁଦାୟ	**100.00% ଓଜନ/ଓଜନ**

ସାବଧାନତା: 1. ଲେବୁଲ ଓ ଲିଫଂଲେଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଫସଲ ଓ କୀଟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫସଲ ବା କୀଟ ଉପରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 2. ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରୟୋଗ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 3. ବ୍ୟବହାର ପରେ ଲିଫଲେଟ ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କଣ୍ଟେନର ଗୁଡିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। 4. କୁକୁଡ଼ା ଘର ଆଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ବ୍ୟବହାର ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଓ ମାତ୍ରା ଦେଖିବାପାଇଁ ଲିଫଲେଟ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ।

Oriya

இக்ஸஸ்

ஃபிப்ரோனில் 5% எஸ்.ஸி.

(உள்பரவும் மற்றும் தொடுநஞ்சு பூச்சிக்கொல்லி)

ஃபிப்ரோனில் 5% எஸ்ஸி பூச்சிக் கொல்லி மருந்தை நெற்பயிரில் தண்டுத் துளைப்பான், பழுப்பு தத்துப் பூச்சி, பச்சை தத்துப் பூச்சி, நெல் தழை மடிப்பு பூச்சி, அரிசி அழுகும் பூச்சி, வெள்ளை முதுகு செடி தத்துப் பூச்சி, உருண்டைப் புழு; கேபேஜில் டிபிஎம்; மிளகாயில் திரிப்ஸ், அபிட்ஸ் & பழத்துளைப்பான், கரும்பில் ஆரம்ப குருத்துத் துளைப்பான் & வேர் துளைப்பான், பருத்தியில் அபிட்ஸ், ஜேஸிட்ஸ், திரிப்ஸ், வெள்ளைப் பூச்சி, காய்ப்புழு போன்ற பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்தலாம்.

பரிந்துரைகள்:

பயிர்க	பூச்சிகளின் பொதுவான பெயர்கள்	டோஸ்/ஹெ ஏ.ஐ (கிராம்)	டோஸ்/ஹெ ஃபார்முலா (மி.லி.)	கரைசல் (லிட்டர்)	கடைசித் தெளிப்புக்கும் அறுவடைக்கும் இடையே காத்திருப்பு காலம் (நாட்கள்)
கேபேஜ்	டயமண்ட் முதுகு புழு	40-50	800-1000	500	7
மிளகாய்	திரிப்ஸ், அபிட், பழத்துளைப்பான்	40-50	800-1000	500	7
அரிசி	தண்டுத் துளைப்பான், பழுப்பு செடித் தத்துப்பூச்சி, பச்சை இலைத் தத்துப்பூச்சி, இலைச்சுருட்டை, அரிசி அழுகும் புழு, உருண்டைப் புழு, வெள்ளை முதுகு செடித் தத்துப் பூச்சி	50-75	1000-1500	500	32
கரும்பு	வேர்த்துளைப்பான், ஆரம்ப குருத்துத் துளைப்பான்,	75-100	1500-2000	500	9 மாதங்கள்
பருத்தி	அபிட்ஸ், ஜேஸிட்ஸ், திரிப்ஸ், வெள்ளைப் பூச்சி	75-100	1500-2000	500	6
பருத்தி	காய்ப்புழு	100	2000	500	6

பயன்படுத்துவதற்கான கட்டளைகள்: செடிப்பாதுகாப்பு சாதனங்கள்: நேப் ஸேக் , ஏர் பிரஷர் கால்மிதி பம்ப், ஹார்டு ராக்கர் அல்லது விசையினால் இயக்கப்படும் ஸ்பிரேயிங் மெஷின் போன்ற ஸ்பிரேயர்களில் அதிக அளவில் பீச்சும் நாஸில் பொருத்தி பயன்படுத்தலாம்.

தெளிக்கும் நேரம்:

நெல்: நடவு போட்ட பிறகு 25 முதல் 30 நாட்கள் கழித்து ஃபிப்ரோனில் தெளிக்க வேண்டும்.

கேபேஜ்: நடவு போட்ட பிறகு 30 முதல் 35 நாட்களில் அல்லது பூச்சிகள் விழுவது தெரிந்த உடனே, எது முதலிலோ அதன்படி, முதல் தெளிப்பு நடத்த வேண்டும். 7 முதல் 10 நாட்கள் இடைவெளியில் 2 முதல் 3 தெளிப்புக்களை திரும்ப தெளிக்க வேண்டும்.

மிளகாய்: நடவு போட்ட பிறகு 40 முதல் 50 நாட்களில் அல்லது பூச்சிகள் விழுவது தெரிந்த உடனே, எது முதலிலோ அதன்படி, முதல் தெளிப்பு நடத்த வேண்டும். 7 முதல் 10 நாட்கள் இடைவெளியில் 2 முதல் 3 தெளிப்புக்களை திரும்ப தெளிக்க வேண்டும்.

கரும்பு: ஆரம்ப குருத்துத் துளைப்பானுக்கு நடவு போட்ட 35 நாட்கள் கழித்தும், வேர்த்துளைப்பானுக்கு நடவின்போது மண்ணில் நனைத்தும் பயன்படுத்த வேண்டும்.

முன்னெச்சரிக்கை: 1. உணவுப் பொருட்கள், உணவு வைப்பதற்கான காலிப் பாத்திரங்கள், கால்நடைத் தீவனங்கள் ஆகியவற்றுக்கு அருகில் வைக்காதீர்கள். 2. வாய், கண்கள், மற்றும் சருமத்தில் பட்டுவிடாமல் தவிர்க்கவும். 3. தெளிக்கும்போது ஏற்படும் ஆவிப்படலத்தை சுவாசிக்காமல் இருக்கவும். காற்று வீசும் திசையில் தெளிக்கவும். 4. தெளித்த பிறகு மருந்து பட்ட துணிகளையும், உடம்பின் பாகங்களையும் நன்றாகக் கழுவவும். 5. தெளிக்கும்போது புகை பிடிப்பதோ, எதையும் உண்பதோ, குடிப்பதோ, மெல்லுவதோ கூடாது. 6. மருந்தைக் கரைக்கும்போதும், தெளிக்கும் போதும் முழு காப்பு உடைகளை அணியவும்.

எச்சரிக்கை: ஃபிப்ரோனில் தேனீக்களுக்கு நச்சூட்டக்கூடியது, எனவே, நீர்நிலைகள், மீன்பண்ணை அருகே பயன்படுத்தக்கூடாது. தேனீக்கள் சுறுசுறுப்பாக இயங்கும் நேரத்தில் தெளிப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

விஷ அறிகுறி: எரிச்சல், சோம்பல், தசை நடுக்கம்,வலிப்பு உண்டாகலாம்.

முதல் உதவி: 1. விழுங்கிவிட்டால் தொண்டைக்குள் விரல் விட்டு வாந்தி பண்ண வையுங்கள். வெளிவரும் வாந்தி தெளிவாகும் வரை திரும்பத் திரும்பச் செய்யவும். நோயாளி நினைவிழந்த நிலையில் இருந்தால் வாந்தி பண்ண வைக்காதீர்கள். 2. உடைகளிலும், சருமத்திலும் மருந்து பட்டுவிட்டால், உடைகளைக் கழற்றி மருந்துபட்ட சருமத்தின் மீது நிறையத் தண்ணீர் விட்டு சோப்பு போட்டு கழுவவும். 3. கண்களில் பட்டுவிட்டால், சுமார் 10 முதல் 15 நிமிடங்களுக்கு உப்புநீர்/ நன்னீர் நிறைய தெளித்து கண்களை அலம்பவும். 4. மருந்தை சுவாசித்து விட்டால், நோயாளியை நல்ல காற்றோட்டமான இடத்திற்குக் கொண்டு செல்லவும்.

தாவர நச்சு: பரிந்துரைத்தபடி பயன்படுத்தினால் செடிகளுக்கு விஷத்தன்மை ஏற்படாது.

விஷ முறிவு: குறிப்பான விஷமுறிவு எதுவும் இருப்பதாகத் தெரியவில்லை. அறிகுறிக்கு ஏற்ப சிகிச்சை தரவும்.

பெட்டிகளை அப்புறப்படுத்துவது: 1. பெட்டிகளை அல்லது மீதியுள்ள மருந்தை மற்றும் கழுவிய தண்ணீரை பாதுகாப்பாக தண்ணீரோ, சுற்றுப்புறமோ மாசுபடாமல் அப்புறப்படுத்த வேண்டியது தயாரிப்பாளர்கள்மற்றும் பூச்சிமருந்து ஃபார்முலேட்டர்கள் மற்றும் ஆப்பரேட்டர்களின் கடமை. 2. பயன்படுத்திய காலிப் பெட்டிகளை மறு உபயோகம் செய்யாமல் இருக்க அவற்றை வெளியே போட்டு வைக்கக் கூடாது. 3. பாக்கெட்டுகளை உடைத்து, மக்கள் வசிக்காத இடங்களில் புதைத்து விட வேண்டும்.

எடுத்துவைக்க நிபந்தனைகள்: 1. பூச்சிமருந்து உள்ள பெட்டிகளை அசல் கண்ட்டெய்னர்களில் தனித்தனி அறைகளில் அல்லது வளாகத்தில் வைக்கவும். அந்த அறை மற்ற பொருட்கள், குறிப்பாக உணவுப் பொருட்கள் வைக்கப்படும் அறைகளுக்கு அப்பால் இருக்க வேண்டும். தனி அலமாரிகளில் வைத்து பூட்ட வேண்டும். 2. பூச்சிமருந்து வைப்பதற்கான அறை நன்கு உறுதியாகக் கட்டப்பட்டு, ஈரமின்றி, நல்ல வெளிச்சம் மற்றும் காற்றோட்டத்துடன், ஆவிமூலம் மருந்து வெளியேறி மாசு ஏற்படாமல் இருக்க போதுமான அளவு பெரியதாகக் கட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

ரசாயனச் சேர்க்கை:

ஃபிப்ரோனில் ஏ.ஐ (குறைந்தபட்ச சுத்தம் 90%)	5.00% எ/எ
சூரியகாந்தி எண்ணெய்	5.00% எ/எ
நனைக்கும் பொருள் (நாப்தலின் சல்ஃபோனேட்)	3.00% எ/எ
சஸ்பெண்டிங் ஏஜண்ட் (சோடியம் லிக்னோ சல்போனேட்)	8.00% எ/எ
பசைப்பொருள் (கார்போக்ஸி மித்தைல் ஸெல்லுலோஸ்)	4.00% எ/எ
பரப்பிவிடும் பொருள் (டினாபத்தைல் மெத்தனால் சல்ஃபோனிக் அமிலத்தின் சோடியம் உப்பு)	3.00% எ/எ
குழம்புப் பொருள் கலவை (அல்கைல் பினாயில் எத்தோக்ஸைலேட், டிரிகிளைசெரிட் எத்தோக்ஸைலேட், கால்சியம் அல்கைல் பென்ஸில் சல்ஃபோனேட்)	8.00% எ/எ
தண்ணீர்	QS %
மொத்தம்:	**100.00% எ/எ**

எச்சரிக்கை: 1. இந்த லேபலிலும், பிரசுரத்திலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவை நீங்கலாக மற்ற பயிர்கள் மற்றும் பூச்சிகள் மீது இதைப் பயன்படுத்தக் கூடாது. 2. அறுவடைக்குப் பிந்தைய பயன்களுக்காக இதைத் தெளிக்கக் கூடாது. 3. பயன்படுத்திய பிறகு பிரசுரத்தில் கூறப்பட்டபடி காலிப் பெட்டியை சிதைத்து விடவேண்டும். 4. கட்டளைகள் மற்றும் பாலி ஹவுஸ்கள் மற்றும் மூடப்பட்ட பகுதிகளுக்கான டோஸ்களுக்கு பிரசுரத்தைப் பார்க்கவும்.

Tamil