PANTONE 193 C   PANTONE 2012 C

'A' watermark 10% of base color

1 Kg - 462 x 155 mm - HDPE/PP Jar Bottle

MAIZOATE® **Emamectin Benzoate 5% SG** **Insecticide**

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Emamectin benzoate a.i.: 5.00% w/w, Sodium N-methyl-N-oleoyl taurate:7.50% w/w, Sodium alkyl naphthalene sulfonate: 1.00% w/w, Polydimethylsiloxane: 0.10% w/w, Lactose anhydrous: QS% w/w, **Total: 100% w/w. Crop and Insect Group:** Emamectin benzoate 5% SG is recommended for the control of Bollworms on Cotton; Fruit and Shoot borer on Okra & Brinjal; Diamond back moth on Cabbage; Fruit borer, Thrips & Mites on Chilli; Pod borer on Red gram & Chickpea; Thrips on Grapes and Tea looper on Tea.**Direction of Use:** Apply the insecticides when the incidence of larvae is first observed and repeat applications as necessary. Apply the insecticide in sufficient quantity of water to ensure through coverage of the foliage. Emamectin benzoate 5% SG is toxic to Aquaculture and Honeybees. **Precautions:** Do not use cooking utensils for preparing the spray solution. Use stick for stirring the spray solution. Avoid contact with skin, eye and clothing. Avoid inhalation of fog and vapours. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Wear protective clothing, mask, goggles and boots while handling the product. Do not eat, drink or smoke while applying the product. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Avoid contaminated of air and water bodies with the insecticides. Also wash the contaminated clothes. **Antidote:** No specific antidote is known. treat symptomatically. **First Aid**: Remove the affected person to a well-ventilated area or fresh air and protect him from undercooling. Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. Rinse eyes with clean water for several minutes. If ingested, give the patient one or two glasses of water, if able to swallow. Do not induce vomiting. Get the attention of the medical doctor immediately. Note: Do not induce vomiting or never give anything by mouth to an unconscious person. **Symptoms**: Early symptoms of poisoning may be a combination of dilation of pupils, muscular incoordination, ataxia, and muscle tremors. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets 2. Not to be used for Post-Harvest Applications.3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4). Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

माइज़ोएट **ईमामेक्टिन बेंजोएट ५% एसजी** **कीटनाशक**

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। रासायनिक संरचना: ईमामेक्टिन बेंजोएट ए.आई. : ५.००% भार/भार, सोडियम–एन– मिथाइल –एन–ओलियैल–टॉरैट : ७.५०% भार/भार, सोडियम आल्काईल नेफथलीन सल्फोनेट: १.००% भार/भार, पोलीडायमिथाइल सिलोक्सेन : ०.१०% भार/भार, लैक्टोज एनहाइड्रेस : पर्याप्त मात्रा% भार/भार, **कुल: १००.००% भार/भार। फसल एवं कीट समूह:** ईमामेक्टिन बेंजोएट ५% एसजी कपास की डोडे की सुंडियाँ; भिंडी तथा बैंगन के तना व फल छेदक; पत्ता गोभी के हीरक पीठ पतगें; मिर्च के फल छेदक, चुरदा, घुन; अरहर तथा चना के फली छेदक; अंगूर का चूरदा; चाय की चाय लूपर की रोकथाम के लिए सिफारिश की जाती है। **उपयोग के लिए दिशा–निर्देश:** जब इल्लियां पहली बार दिखाई देता है, तब निर्देश के अनुसार इस कीटनाशक का छिडकाव करें। जरूरत लगे तो, पुनः छिडकाव करें। कीटनाशक को निर्दिष्ट मात्रा ले पानी में मिलाकर अच्छी तरह से छिडकाव कीजिए। ईमामेक्टिन बेंजोएट ५% एस. जी. एक्वाकल्चर एवं मधुमक्खी के लिए हानीकारक है। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** स्प्रे तैयार करने के लिए खाना पकाने के बर्तनों का इस्तेमाल मत कीजिए। स्प्रे के घोल हिलाने के लिए लकडी का प्रयोग करे । त्वचा, आँख और मुँह को कीटनाशी का संपर्क से बचाए तथा श्वास द्वारा अन्दर जाने से रोके । सुरक्षात्मक कपडे जैसे कि ऐप्रान, दस्ताने, नकाब और गर्म बूट आदि पहन कर ही इसका प्रयोग करे । कीटनाशक को प्रयोग करते समय, खाना, पीना और धूम्रपान करना नही चाहिए। प्रति दिन प्रयोग के बाद, कीटनाशी से प्रभावित हिस्सों को अच्छी तरह धो ले और कपडा बदल ले । दूषित कपडो को अच्छी तरह धो ले। **विष नाशक:** कोई विशेष विष प्रतिहार नही, लक्षणानुसार उपचार करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** रोगी व्यक्ति को ताजी हवा में ले जाएं और उसे कम ठंड से बचाएं। त्वचा में लगने पर दुषित कपड़ो को उतार दें तथा उसके प्रभावित हिस्सों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो डालें। आंखों में चले जाने पर आंखों को स्वच्छ पानी से कई मिनटों तक छपछपाए। पेट में चले जाने पर यदि रोगी पानी पी सकता है तो, एक या दो गिलास पानी दें। उल्टी न करायें तथा तुरंत डाक्टर को बुलायें। सूचना: यदि मरीज बेहोश हो तो, मुँह में कुछ न दें। उल्टी कराने की कोशिश न करें। **लक्षण:** इस कीटनाशक से सम्पर्क होने पर दिखाई देने वाले प्रारम्भिक लक्षण है: पुतलिसों का फैलना, असंतुलन, एटाक्सिया, लड़खडाना और मांस पेशियों में ऐंठन होना । **सावधानियाँ कथन:** १. इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४). पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक पर्ची देखें।

માઈઝોએટ **ઈમામેક્ટિન બેંઝોએટ 5% એસજી** **જંતુનાશક**

ઉપયોગ કરતાં પહેલાં આ સાથેના લિફ્લેટને કાળજીપૂર્વક વાંચો. રાસાયણિક સંયોજન: ઈમામેક્ટિન બેંઝોએટ સક્રિય તત્વ: 5.00% ભાર/ભાર, સોડિયમ-એન-મિથાઈલ-એન-ઓલિયેલ-ટૉરેટ: 7.50% ભાર/ભાર, સોડિયમ આલ્કાઈલ નેપ્થાઈલ સલ્ફોનેટ: 1.00% ભાર/ભાર, પોલીડાય મિથાઈલ સિલોક્સિન: 0.10% ભાર/ભાર, લેક્ટોસ એનહાઈડ્રસ: જરૂરી માત્રા% ભાર/ભાર, **કૂલ: 100.00% ભાર/ભાર. પાક અને જંતુ સમૂહ:** ઈમામેક્ટિન બેંઝોએટ 5% એસ.જી. દવાનો ઉપયોગ કપાસમાં બોલવોર્મ, ભીંડીમાં અને રીંગણમાં ફ્રુટ અને શૂટ બોરર, કોબીઝમાં ડીબીએમ, મરચાંમાં ફ્રુટ બોરર, થ્રિપ્સ અને માઈટ્સ, તુવેર અને ચણામાં પોડ બોરર, દ્રાક્ષમાં ચીક-પી અને ચામાં ટી લૂપર જેવા રોગો પર અંકુશ માટે કરવામાં આવે છે. **ઉપયોગ માટેના નિર્દેશ:** પહેલી વાર કીડા દેખાય ત્યારે નિર્દેશ મુજબ આ જંતુનાશકનો છંટકાવ કરો. જરૂર લાગે તો ફરીવાર છંટકાવ કરો. આ જંતુનાશકને નિર્દિષ્ટ માત્રામાં પાણીમાં ભેળવીને સારી રીતે છંટકાવ કરો. ઈમામેક્ટિન બેંઝોએટ 5% એસ.જી. એક્વાકલ્ચર અને મધુમાખી માટે હાનિકારક છે. **વાપનાર માટે સાવચેતી:** છાંટવા માટેનું આ દ્રાવણ બનાવવા માટે રાંધવાના વાસણોનો ઉપયોગ કરવો નહી. દ્રાવણને હલાવવા માટે લાકડીનો ઉપયોગ કરો. આ દ્રાવણને શ્વાસમાં લેવાથી તેમજ આંખોના સંપર્કથી બચો. આ દ્રાવણ હાથ પર ન લાગે તે માટે હાથ પર મોજા પહેરો. આ દ્રાવણનો છંટકાવ કરતી વખતે માસ્ક, ચશ્માં, બૂટ વગેરે પહેરો. આ દવા લઈ જતી વખતે અને તેનો ઉપયોગ કરતી વખતે કશું ખાવું કે પીવું ન જોઈએ તમજ ધૂમ્રપાન પણ ના કરવું જોઇએ. કામ પત્યા પછી સાબુ અને પાણીથી હાથ ધુઓ. હવા અને પાણીનાં સંગ્રહસ્થળોને જંતુનાશકો સાથે સંપર્કમાં આવતાં બચાવો. પહેરેલાં કપડાં બદલી નાખો અને તેને સારી રીતે ધોઈ નાખો. **વિષનાશક:** કોઈ વિષનાશક જણાતું નથી. લક્ષણો મુજબ સારવાર કરો. **પ્રાથમિક ચિકિત્સા:** ઝેરથી પ્રભાવિત વ્યક્તિને જે-તે જગ્યાથી હવા-ઉજાસવાળા રૂમમાં કે ખૂલ્લી હવામાં લઈ જાઓ અને તાપમાનથી બચાવો. ચામડી પર ઝેર લાગ્યું હોય તો ઝેરવાળાં કપડાં ઉતારી દો. શરીરના ઝેર પ્રભાવિત ભાગોને સાબુ અને પાણીથી બરાબર ધૂઓ. જોઝર આંખોમાં ગયું હોય તો થોડીવાર આંખોને પાણીમાં સારી રીતે છપછપાવો. ઝેર પેટમાં ગયું હોય ત્યારે જો દર્દી પાણી પી શકતો હોય તો એક-બે ગ્લાસ પાણી પીવડાવો. ઉલટી કરવશો નહીં. તુરંત ડોક્ટરને બોલાવો. સૂચના: મૂર્છા પામેલા દર્દીને મોં વાટે ક્યારેય કશું પણ આપવું જોઈએ નહી. તેને ઉલ્ટી કરાવવાનો પ્રયત્ન કરવો ન જોઈએ. **લક્ષણો:** આ જંતુનાશકના સંપર્કમાં આવવાથી દેખાતાં પ્રારંભિક લક્ષણો છે, આંખની પૂતળીઓ ફેલાવી, સ્નાયુઓમાં અસંતુલન, એટાક્સિયા અને સ્નાયુઓ અકડાઈ જવા. **ચેતવણી:** 1. લેબલ અને લિફ્લેટમાં દર્શાવ્યા હોય તે સિવાયના પાકો અને જીવાત પર આ ઉત્પાદનનો છંટકાવ (ઉપયોગ)કરવો ન જોઈએ. 2. કાપણી/લણણી પછીના છંટકાવ માટે તેનો ઉપયોગ કરવો ન જોઈએ. 3. આ ઉત્પાદનનો છંટકાવ (ઉપયોગ) કર્યા પછી ખાલી કન્ટેનરનો લિફ્લેટમાં જણાવ્યા મુજબ નાશ કરો. 4). પોલી હાઉસ તેમજ કન્ફાઈંડ વિસ્તાર માટેનાં સૂચનો અને માત્રા અંગેની જાણકારી માટે લિફ્લેટ વાંચો.

માઈઝોએટ | మైజోట్

MAIZOATE®

Emamectin Benzoate 5% SG

माइज़ोएट

ईमामेक्टिन बेंजोएट ५% एसजी

Insecticide
कीटनाशक

Net Content 1 kg
शुद्ध मात्रा १ किलो

ALBAUGH®
your alternative

Regn. No.: CIR-249237/2023-Emamectin Benzoate (SG) (442)-63
Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187
Manufactured & Marketed By :
M/s Albaugh India Private Limited 175, Kagalwala House,
2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda
Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad -
Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

रजि. नं.: सीआईआर–२४९२३७/२०२३–ईमामेक्टिन बेंजोएट (एसजी) (४४२)–६३
उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२–२३/१८७
निर्माता और विपणनकर्ता : मे. अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
१७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना,
सांताक्रुज (पू.), होंडा शोरुम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र – ४०००९८।
फैक्टरी : जी–१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया, सनवाड–फतेहनगर,
तेहसिल–मावली, जीला–उदयपूर – ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. :
बैच नं. :
બેચ નં.:

Mfg. Date :
उत्पादन तिथि :
ઉત્પાદન તારીખ:

Exp. Date :
समापन तिथि :
અવધી સમાપ્તિની તારીખ:

Maximum retail price
inclusive of all taxes
in Indian currency ₹:
अधिकतम खुदरा मूल्य
सभी करों सहित
भारतीय मुद्रा में ₹ :
વધુમાં વધુ રીટેલ કિંમત
કરવેરા સાથે
ભારતીય ચલણમાં ₹ :

Unit sale price ₹ :

Net Content 1 kg **शुद्ध मात्रा १ किलो**

®-Registered Trademark

Re-entry: 24 hours **पुन:प्रविष्टी :** २४ घंटे

Keep in dry place away from open heat or open flame.
सूखी और ठण्डी जगह में आग से दूर रखें।
For Agricultural Use Only. **केवल कृषि उपयोग के लिये।**
Imitation of label graphics is a punishable offence.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
DANGER
खतरा
ભય
बच्चों की पहुँच से दूर रखिए
બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

500 gm - 335 x 110 mm - HDPE/PP Jar Bottle

MAIZOATE® Emamectin Benzoate 5% SG Insecticide

माइज़ोएट ईमामेक्टिन बेंजोएट ५% एसजी कीटनाशक

માઈઝોએટ ઈમામેક્ટિન બેંઝોએટ 5% એસજી જંતુનાશક

માઈઝોએટ | మైజోట్

MAIZOATE®
Emamectin Benzoate 5% SG
माइज़ोएट
ईमामेक्टिन बेंजोएट ५% एसजी
Insecticide
कीटनाशक
Net Content 500 gm
शुद्ध मात्रा ५०० ग्राम
ALBAUGH®
your alternative

Net Content 500 gm शुद्ध मात्रा ५०० ग्राम.

®-Registered Trademark

Re-entry: 24 hours पुन:प्रविष्टी : २४ घंटे

Keep in dry place away from open heat or open flame.
सूखी और ठण्डी जगह में आग से दूर रखें।
For Agricultural Use Only. केवल कृषि उपयोग के लिये।
Imitation of label graphics is a punishable offence.

DANGER
खतरा
ભય

250 gm - 252 x 108 mm - HDPE/PP Jar Bottle

MAIZOATE® Emamectin Benzoate 5% SG Insecticide

माइज़ोएट ईमामेक्टिन बेंजोएट ५% एसजी कीटनाशक

માઈઝોએટ ઈમામેક્ટિન બેંઝોએટ 5% એસજી જંતુનાશક

માઈઝોએટ | మైజోట్

MAIZOATE®
Emamectin Benzoate 5% SG
माइज़ोएट
ईमामेक्टिन बेंजोएट ५% एसजी
Insecticide
कीटनाशक
Net Content 250 gm
शुद्ध मात्रा २५० ग्राम
ALBAUGH®
your alternative

Net Content 250 gm शुद्ध मात्रा २५० ग्राम.

®-Registered Trademark

Re-entry: 24 hours पुन:प्रविष्टी : २४ घंटे

Keep in dry place away from open heat or open flame.
सूखी और ठण्डी जगह में आग से दूर रखें।
For Agricultural Use Only. केवल कृषि उपयोग के लिये।
Imitation of label graphics is a punishable offence.

DANGER
खतरा
ભય

100 gm - 252 x 59 mm - HDPE/PP Jar Bottle

MAIZOATE® Emamectin Benzoate 5% SG Insecticide

માઈઝોએટ | మైజోట్

MAIZOATE®
Emamectin Benzoate 5% SG
माइज़ोएट
ईमामेक्टिन बेंजोएट ५% एसजी
Insecticide
कीटनाशक
Net Content 100 gm
शुद्ध मात्रा १०० ग्राम
ALBAUGH®
your alternative

Net Content 100 gm शुद्ध मात्रा २५० ग्राम.

DANGER
खतरा
ભય

Shipper Label - 180 x 110 mm - **CMYK**

માઈઝોએટ | మైజోట్

MAIZOATE®

Emamectin Benzoate 5% SG

माइज़ोएट

ईमामेक्टिन बेंजोएट ५% एसजी

Insecticide
कीटनाशक

ALBAUGH®
your alternative

PACKING

Regn. No.: CIR-249237/2023-Emamectin Benzoate (SG) (442)-63
रजि. नं.: सीआईआर–२४९२३७/२०२३–ईमामेक्टिन बेंजोएट (एसजी)(४४२)–६३
Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187 **उत्पादन लाइसेंस नं.:** एमएल/जेडीपीपी/२०२२–२३/१८७
Manufactured & Marketed By : M/s Albaugh India Private Limited, 175, Kagalwala House, 2nd Floor,
Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
निर्माता और विपणनकर्ता : मे. अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,१७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल,
विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.), होंडा शोरुम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र – ४०००९८।
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar,
Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
फैक्टरी : जी–१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया, सनवाड–फतेहनगर,
तेहसिल–मावली, जीला–उदयपूर – ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaint contact, Customer Care Executive at Registered office address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. / बैच नं. / બેચ નં.:
Mfg. Date / उत्पादन तिथि :
ઉત્પાદન તારીખ:
Exp. Date / समापन तिथि :
અવધી સમાપ્તિની તારીખ:
Maximum retail price ₹:
inclusive of all taxes
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
सभी करों सहित
વધુમાં વધુ રીટેલ કિંમત ₹:
કરવેરા સાથે
Unit sale price:₹

®-Registered Trademark

Read enclosed the leaflet before use
उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें । ઉપયોગ થી પહેલાં સંલગ્ન પત્રિકા વાંચો.
For Agricultural Use Only.
केवल कृषि उपयोग के लिये।

THIS SIDE UP

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
DANGER
खतरा
ભય
बच्चों की पहुँच से दूर रखिए
બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

మైజోయేట్

ఇమామెక్టిన్ బెంజోట్ 5 శాతం ఎస్‌జీ

(కీటకనాశిని)

ఇమామెక్టిన్ బెంజోట్ 5 శాతం ఎస్‌జీ నీటిలో కరిగిపోయే గింజల సూత్రీకరణ. దీనిలో 5 శాతం సక్రియ పదార్థం ఉంది. ప్రత్తిని ఆశించే బోల్‌వర్మ్, బెండని ఆశించే పండు మరియు చిగుళ్లని తొలిచే పురుగు, క్యాబేజీని ఆశించే డీబీఎం, మిరపని ఆశించే పండుని తొలిచే పురుగు, థ్రిప్స్ మరియు చెదలు, వంకాయని ఆశించే పండు మరియు చిగుళ్లని తొలిచే పురుగు, బఠాణీ, ఎర్ర శెనగల్ని ఆశించే కాయని తొలిచే పురుగు, ద్రాక్షని ఆశించే థ్రిప్స్ మరియు తేయాకుని ఆశించే టీ లూపర్‌లని నియంత్రించడానికి సిఫారసు చేయబడుతుంది. కడుపులో చర్యని కలిగించే కీటకనాశిని ఇది. అత్యంత ప్రభావవంతంగా ఉండటానికి లార్వా దీన్ని తినాలి. ప్రభావానికి గురైన లార్వా పక్షవాతానికి గురవుతుంది మరియు ఇమామెక్టిన్ బెంజోట్ 5 శాతం ఎస్‌జీకి బహిర్గతమైన తరువాత వెంటనే తినడం ఆపివేస్తుంది మరియు 2-4 రోజుల తరువాత మరణిస్తుంది.

మొత్తం 100.00 శాతం డబ్ల్యూ/డబ్ల్యూ

హెచ్చరిక: 1. లేబుల్ మరియు కరపత్రం పై పేర్కొనబడిన పంటలు మరియు తెగుళ్ల పై మాత్రమే ఉపయోగించాలి. 2. కోతలు తరువాత ఉపయోగించరాదు. 3. ఉపయోగించిన తరువాత కరపత్రం పై సూచించిన విధంగా కంటైనర్‌ని నాశనం చేయాలి. 4. పాలీ హౌస్‌లు మరియు పరిమిత ప్రదేశాలు కోసం మోతాదు మరియు సూచనలు కోసం కరపత్రం చూడండి.

Telugu

ಮೈಜೋಯೇಟ್

ಇಮ್ಯಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್ 5% SG

(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಇಮ್ಯಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್ 5% SG ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಬಹುದಾದ ಹರಳು ರೂಪದ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ 5% ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗೆ ಬರುವ ಉಂಡೆ ಹುಳಗಳು, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗೆ ಬರುವ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳ, ಕ್ಯಾಬೇಜ್‌ಗೆ ಬರುವ ಉಂಡೆ, ಮೆಣಸು ಬೆಳೆಗೆ ಬರುವ ಹಣ್ಣು ಕೊರೆಯುವ ಹುಳ, ಕೊರೆಯುವ ಹುಳ, ಹುಳಗಳು, ಬದನೆಗೆ ಬರುವ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳ, ಕೆಂಪು ಬೇಳೆಗೆ ಬರುವ ಮೊಗ್ಗು ಕೊರೆಯುವ ಹುಳ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಬಟಾಣಿಗೆ ಬರುವ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳ ಹಾಗೂ ಚಹಾಕ್ಕೆ ಬರುವ ಚಹಾ-ಲೂಪರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದೆಂದು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಕೂಡಾ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೀಟಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರಿದಲ್ಲಿ ಮರಿ ಹುಳಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ನಾಶಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಮ್ಯಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್ 5% SG ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮರಿ ಹುಳಗಳು ಮರಿ ಹುಳಗಳು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಬಳಿಕ 2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತವೆ.

ಒಟ್ಟು: 100.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: 1. ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಭಿತ್ತಿಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆಯವುಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. 2. ಕೊಯ್ಲು ಬಳಿಕದ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. 3. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕಂಟೈನರನ್ನು ಭಿತ್ತಿಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು. 4. ಏಕಾಂತ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನಗಳು– ಭಿತ್ತಿಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿರಿ.

Kannada

മൈജൊയേറ്റ്

ഇമാമെക്റ്റിൻ ബെൻസൊണേറ്റ് 5% എസ്.ജി.

(പ്രാണിനാശിനി)

ഇമാമെക്റ്റിൻ ബെൻസൊണേറ്റ് 5% എസ്.ജി. 5% സക്രിയ ചേരുവ അടങ്ങുന്ന വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്ന തരിരൂപീകരണമാണ് അത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് പരുത്തിയിലെ കായപ്പുഴു, വെണ്ടയിലെ കായ തുരപ്പനും നാമ്പു തുരപ്പനും, കാബേജിലെ പുറത്ത് വൈരനിറമുള്ള ശലഭം, മുളകിലെ കായ തുരപ്പൻ, ഇലപ്പേൻ, ചാഴി, വഴുതനയിലെ കായ തുരപ്പനും നാമ്പു തുരപ്പനും, തുവരയിലെയും വെള്ളക്കടലയിലെയും തൊണ്ടുതുരപ്പൻ, മുന്തിരിയിലെ ഇലപ്പേൻ, തേയിലയിലെ ലൂപ്പർ പുഴു എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാണ്. ഉദരപ്രവർത്തനമുള്ള ഈ പ്രാണിനാശിനി പുഴു ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് പരമാവധി ഫലപ്രദമാകുന്നത്. ബാധിക്കപ്പെട്ട പുഴു സ്തംഭിതമാകുകയും ഇമാമെക്റ്റിൻ ബെൻസൊണേറ്റ് 5% എസ്.ജി. തിന്ന ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതാകുകയും തുടർന്ന് 2-4 ദിവസം കൊണ്ട് ചാകുകയും ചെയ്യും.

Malalayam

মাইজোয়েট

এমামেক্টিন বেঞ্জোয়েট 5% এস.জি.

(কীটনাশক)

এমামেক্টিন বেঞ্জোয়েট 5% এস.জি. জলে দ্রবনীয় একটি দানাদার প্রোডাক্ট যাতে রয়েছে 5% সক্রিয় উপাদান এবং তুলার বলওয়ার্ম, ঢেঁড়স এর ফল ও কান্ড ছেদক, বাঁধাকপির ডি.বি.এম, লঙ্কার ফল ছেদক, থ্রিপস ও মাইটস, বেগুনের ফল ও কান্ড ছেদক, ছোলার শুঁটি ছেদক, অড়হরের শুঁটি ছেদক, থ্রিপস, ও চা-টি লুপার নিয়ন্ত্রনে আনতে সহায়তা করে। এটি এমন এক কীটনাশক যা এই সব কীটপতঙ্গের ও লার্ভার শরীরে প্রবেশ করে সক্রিয়ভাবে কাজ করে। এর ফলে লার্ভা পঙ্গু হয়ে যায় এবং এমামেক্টিন বেঞ্জোয়েট 5% এস.জি. এর কারণে পতঙ্গগুলি 2-4 দিনের মধ্যেই মারা যায়।

3. লিফলেটে দেওয়া নির্দেশ মতো ব্যবহারের পর খালি পাত্র বিনষ্ট করে ফেলতে হবে। 4. পলিহাউস এবং বন্ধ স্থানে ব্যবহার ও উপযুক্ত মাত্রার জন্য - লিফলেট দেখুন।

Bengali

মেইজ'য়েট

ইমামেক্টিন বেঞ্জ'য়েট 5% SG

(কীটনাশক)

ইমামেক্টিন বেঞ্জ'য়েট 5% SG হৈছে এক পানীত দ্ৰৱণীয় দানাদাৰ ফৰ্মুলেশন য'ত 5% সক্ৰিয় তত্ব থাকে আৰু ইয়াক কপাহৰ খেতিত ব'লৱৰ্ম; ভেণ্ডিত ফল আৰু কাণ্ড ছেদক; বন্ধাকবিৰ খেতিত DBM; বেঙেনা খেতিত ফল আৰু কাণ্ড ছেদক; ৰহৰ আৰু কাবুলী চানাৰ খেতিত প'ড ব'ৰাৰ; আঙুৰ খেতিত থ্ৰিপচ আৰু চাহ খেতিত টী-লুপাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ই হৈছে পেটৰ ক্ৰিয়া কৰা কীটনাশক আৰু সৰ্বাধিক প্ৰভাৱশালী হ'বৰ বাবে লাৰ্ভা বা ডিম্ব অৱস্থাত গিলিব লাগে। ইমামেক্টিন বেঞ্জ'য়েট 5% SGৰ স্পৰ্শলৈ অহাৰ পাছত প্ৰভাৱিত লাৰ্ভা পক্ষাঘাতগ্ৰস্ত হৈ পৰে আৰু 2-4 দিন পাছত মৃত্যুমুখত পৰে।

সতৰ্কতাবাণী: 1. লেবেল বা লীফলেটত উল্লেখ নথকা শস্যত প্ৰয়োগ নকৰিব। 2. শস্য চপোৱাৰ পাছৰ প্ৰয়োগ হিচাপে ব্যৱহাৰ নকৰিব। 3. লীফলেটত দিয়া অনুসৰি প্ৰয়োগৰ পাছত পাত্ৰটো নষ্ট কৰি পেলাব। 4. পলি-হাউছ আৰু আবদ্ধ অঞ্চলৰ নিৰ্দেশ আৰু ড'জৰ বাবে- লীফলেটখন চাওক।

Assamese

مائی زویٹ

امامکٹین بنزوایٹ 5% ایس جی

(دود کش)

امامکٹین بنزوایٹ 5% ایس جی ایک پانی میں گھلنے والا دانہ دار مرکب ہے جس میں 5% فعال مادہ ہے اور جس کا استعمال کپاس میں سنڈی، بھنڈی میں تنوں اور پھلوں کو چھیدنے والے کیڑوں، پتہ گوبھی میں ہیرے پیٹھ والے پتنگے، بھلوں کو چھیدنے والے کیڑے، قملے، مرچ میں دیمک، بیگن میں پھلوں اور تنوں کو چھیدنے والے کیڑے، اربر اور چنے کی پھلی کو چھیدنے والے کیڑے، انگوروں میں قملوں اور چائے میں ٹی لوپر کو کنٹرول کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ یہ دود کش پیٹ میں جاکے اثر کرنے والا ہے اور اچھے اثر کے لئے اسے الیوں کا کھانا ضروری ہے۔ امامکٹین بنزوایٹ 5% ایس جی کے واسطے پڑنے پے الیاں مفلوج ہو کر کھانا پینا بند کردیتی ہیں جس کے بعد 2-4 د ن کے اندر ہی اندرو ہ مرجاتی ہیں –

Urdu

READ ENTIRE LEAFLET BEFORE USE.

प्रयोग से पहले पूरी पत्रिका ध्यानपूर्वक पढ़े।

MAIZOATE®

Emamectin Benzoate 5% SG
(Insecticide)

माइज़ोएट

ईमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी
(कीटनाशक)

Manufactured & Marketed By :
M/s Albaugh India Private Limited,
175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri
Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda
Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.

निर्माता एवं विपणनकर्ता :
मे. अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
१७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग,
कलीना, सांताक्रुज (पू.), होंडा शोरुम के पीछे,
मुंबई, महाराष्ट्र – ४०००९८।

Factory : G-155, RIICO Industrial Area,
Sanwad-Fatehnagar, Tal.- Mavli, Dist.-
Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी : जी–१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया,
सनवाड–फतेहनगर, तेहसिल–मावली,
जीला–उदयपूर – ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaint contact, Customer Care Executive at Registered office address,
Tel: 180030003335,
Email: contactin@albaughllc.com

Re-entry: 24 hours
पुन:प्रविष्टी : २४ घंटे

For Agricultural Use Only.

केवल कृषि उपयोग के लिये।

ALBAUGH® your alternative

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

MAIZOATE®

Emamectin Benzoate 5% SG
(Insecticide)

Emamectin benzoate 5% SG is a water soluble granular formulation containing 5% active ingredient and is recommended for the control of Bollworms on Cotton, Fruit and Shoot borer on Okra, DBM on Cabbage, Fruit borer, Thrips, Mites on Chilli, Fruit and Shoot borer on Brinjal, Pod borer on Red gram & Chickpea Grape-Thrips and Tea - Tea looper. It is an insecticide with stomach action and should be ingested by the larvae to be most effective. Affected larvae become paralyzed and stop feeding shortly after exposure to Emamectin Benzoate 5% SG and subsequently die after 2-4 days.

Recommendation:

Crop (s)	Common Name of Pest	Dosage/HA A.I. (g)	Dosage/HA Formulation (g)	Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
Brinjal	Fruit & Shoot borer	10	200	500	3
Cabbage	Diamond back moth	7.5-10	150-200	500	3
Chickpea	Pod borer	11	220	500	14
Chilli	Fruit borer, thrips, mites	10	200	500	3
Cotton	Bollworms	9.5-11.0	190-220	500	10
Grapes	Thrips	11	220	500-1000	5
Okra	Fruit and shoot borer	6.75-8.5	135-170	500	5
Redgram	Pod borer	11	220	500-750	14
Tea	Tea looper	10	200	500	1

Direction of Use: Apply the insecticides when the incidence of larvae is first observed and repeat applications as necessary. Apply the insecticide in sufficient quantity of water to ensure through coverage of the foliage. Emamectin benzoate 5% SG is toxic to Aquaculture and Honey bees.

Time of Application: When pest population reaches to Economic Threshold Level (ETL).

Precautions: Do not use cooking utensils for preparing the spray solution. Use stick for stirring the spray solution. Avoid contact with skin, eye and clothing. Avoid inhalation of fog and vapours. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Wear protective clothing, mask, goggles and boots while handling the product. Do not eat, drink or smoke while applying the product. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Avoid contamination of air and water bodies with the insecticides. Also wash the contaminated clothes.

Symptoms of Poisoning: Early symptoms of poisoning may be a combination of dilation of pupils, muscular in coordination, ataxia and muscle tremors.

First Aid: Remove the affected person to as well ventilated area or fresh air and protect him from under cooling. Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. Rinse eyes with clean water for several minutes. If ingested, give the patient one or two glasses of water, if able to swallow. Do not induce vomiting. Get the attention of the medical doctor immediately. Note: Do not induce vomiting or never give anything by mouth to an unconscious person.

Phytotoxicity: The product is not phytotoxic when used as per recommendation.

Antidote: No specific antidote. Treat symptomatically.

Disposal of Used Container: 1. Packages or surplus materials and washing from the machines and containers should be disposed off in safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions: 1. The package containing the insecticide should be stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, airy, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour. 3. The product is toxic to aquaculture & honeybee.

Chemical Composition:

Emamectin benzoate a.i. (Based on 95% Purity)	5.00% w/w
Sodium N-methyl-N-oleoyl taurate	7.50% w/w
Sodium alkyl naphthalene sulfonate	1.00% w/w
Polydimethylsiloxane	0.10% w/w
Lactose anhydrous	QS % w/w
Total:	**100.00% w/w**

Caution: 1. Not to Be Used on Crops other than Specified on this Label/Leaflet. 2. Not to be Used for Post-harvest Application. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area-refer to the leaflet.

माइज़ोएट

ईमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी
(कीटनाशक)

इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एस.जी. पानी में घुलने वाले सूत्रीकरण है। जिसमें 5% सक्रिय तत्व मौजूद है। यह कपास की डोडे की सुंडियाँ, भिंडी की तना व फल छेदक, पत्तागोभी के हीरक पीठ पतगें, मिर्च के फल छेदक, चुरदा, धुन, बैंगन के तना व फल छेदक इल्ली, अरहर और चना के फली छेदक, अंगूर का चुरदा, चाय में चाय का लूपर की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। यह कीटनाशक पेट में जाने पर असर दिखाता है और अच्छे नियंत्रण के लिए इसे इल्लियों के द्वारा खाना आवश्यक है। इमामेक्टिन बेंजोएट के संपर्क होने पर, इल्लियाँ लकवाग्रस्त हो जाती है और खाना बंद कर देती है तथा 2–4 दिनों में मर जाती है।

उपयोग:

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा स.त. (ग्रा.)	प्रति हेक्टेयर मात्रा संरचना (ग्रा.)	पानी की मात्रा (लीटर)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिनों में)
बैंगन	फल व तना छेदक	10	200	500	3
पत्तागोभी	हीरक पतगें	7.5–10	150–200	500	3
चना	फली छेदक	11	220	500	14
मिर्च	फल छेदक, चुरदा व घुन	10	200	500	3
कपास	डोडे की सुंडियाँ	9.5–11.0	190–220	500	10
अंगूर	चुरदा	11	220	500–1000	5
भिंडी	तना व फल छेदक	6.75–8.5	135–170	500	5
अरहर	फली छेदक	11	220	500–750	14
चाय	चाय का लूपर	10	200	500	1

उपयोग के लिये दिशा–निर्देश: जब इल्लियां पहली बार दिखाई देता है, तब निर्देश के अनुसार इस कीटनाशक का छिड़काव करें। जरूरत लगे तो, पुनः छिड़काव करें। कीटनाशक को निर्दिष्ट मात्रा में पानी में मिलाकर अच्छी तरह से छिड़काव कीजिए। इमामेक्टिन बेंजोएट 5 प्रतिशत एस.जी. एक्वाकल्चर एवं मधुमक्खी के लिए हानिकारक है।

प्रयोग का समय: जब कीट की आबादी आर्थिक दहलीज स्तर (ईटीएल) तक पहुंच जाती है।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: स्प्रे तैयार करने के लिए खाना पकाने के बर्तनों का इस्तेमाल मत कीजिए। स्प्रे के घोल हिलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करे। त्वचा, आँख और मुँह को कीटनाशी को संपर्क से बचाए तथा श्वास द्वारा अन्दर जाने से रोके। सुरक्षात्मक कपड़े जैसे कि ऐप्रान, दस्ताने, नकाब और गम बूट आदि पहन कर ही इसका प्रयोग करें। कीटनाशक को प्रयोग करते समय, खाना, पीना और धूम्रपान करना नही चाहिए। प्रति दिन प्रयोग के बाद कीटनाशी से प्रभावित हिस्सों को अच्छी तरह से धो लें और कपड़ा बदल ले। दूषित कपड़ो को अच्छी तरह धो ले।

विष के लक्षण: इस कीटनाशक से संपर्क होने पर दिखाई देने वाले प्रारम्भिक लक्षण है: पुतलियों का फैलना, असंतुलन, एटाक्सिया: लड़खड़ाना और मांस पेशियों में ऐंठन होना।

प्राथमिक चिकित्सा: रोगी को ताजी हवा में ले आयें तथा अधिक ठंडे पड़ने से बचाएं। त्वचा में लगने पर दूषित कपड़ो को उतार दें तथा उसके प्रभावित हिस्सों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो डालें। आँखों में चले जाने पर आँखों को स्वच्छ पानी से कई मिनटों तक छपछपाएं। पेट में चले जाने पर यदि रोगी पानी पी सकता है तो, एक या दो गिलास पानी दें। सूचना: उल्टी न करायें तथा तुरंत डाक्टर को बुलायें। यदि मरीज बेहोश हो तो, मुंह में कुछ न दें। उल्टी कराने की कोशिश न करें।

पौधविषाक्तता: सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौध विषाक्त नहीं है।

विष नाशक: कोई विशेष विष प्रतिहार नहीं, लक्षणानुसार उपचार करें।

खाली डिब्बों का निपटारा: 1. पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए खाली डिब्बे, बचा हुआ घोल, मशीनों का धोवन और डिब्बों का निपटारा सुरक्षित स्थान पर करें। 2. खाली डिब्बों का पुन: प्रयोग रोकने के लिए उन्हें बाहर न छोड़ें। 3. खाली डिब्बों को तोड़ मोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए।

संग्रहण की शर्तें: 1. कीटनाशक के डिब्बों को अन्य सामग्री विशेषकर खाद्य पदार्थों के संग्रहण कक्ष या स्थान से दूर किया जाना चाहिए अथवा कीटनाशक की मात्रा तथा स्वभाव को ध्यान में रखते हुए डिब्बों को अलग अलमारी में ताला चाबी लगाकर रखें। 2. कीटनाशक का संग्रहण कक्ष या स्थान रोशनीदार, मजबूत, बनावत का, हवादार तथा पर्याप्त लम्बाई का होना चाहिए जिससे वाष्प द्वारा प्रदूषण न हो। 3. एक्वाकल्चर व मधुमक्खियों के लिए हानिकारक।

रासायनिक संरचना:

इमामेक्टिन बेंजोएट स.त. (95% शुद्धता पर आधारित)	5.00% भार/भार
सोडियम–एन–मिथाइल–एन–ओलियैल–टॉरेट	7.50% भार/भार
सोडियम अल्काईल नैफ्थालीन सल्फोनेट	1.00% भार/भार
पोलीडायमिथाईल सिलोक्सेन	0.10% भार/भार
लैक्टोज एनहाईड्रस	पर्याप्त मात्रा % भार/भार
कुल:	**100.00% भार/भार**

सावधानियां कथन: 1. इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। 2. फसल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें। 3. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बे) को नष्ट कर दें। 4. पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक–पर्ची देखें।

ਮਾਇਜ਼ੋਏਟ

ਈਮਾਮੇਕਟਿਨ ਬੈਂਜ਼ੋਏਟ 5% ਐਸ.ਜੀ.

(ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ)

ਈਮਾਮੇਕਟਿਨ ਬੈਂਜ਼ੋਏਟ 5% ਐਸ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5% ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਟੀਂਡੇ ਦੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ, ਭਿੰਡੀ ਦੀ ਤਨਾ ਅਤੇ ਫਲ ਛੇਦਕ, ਪੱਤਾਗੋਭੀ ਦੇ ਹੀਰਕ ਪਿੱਠ ਕੀਟ, ਮਿਰਚ ਦੇ ਫਲ ਛੇਦਕ, ਚੁਰਦਾ, ਘੁਣ, ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਤਨੇ ਅਤੇ ਫਲ ਛੇਦਕ ਲਾਰਵਾ, ਅਰਹਰ ਅਤੇ ਫਲੀ ਛੇਦਕ ਅਤੇ ਛੋਲੇ ਦੇ ਫਲੀ ਛੇਦਕ ਅੰਗੂਰ ਵਿੱਚ ਥ੍ਰਿਪਸ, ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦਾ ਲੂਪਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਲਾਰਵਾ ਦੁਆਰਾ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਈਮਾਮੇਕਟਿਨ ਬੈਂਜ਼ੋਏਟ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਲਾਰਵਾ ਲਕਵਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

Punjabi

मायझोएट

इमामेक्टिन बेन्झोएट 5% एस.जी.

(कीटकनाशक)

इमामेक्टिन बेन्झोएट 5% एस.जी. हे पाण्यात विरघळणारे दाणेदार फॉर्म्युलेशन आहे ज्यात 5% सक्रिय तत्त्व आहे. कापसावरील बॉलरूम, भेंडीवरील फ्रूट आणि शूट बोरर, कोबीवरील डीबीएम, मिरचीवरील फ्रूट बोरर, थ्रिप्स आणि माइट्स, वांग्यावरील फ्रूट आणि शूट बोरर, चणाडाळ, आणि लाल हरभऱ्यावरील पॉड बोरर, आणि द्राक्षावरील थ्रिप्स आणि चहा वरील टी लुपरच्या नियंत्रणासाठी याचा वापर करण्याचा सल्ला दिला जातो. हे कीटकनाशक पोटात गेल्यावर परिणाम करतं आणि अधिक चांगल्या परिणामासाठी ते अळ्यांनी खाणे गरजेचे आहे. हे खाल्ल्यावर अळ्यांना लकवा मारतो आणि त्या खाणं बंद करतात आणि 2–4 दिवसांत मरतात.

Marathi

માઈઝોએટ

ઈમામેક્ટિન બેંઝોએટ 5% એસ.જી.

(જંતુનાશક)

ઈમામેક્ટિન બેંઝોએટ 5% એસ.જી. એ પાણીમાં ઓગળી જનારી દાણાદાર દવા છે. જેમાં 5% સક્રિય તત્વ મોજુદ છે. આ દવાનો ઉપયોગ કપાસમાં બોલવોર્મ, ભીંડીમાં ફ્રુટ અને શૂટ બોરર, કોબીઝમાં ડીબીએમ, મરચાંમાં ફ્રુટ બોરર, થ્રિપ્સ અને માઈટ્સ, રીંગણમાં ફ્રુટ અને શૂટ બોરર, તુવેર અને ચણામાં પોડ બોરર, દ્રાક્ષમાં થ્રીક-પી અને ચામાં ટી લૂપર જેવા રોગો પર અંકુશ માટે કરવામાં આવે છે. આ જંતુનાશક પેટમાં જતાં જ પ્રભાવ દેખાડે છે અને વધુ અસર થાય એ માટે આ દવા કીડાના પેટમાં જવી જરૂરી છે. ઈમામેક્ટિન બેંઝોએટના સંપર્કમાં આવતાં જ કીડા લકવાગ્રસ્ત થઈ જાય છે અને ખાવાનું બંધ કરી દે છે. પછીના 2-4 દિવસમાં તે મરી જાય છે.

Gujarati

ମାଇଜୋଏଟ୍

ଇମାମେକଟିନ ବେଞ୍ଜୋଏଟ 5% ଏସ.ଜି.

(କୀଟନାଶକ)

ଇମାମେକଟିନ ବେଞ୍ଜୋଏଟ 5% ଏସ.ଜି. ପାଣିରେ ଦ୍ରବିଭୂତ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଦାନାଦାର ସଂରଚନା ଯେଉଁଥିରେ 5% ସକ୍ରିୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଏହା କପାରେ ବଲୱର୍ମ, ଭେଣ୍ଡି ରେ କାଣ୍ଡ ବା ପତ୍ର ବିନ୍ଧା, ବନ୍ଧା କୋବି ରେ ହିରକ ପିଠି ବାଲା କୀଟ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରେ ଫଳ ବିନ୍ଧା, ଥ୍ରିପ୍ସ, ମାଇଟ୍ସ, ବାଇଗଣରେ ଫଳ ଓ କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପୋକ। ହରଡ଼ ରେ ଛୁଇଁ ବିନ୍ଧା, ଚଣା ଆଦିରେ ଛୁଇଁ ବିନ୍ଧା, ଅଙ୍ଗୁର ରେ ଥ୍ରିପ୍ସ, ଚା ରେ ଚା ଲୁପର ଇତ୍ୟାଦିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି କୀଟନାଶକ ପେଟକୁ ଯାଇ ପାରିବା ପରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇଥାଏ। ଏବଂ ଆହୁରି ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭାବ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଲାର୍ଭା ସ୍ତରରୁ ଖୁଆଇବା ଜରୁରୀ। ଇମାମେକଟିନ ବେଞ୍ଜୋଏଟ ର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ପରେ ଲାର୍ଭା ଗୁଡିକ ପକ୍ଷାଘାତ ର ଶିକାର ପରି ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତି। ତା ପରେ 2-4 ଦିନରେ ମାରି ଯାଆନ୍ତି।

Oriya

பைஜோயேட்

இமாமெக்ட்டின் பென்ஸோட்டே 5% எஸ்.ஜி.

(பூச்சிக்கொல்லி மருந்து)

இமாமெக்ட்டின் பென்ஸோட்டே 5% எஸ்ஜி நீரில் கரையக்கூடிய துகள்களாக இருக்கும் ஒரு ஃபார்முலா. இதில் 5% வீர்யமான மூலப்பொருள் அடங்கியுள்ளது. பருத்தியில் காய்ப்புழு, வெண்டையில் காய் மற்றும் குருத்துத் துளைப்பான், முட்டைக் கோஸில் வைரமுதுகுப் பூச்சி, மிளகாயில் பழத்துளைப்பான், திரிப்ஸ், கரையான், கத்தரியில் காய் மற்றும் குருத்துத் துளைப்பான், துவரையில் விதைப்பை துளைப்பான், பட்டாணி திராட்சையில் திரிப்ஸ், தேயிலையில் டீ லூப்பர் ஆகிய பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்த இது பயன்படுகிறது. இது வயிற்றில் கலந்து செயல்படும் பூச்சிக் கொல்லி மருந்து. இதைக் கூட்டுப்புழு உட்கொள்ளுமானால் மிகவும் பயனளிக்கும். இமாமெக்ட்டின் பென்ஸோட்டே 5% எஸ்ஜி மருந்தை உட்கொண்ட கூட்டுப்புழு முடங்கிப் போய், உணவு உண்பதை நிறுத்தி விடும், பிறகு அடுத்த 2-4 நாட்களில் இறந்து விடும்.

Tamil