PANTONE 193C

PANTONE 5535 C

PANTONE 5535 C 10%

1 Ltr - 270 x 142 mm - HDPE (Imida) Yellow Bottle - **Roll Form**



500 ml - 226 x 110 mm - HDPE (Imida) Yellow Bottle - **Roll Form**



5 Ltr - 546 x 150 mm - HDPE (Imida) Yellow Bottle - **Sheet Form**

Shipper Label - 180 x 110 mm - **CMYK**



NISHUDAK®
Glyphosate 41% SL
(Herbicide)

It is non - selective a herbicide which contains Isopropyl amine salt of glyphosate 41% (w/w) and balance inert material and auxiliares. It is effective against annual and perennial grasses and broadleaf weeds of tea and non cropped area.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Weeds	Dosage/HA		Dilution in Water	Waiting Period between last spray to harvest (days)
		A.I. (gm)	Formu-lation (Ltr)	(Ltr)	
Non cropped areas	*Sorghum halepense* and other monocot & dicot weeds general weed control	820-1230	2.0-3.0	500	-
Tea	*Axonopus Compressus*, *Cynodon dactylon*, *Imperata Cylindrica*, *Polygonum perfoliatum*, *Paspalum Scrobiculatum*, *Arundinella bengalensis*, *Kalm grass*	820-1230	2.0-3.0	450	21

Direction of Use:

Plant Protection Equipment: Knapsack sprayer fitted with a flat fan or flood jet nozzle is to be used while applying the weedicide Gator rocking sprayer & Knapsack weedicide sprayer can also be used. Preparation of Spray Solution: Add slowly the required quantity of weedicides to water & stir well. with a stick or rod. While preparing large quantity of spray solution & weedicide to a bucket of half filled with water. Stir & then empty the pre-solution into the bulk of water. **Caution:** Herbicide should be sprayed from ground and care should be taken to drift hazard to the adjoining crop field.

Time of Application: Tea & non crop area:- Apply as directed spray when the weeds are young and actively growing.

Precautions:

1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food.
2. Avoid contact with mouth, eyes and skin.
3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind.
4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of Poisoning:

Headache, nausea, vomiting, giddiness and convulsion may occur.

First Aid:

1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious.
2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water.
3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/ clear water for about 10 to 15 minutes.
4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity:

The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Antidote:

No specific antidote is known. Treat Symptomatically.

Disposal of Used Container:

1. It shall be the duty of manufactures formulators and operator to dispose packages or surplus materials and washings from the machine and container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions:

1. The packages containing the herbicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of or shall be kept in separate almirahs under lock and key depend upon the quantity and nature of the herbicide.
2. The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, dry, well-lit and ventilated and of sufficient dimensions.

Chemical Composition:

Isopropyl amine salt of Glyphosate a.i.	40.60% w/w
Manufacturing Impurities	4.00% w/w
Surfactant Inert Poly oxy ethylene amine	15.00% w/w
Water	Q.S. % w/w
Total:	**100.00% w/w**

Caution: 1. Not to Be Used on Crops other than Specified on this Label/Leaflet. 2. Not to be Used for Post-harvest Application. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area-refer to the leaflet.

Telugu

నిషోదక్
గ్లైఫోసేట్ 41% S.L.
(కలుపుసంహారి)

ఇది ఎంపిక చేయబడని కలుపునాశని. దీనిలో గ్లైఫోసేట్ 41 శాతం (బా/బా) యొక్క ఐసోప్రొపైలామైన్ ఉప్పు మరియు తక్కిన జడ పదార్థములు మరియు ఆవశ్యక కొవ్వుకలుపు మరియు గడ్డిని మరియు ఏకదళ మొక్కలు మరియు తోటలు మొక్కల అంతర పెరుగు గల కలుపు మొక్కలు మరియు పంట ప్రాంతం కాని ప్రదేశం పై ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది.

సిఫారసు:

పంట	కలుపు మొక్కల సాధారణ పేరు	మోతాదు/హెక్టేర్		నీటిలో కలపవలసిన పరిమాణం	ఆఖరి పిచికారీ తరువాత కోతకు పట్టే రోజులు
		ఎ.ఐ. (గ్రా.)	ఫార్ములేషన్ (లీటర్)	(లీటర్)	
పంటలేని ప్రాంతాలు	సోర్గమ్ హాలెపెన్స్ మరియు ఇతర మోనోకాట్ మరియు డైకాట్ రకపు కలుపు మొక్కల సాధారణ కలుపు నివారణ	820-1230	2.0-3.0	500	-
తేయాకు	ఆక్సోనోపస్ కంప్రెసస్, సైనోడాన్ డాక్టైలన్, ఇంపెరాటా సిలిండ్రికా, పాస్పలమ్ స్క్రోబిక్యులటమ్, అరుండినెల్లా బెంగలెన్సిస్, కళం గడ్డి	820-1230	2.0-3.0	450	21

ఉపయోగించవలసిన విధానం:

మొక్కలపై కాంతితో సాయిగ్ గడువైన ఫ్లాట్ లేదా ఫ్లడ్ జెట్ నాజిల్ అమర్చబడిన నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్‌ను ఉపయోగించి కలుపుమొక్కలపై పిచికారీ చేయాలి. గేటర్ రాకింగ్ స్ప్రేయర్ మరియు నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్‌ను కూడా ఉపయోగించవచ్చు. పిచికారీ ద్రావణం తయారీ: పిల్లి నెమ్మదిగా కావలిసిన మొత్తంలో కలుపుమొక్కలనాశిని నీటిలో కలపాలి. సగం నీటిని బాకెట్‌లో పెట్టి మొత్తంలో పిచికారీ ద్రావణం మరియు కలుపునాశిని కలిపి పెద్ద మొత్తంలో నీటిలో కలిపి ఉపయోగించాలి. గమనిక: పిచికారీ ద్రావణాన్ని పొరుగు పంటపై పడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. **హెచ్చరిక:** కలుపునాశిని పిచికారీ చేసేటప్పుడు గాలి వీచే దిశలో పిచికారీ చేయాలి.

పిచికారీ సమయం: తేయాకు & పంటలేని ప్రాంతం:- కలుపు మొక్కలు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మరియు చురుకుగా పెరుగుతున్నప్పుడు సూచించిన విధంగా పిచికారీ చేయాలి.

జాగ్రత్తలు:

1. ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీ ఆహార పదార్థాల కంటైనర్లు మరియు జంతువుల ఆహారాలకు దూరంగా ఉంచాలి.
2. నోటి, కళ్ళు మరియు చర్మానికి తగలకుండా చూడాలి.
3. పిచికారీ చేసిన తుంపర్లు పీల్చకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. గాలి దిశలో పిచికారీ చేయాలి.
4. పిచికారీ చేసిన తర్వాత కలుషితమైన దుస్తులు మరియు శరీర భాగాలపై బాగా కడుక్కోవాలి.
5. పిచికారీ చేసేటప్పుడు ఏదీ తినరాదు, త్రాగరాదు, పొగ తాగరాదు.
6. పిచికారీ చేసేటప్పుడు మరియు చుక్కలగా పిచికారీ చేసేటప్పుడు రక్షణ దుస్తులు ధరించాలి.

విషం ఎక్కినట్లయితే లక్షణాలు:

తలనొప్పి, వికారం, వాంతులు, తల తిరగడం మరియు మూర్ఛలు కలగవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స:

1. మింగినట్లయితే, గొంతు లోపల చేయి పెట్టి వాంతి తెప్పించాలి. వాంతి పూర్తిగా బయటకు వచ్చేంత వరకు ఇలా పునరావృతం చేయాలి. లేని స్పృహలో రోగికి వాంతి తెప్పించరాదు.
2. చర్మం, దుస్తులు కలుషితమైతే దుస్తులు, క్రిమిసంహారి మరియు కాలిన్చిన తరువాత సబ్బు, నీటి సహాయంతో కలుషితమైన చర్మాన్ని కడగాలి.
3. కళ్ళు కలుషితమైతే కనీసం 10-15 నిమిషాల పాటు నీటితో కడగాలి.
4. పీల్చినట్లయితే, రోగిని తాజా గాలిలోకి తీసుకురావాలి.

పంటవిషాలకు:

సూచన చేసిన ప్రకారం ఉపయోగిస్తే పంటవిషంలేదు.

విరుగుడు:

ఎటువంటి విరుగుడు లేదు. లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయాలి.

ఖాళీ డబ్బాల పారవేత:

1. క్రిమిసంహారక మందులు/ఫార్ములేటర్ల బాధ్యత ఏమనగా ఖాళీ డబ్బాలు, మిగిలిన మందు మరియు కడిగిన నీటిని పర్యావరణానికి మరియు నీటి కాలుష్యం కలగకుండా సురక్షితమైన పద్ధతిలో పారవేయాలి.
2. ఖాళీ డబ్బాలను మళ్ళీ వాడకుండా ఉండటానికి వాటిని బహిరంగ ప్రదేశాలలో వదిలివేయరాదు.
3. ఖాళీ డబ్బాలను పగలగొట్టి, నివాస ప్రదేశాలకు దూరంగా పాతిపెట్టాలి.

నిల్వ చేయవలసిన విధానం:

1. కలుపునాశిని కలిగిన డబ్బాలను ఇతర వస్తువులు నిల్వ చేసిన గదులకు దూరంగా ప్రత్యేక గదులలో లేదా అల్మారాలలో తాళం వేసి నిల్వ చేయాలి.
2. శిలీంధ్రనాశిని నిల్వ చేసే గదులు బాగా నిర్మించబడి, పొడిగా, వెలుతురు మరియు గాలి ప్రసరణ బాగా ఉండాలి.

రసాయనిక సంఘటనలు:

ఐసోప్రొపైల్ అమైన్ సాల్ట్ ఆఫ్ గ్లైఫోసేట్ ఎ.ఐ.	40.60% w/w
తయారీ అవసరాలు	4.00% w/w
సర్ఫక్టెంట్ ఇనర్ట్ పాలీ ఆక్సీ ఇథిలీన్ అమైన్	15.00% w/w
నీరు	Q.S. % w/w
మొత్తం:	**100.00% w/w**

జాగ్రత్తలు: 1. ఈ లేబుల్‌లో/కరపత్రంలో పేర్కొనని పంటలపై దీనిని ఉపయోగించరాదు. 2. కోత అనంతరం ఉపయోగించరాదు. 3. ఉపయోగించిన తరువాత కంటైనర్‌ను ధ్వంసం చేయాలి. 4. పాలీ హౌస్‌లు మరియు మూసి ఉన్న ప్రదేశాలలో ఉపయోగించడానికి సంబంధించిన వివరాలకు కరపత్రాన్ని చూడండి.

Kannada

ನಿಷ್ಕೋದಕ್
ಗ್ಲೈಫೋಸೇಟ್ 41% S.L.
(ಕಳೆನಾಶಕ)

ಇದು ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲದ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಫೋಸೇಟ್ ಸಾಂದ್ರತೆ 41 ಶೇಕಡಾ (ತೂ/ತೂ) ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಮತೋಲನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಡ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಗಳಿವೆ. ಚಹಾ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮತ್ತು ಬಹುವರ್ಷ ಹುಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅಗಲ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಚಹಾ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸ್ಸು:

ಬೆಳೆ	ಕಳೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್		ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣ (ಲೀಟರ್)	ಅಂತಿಮ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲಿನ ನಡುವಿನ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
		ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾಂ)	ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಲೀಟರ್)		
ಬೆಳೆಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಸೋರ್ಘಮ್ ಹೆಲೆಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಡೈಕಾಟ್ ಕಳೆಗಳು	820-1230	2.0-3.0	500	–
ಚಹಾ	ಆಕ್ಸೋನೊಪಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸಸ್, ಸೈನೊಡಾನ್ ಡಾಕ್ಟಿಲಾನ್, ಇಂಪೆರಾಟ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕ, ಪಾಸ್ಪಲಮ್ ಸ್ಕ್ರೊಬಿಕ್ಯುಲಟಮ್, ಅರುಂಡಿನೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಲೆನ್ಸಿಸ್, ಕಾಲಂ ಹುಲ್ಲು	820-1230	2.0-3.0	450	21

ಉಪಯೋಗ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು:

ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆಗಿ ಇರುವ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಹ ಜೆಟ್ ನಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಗೇಟರ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಸಿಂಪಡಣಾ ದ್ರಾವಣ ತಯಾರಿಕೆ: ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ನೀರಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುರಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿಬಿಡಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಣ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಅರ್ಧ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಬಕೆಟ್‌ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಳೆನಾಶಕ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿಬಿಡಬೇಕು. ಮೊದಲೇ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿರುವ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಇಡೀ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿಬಿಡಬೇಕು. ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. **ಎಚ್ಚರಿಕೆ:** ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ನೆಲದಿಂದ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು.

ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯ: ಚಹಾ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು:- ಕಳೆಗಳು ಎಳೆಯದಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಶಃಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ:

1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಖಾಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಶುಗಳ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು.
2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗುಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
3. ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಕಣಗಳು ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಒಳಕ್ಕೆ ಸೇರದಿರುವಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿರಿ. ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
4. ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
5. ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅಥವಾ ಏನನ್ನೂ ಜಗಿಯಬೇಡಿ.
6. ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಬೆರೆಸುವಾಗ ಕೈಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ವಿಷ ಆಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು:

ತಲೆನೋವು, ವಾಕರಿಕೆ, ತಲೆ ತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೆಳೆತಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:

1. ನುಂಗಿದ್ದಲ್ಲಿ: ಗಂಟಲಿಗೆ ಕೈ ಬೆರಳು ಹಾಕಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ.
2. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ್ದಲ್ಲಿ: ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಹೇರಳ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
3. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತಗುಲಿದ್ದಲ್ಲಿ: ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹೇರಳ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
4. ಉಸಿರಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ: ರೋಗಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ.

ಸಸ್ಯಗಳ ವಿಷತ್ವತೆ:

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷತ್ವತೆಯಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿವಿಷ:

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿವಿಷ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು.

ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ:

1. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದೇ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.
2. ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಳಸದಂತೆ ಮಾಡಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿ ಹೂಳಬೇಕು.

ಬಳಸದ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಿಧಾನ:

1. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪಶುಗಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು.
2. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರಬೇಕು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಅಂತರವಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಗ್ಲೈಫೋಸೇಟಿನ ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಅಮೀನ ಲವಣದ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಮಾಣ	40.60% ಭಾ/ಭಾ
ತಯಾರಿಕಾ ಸಮಯದ ಕಲ್ಮಷಗಳು	4.00% ಭಾ/ಭಾ
ಸರ್ಫಕ್ಟೆಂಟ್ ಜಡ ಪಾಲಿ ಆಕ್ಸಿ ಇಥಿಲೀನ್ ಅಮೀನ್	15.00% ಭಾ/ಭಾ
ಎಫುಲೆಂಟ್ ಅಲೀನ	
ನೀರು	Q.S % ತೂ/ತೂ
ಒಟ್ಟು:	**100.00% ತೂ/ತೂ**

ಟಿಪ್ಪಣಿ: 1. ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಾರದು. 2. ಕೊಯ್ಲು ಬಳಿಕ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. 3. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. 4. ಪಾಲಿ ಹೌಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿರಿ.

Malayalam

നിശുദാക്
ഗ്ലൈഫോസേറ്റ് 41% എസ്.എൽ.
(കളനാശിനി)

ഇത് ഒരുപൊലെയുള്ള ഐസൊപ്രൊപൈൽ അമീന ലവണം 41% (ഭാ/ഭാ) കൂടാതെ ബാക്കി ജഡപദാർത്ഥങ്ങളും അനുബന്ധങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഒരു നോൺ-സെലക്ടീവ് കളനാശിനിയാണ്. വേരിലെതിരെയും കൂമ്പി പ്രയോഗങ്ങളിലെയും വാർഷികവും ബഹുവത്സരവും പുല്ലുകൾക്കും വിനിയുള്ള ഇലകളുള്ള കളകൾക്കും എതിരെ ഇത് ഫലപ്രദമാണ്.

ശുപാർശ:

വിള	കളകളുടെ സാധാരണ പേര്	മാത്രാവർധകം. സ.ഘ. ഗ്രാം/ഹെക്ടർ (ഇ.)	വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിക്കേണ്ട അളവ് (ലിറ്റർ)	അവസാന തളിക്കലിനും വിളവെടുപ്പിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം (ദിവസങ്ങൾ)
കൃഷി ചെയ്യാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ	അലിപ്പും വർഗ്ഗവും പൊതുവായ കള നിയന്ത്രണത്തിന് മറ്റ് എകദേശവും.	820-1230	2.0-3.0	500 -
തോട്ടങ്ങൾ	ഓക്സനോപസ് കമ്പ്രെസ്സസ്, സൈനോഡോൺ ഡാക്റ്റിലോൺ, ഇംപെരാറ്റാ സിലിന്ദ്രിക, പാസ്പലം സ്ക്രോബിക്കുലേറ്റം, അറുണ്ടിനെല്ല ബെങ്കാലെൻസിസ്, കാം പുല്ല്	820-1230	2.0-3.0	450 21

പ്രയോഗ നിർദ്ദേശം:

സ്പ്രേ ടാങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് ഫാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡ് ജെറ്റ് നോസിൽ ഘടിപ്പിച്ച നാപ്സാക്ക് സ്പ്രേയർ ഉപയോഗിച്ച് കളനാശിനി തളിക്കുക. ഗേറ്റർ റോക്കിംഗ് സ്പ്രേയർ, നാപ്സാക്ക് സ്പ്രേയർ എന്നിവയും ഉപയോഗിക്കാം. സ്പ്രേ ലായനി തയ്യാറാക്കൽ: ആവശ്യമായ അളവ് കളനാശിനി വെള്ളത്തിൽ സാവധാനം ചേർത്ത് ഒരു കമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ഇളക്കുക. വലിയ അളവിൽ സ്പ്രേ ലായനി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ വെള്ളം പകുതി നിറച്ച ഒരു ബക്കറ്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ കളനാശിനി ഇടുക. ഇളക്കിയ ശേഷം വലിയതോതിലുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് തയ്യാറാക്കിയ മുഴുവനും ഒഴിക്കുക. മുന്നറിയിപ്പ്: കളനാശിനി തളിയ്ക്കുമ്പോൾ കാറ്റിന്റെ ദിശയിലേക്ക് തളിക്കുക. അടുത്തുള്ള വിളയിൽ സ്പ്രേ ലായനി പതിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം.

പ്രയോഗ സമയം: തേയില & പച്ച പയറുത്ത സ്ഥലം കളകൾ ധാരാളം തഴച്ചുവളരുന്ന സമയത്ത് ചെടികൾ ഇലയിൽ തളിക്കുക.

മുൻകരുതൽ:

1. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, ഒഴിഞ്ഞ ഭക്ഷ്യവസ്തു കണ്ടെയ്നറുകൾ, മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം എന്നിവയിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുക.
2. വായിലും കണ്ണിലും ത്വക്കിലും തട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കുക.
3. തളിക്കുന്ന സമയം കാറ്റിന്റെ ദിശയിലേക്ക് തളിക്കുക.
4. തളിച്ചതിനുശേഷം ശരീരഭാഗങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും നന്നായി കഴുകുക.
5. തളിക്കുന്ന സമയത്ത് പുകവലിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ ചവയ്ക്കുകയോ അരുത്.
6. തുടക്കം മുതൽ തളിക്കുന്നതുവരെ പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക.

വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ:

തലവേദന, ഛർദ്ദൽ, ഓക്കാനം, തലകറക്കം, കോച്ചൽ എന്നിവ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത.

പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ:

1. വിഴുങ്ങിയാൽ തൊണ്ടയിൽ പിന്നിൽ ഇക്കിളിയിട്ട് ഛർദ്ദിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക. ഛർദ്ദി തെളിഞ്ഞതുവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുക. ബോധമില്ലാത്തവർക്ക് ഛർദ്ദിക്കാൻ കൊടുക്കരുത്.
2. വസ്ത്രങ്ങളും ശരീരവും മലിനമായാൽ വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റിയതിനുശേഷം ധാരാളം സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് ശരീരഭാഗങ്ങൾ കഴുകുക.
3. കണ്ണുകൾ മലിനമായാൽ ധാരാളം ശുദ്ധജലമോ ഉപ്പുവെള്ളമോ ഉപയോഗിച്ച് 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് നേരമെങ്കിലും കഴുകുക.
4. ശ്വസിച്ചാൽ രോഗിയെ ശുദ്ധവായു ലഭ്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുക.

ചെടികൾക്കുള്ള വിഷാംശം:

നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചെടികൾക്ക് വിഷാംശമില്ല.

പ്രതിവിഷം:

പ്രത്യേക പ്രതിവിഷമൊന്നുമില്ല. രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചികിത്സിക്കുക.

ഉപയോഗിച്ച പാത്രങ്ങൾ നശിപ്പിക്കൽ:

1. കീടനാശിനി നിർമ്മാതാക്കൾ/ഫോർമുലേറ്റർമാർ/ഓപ്പറേറ്റർമാർ എന്നിവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പാത്രങ്ങൾ, ബാക്കിവന്ന കീടനാശിനി, കഴുകിയ വെള്ളം എന്നിവ പരിസ്ഥിതിക്കും ജലത്തിനും ദോഷം വരാത്ത വിധത്തിൽ നശിപ്പിക്കുക എന്നത്.
2. ഉപയോഗിച്ച പാത്രങ്ങൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനായി അവ പൊട്ടിച്ചുകളയുക.
3. പാത്രങ്ങൾ പൊട്ടിച്ച് ജനവാസമുള്ള സ്ഥലത്തുനിന്നും മാറി കുഴിച്ചിടുക.

സൂക്ഷിക്കുന്ന വിധം:

1. കീടനാശിനി മറ്റ് വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കുക. കുട്ടികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും കിട്ടാത്ത രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കുക.
2. കുമിൾനാശിനി സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറികൾ നല്ലതുപോലെ പണിതതും, ഉണങ്ങിയതും, നല്ല വെളിച്ചവും വായുസഞ്ചാരവുമുള്ളതും ആയിരിക്കണം.

രാസഘടന:

ഗ്ലൈഫോസേറ്റിന്റെ ഐസോപ്രൊപൈൽ അമീനിന്റെ ശുദ്ധ രൂപം	40.60% ഭാ/ഭാ
നിർമ്മാണ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ	4.00% ഭാ/ഭാ
സർഫക്റ്റന്റ് ഇനർട്ട് പോളി ഓക്സിൽ അമീൻ	15.00% ഭാ/ഭാ
ജലം	Q.S % ഭാ/ഭാ
ആകെ:	**100.00% ഭാ/ഭാ**

മുൻകരുതൽ: 1. ഈ ലേബലിൽ/ലഘുലേഖ