PARTY : PRABHUKRUPA
JOB NAME : PIXMA SYSTEMIC AND CONTACT FUNGICIDE 100 G
DATE : 20.03.2025
ARTIST : KP

This JPEG / PRINT may not be mached exactly with our Gravure Cylinder Proof.
While every effort has been made to carry out instruction to the customer's satisfaction, we will not be liable for errors not noted on this print. Customers are requested to check the Artwork along with it's diamensions throughly before authorising for Engraving.

BLACK	COMMON P 576 C	COMMON P 5473 C	COMMON CYAN	COMMON P 5473 (10%) C	COMMON WHITE

300. mm

10 mm | 70. mm | 140. mm | 70. mm | 10 mm

200. mm | 180. mm | 10 mm

PIXMA®

Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP
(Systemic and Contact Fungicide)

Read enclosed leaflet before use. Chemical Composition: Carbendazim Technical (based on 98% w/w a.i.): 12.25% w/w, Mancozeb Technical (based on 85% w/w a.i.): 74.12% w/w, Sodium Salt of alkyl aryl sulfonate: 2.00% w/w,Sodium Salt of alkyl naphthyl sulfonate: 2.00% w/w, Kaolin 9.63% w/w, **Total 100% w/w. Direction Of Use:** Read attached leaflet before use. **Precautions:** 1. Keep away from foodstuff container and animals flood. 2. Avoid contact with mouth, eye and skin 3. Avoid inhalation of the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat, and chew anything while spraying 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying 7. Pregnant women should avoid contact with Carbendazim Formulation. 8. The ETU content should not be more than 0.5%. 9. The product should be stored in cool and dry condition. **Antidote:** No specific antidote is known. treat symptomatically. **First Aid:** 1. If swallowed, include vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the cloths and wash the contaminate skin with copious amount of soap and water. 3. If eye are contaminated, flush with plenty of saline/clear water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. **Symptoms:** Sweating, headache, lethargy. coughing, sneezing, itching, nausea, vomiting may occur. **Recommendations:** Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP is a systemic and contact fungicide used for seed treatment for the effective control of tikka leaf spot, collar rot and dry root rot diseases of Groundnut, Blast on Paddy, Early blight, Late blight, black scurf on Potato, Blister blight, Grey blight, Red rust, Dieback, Black rot on Tea, Downy mildew, Powdery mildew & Anthracnose on Grape, Powdery mildew & Anthracnose on Mango, Leaf spot, fruit rot and Powdery mildew on Chilli, Downy mildew & leaf blight on Maize, Fruit scab & Powdery mildew on Apple and Tikka leaf spot on Groundnut, Alternaria leaf spot and grey mildew on Cotton, Alternaria leaf spot, Myrothecium leaf spot Pod & stem blight, Anthracnose on Soybean, twig blight , sooty mould, anthracnose fruit rot and anthracnose leaf spot on Mandarin. **Caution :-** Product is toxic to fish and aquatic organism and thus its use may be avoided near aquaculture. **Caution:** 1. Not to Be Used on Crops other than Specified on this Label/Leaflet. 2. Not to be Used for Post-harvest Application. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area-refer to the leaflet.

पिक्स्मा

कार्बेन्डाजिम १२% + मैनकोजेब ६३% डब्ल्यू. पी.
(अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय फंफूदीनाषक)

उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढें। रासायनिक संरचना: कार्बेन्डाजिम टेक्निकल (९८ स.त.): १२.२५% भार/भार, मैनकोजेब टेक्निकल (८५ स.त.): ७४.१२% भार/भार, सोडियम साल्ट-एलकिल एराइल सल्फोनेट २.००% भार/भार, सोडियम साल्ट-एलकिल नेफथाइल सल्फोनेट २.००% भार/भार, केअालिन निष्क्रिय पदार्थ ९.६३% भार/भार, **कुल: १००% भार/भार. उपयोग के लिए दिशा-निर्देश:** इस्तेमाल करने से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री, के खाली बर्तनों और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुंह, आँखो, त्वचा को सम्पर्क से बचाये। ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचाये। हवा की दिशा में छिड़काव करे। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना पीना और कुछ चबाना नही चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहने। ७. गभर्वती महिलाओं को कार्बेन्डाजिम की संरचना के स्पर्श से दूर रहना चाहिए। ८. ई टी यू की मात्रा ०.५ प्रतिशत से ज्यादा नही होनी चाहिए। ९. उत्पाद का ठण्डी व सूखी जगह पर भंडारण करना चाहिए। **विष नाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुरगुदी करके उलटी कराए। यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उलटी दारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उलटी न करावें। २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़ों को उतार दे दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आँखे दूषित हो जाए तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी में लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस दारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ला जाये। **लक्षण:** पसीना, सिरदर्द, आलस्य, खांसी, छींक, खुजली, मितली, उल्टी हो सकती है। **उपयोग:** कार्बेन्डाजिम १२% + मेनकोजेब ६३% डब्ल्यू. पी. एक अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय फफूंदीनाशक है। जिसका प्रयोग बीजोपचार के रूप में मूंगफली का तना गलन, कोलर रॉट और जड़ गलन, धान में शहसमारी, आलू में अगेती अंगमारी, पछेती अंगमारी, कला कोढ़, चाय में फफोला अंगमारी, भूरापन अंगमारी, लाल गरुआ, सूखा रोग, काली सड़न, अंगूर में मृदुरोमिल आसिता, चूर्णी फफूंदी, अंगमारी, आम में चूर्णी फफूंदी, अंगमारी, चिर्च में पत्ती धब्बा, फल सड़न, चूर्णी फफूंदी, मक्का में मृदुरोमिल आसिता, पत्ती का अंगमारी, सेब में पामारोग, चूर्णी फफूंदी, मूंगफली में तना गलन, कपास में अल्टरनेरिया पर्ण दाग और भूरापन आसिता, सोयाबीन में अल्टरनेरिया पर्ण दाग, मिरोथेशियम पर्ण दाग, पौड एंड स्टेम ब्लाइट, अंगमारी, मैंडरिन में ट्रिग ब्लाइट, सूटी मोल्ड, अंगमारी फल विलप्त, ऐन्थ्राक्नोज पर्ण चिति रोगों के प्रभावी नियंत्रण के लिए किया जाता है। **सावधान:** उत्पाद मछली और जलीय जीवों के लिए जहरीला है और इसका उपयोग मत्स्यपालन के पास करने की अनुमति नहीं है। **चेतावनी:** १) लेबल और सूचना पत्रक पर सूचित फसलों और कीटों के अलावा अन्य किसी के फसल या कीटों पर इस्तेमाल ना करें. २) फ्रसल कटाई के बाद के कामों के लिए इस्तेमाल ना करें. ३) पत्रक पर दिए गए निर्देशों के अनुसार कंटेनर नष्ट करें. ४) पॉली हाउसेस और बंद इलाका और मात्रा के बारे में निर्देशों के लिए-पत्रक देखें.

પિક્સ્મા

કાર્બેન્ડાઝિમ 12%+ મેન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુ.પી.
(અંતઃપ્રવાહી અને સ્પર્શીય ફૂગનાશક)

ઉપયોગ થી પહેલાં સંલગ્ન પત્રિકા વાંચો. રાસાયણિક સંરચના: કાર્બેન્ડાઝિમ ટેક્નિકલ (95 એ.આઈ.): 12.25%, મેન્કોઝેબ ટેક્નિકલ (85 એ.આઈ.): 74.12% ભાર/ ભાર, સોડિયમ સોલ્ટ- આલ્કાઇલ એરાઇલ સલ્ફોનેટ 2.00% ભાર/ભાર, સોડિયમ સોલ્ટ- આલ્કાઇલ નેપ્થાઇલ સલ્ફોનેટ 2.00% ભાર/ભાર, કેઅાલિન નિષ્ક્રિય પદાર્થ 9.63% ભાર/ભાર, **કુલ: 100% ભાર/ભાર. ઉપયોગ માટે નિર્દેશ:** ઉપયોગ કરવા પૂર્વે સંલગ્ન લીફલેટ વાંચો. **પ્રયોગકર્તાઓ માટે સાવધાની:** 1. ખાદ્યસામગ્રી, ખાદ્યસામગ્રીનાં ખાલી વાસણો અને પશુઓના ચારાથી દૂર રાખો. 2. મોઢું, આંખો, ત્વચા સાથે સંપર્કથી બચો. 3. છંટકાવની બાષ્પને શ્વાસ દ્વારા અંદર જવાથી બચો. હવાની દિશામાં છંટકાવ કરો. 4. છંટકાવ પછી દૂષિત કપડાં અને શરીરનાં અંગોને સારી રીતે ધુઓ. 5. છંટકાવ સમયે ખાવું, પીવું, ચગળવું કે ધૂમ્રપાન નહીં કરવું જોઇએ. 6. છંટકાવ કરતી વખતે અથવા મિશ્રણ કરવા સમયે પૂર્ણ સુરક્ષાત્મક કપડાં પહેરો. 7. ગર્ભવતી મહિલાઓએ કાર્બેન્ડાઝિમની સંરચનાના સ્પર્શથી દૂર રહેવું જોઇએ. 8. ઈટીયુની માત્રા 0.5 ટકાથી વધુ નહીં હોવી જોઇએ. 9. ઉત્પાદની ઠંડી અને સૂકી જગ્યામાં સંગ્રહ કરવું જોઇએ. **વિષનાશક:** કોઈ વિશિષ્ટ વિષનાશક નથી. લક્ષણ અનુસાર ઇલાજ કરો. **પ્રાથમિક ચિકિત્સા:** 1. જો પેટમાં જાય તો ગળાની પાછળ ગલગલી કરીને ઊલટી કરાવો. આ ક્રિયા ત્યાં સુધી દોહરાવતા રહો જ્યાં સુધી ઊલટી દ્વારા નીકળતો પદાર્થ સાફ નહીં થાય. જો દર્દી બેભાન હોય તો ઊલટી નહીં કરાવો. 2. જો કપડાં અને ત્વચા દૂષિત થાય તો દૂષિત કપડાં કાઢી નાખો અને દૂષિત ત્વચાને ભરપૂર પાણી અને સાબુથી ધોઈ નાખો. 3. જો આંખો દૂષિત થઈ જાય તો તેને પૂરતી માત્રામાં સલાઇન/ સ્વચ્છ પાણીમાં લગભગ 10–15 મિનિટ સુધી ધુઓ. 4. જો શ્વાસમાં જાય તો દર્દીને શુદ્ધ હવામાં બહાર લાવો. **લક્ષણો:** પસીનો, માથામાં દર્દ, બેચેની, ખાંસી, છીંક, ખંજવાળ, ઊબકા, ઊલટી થઈ શકે છે. **ઉપયોગ:** કાર્બેન્ડાઝિમ 12%+ મેન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુ.પી. એક અંતઃપ્રવાહી અને સ્પર્શીય ફૂગનાશક છે, જેનો પ્રયોગ બીજોપચારના રૂપમાં મગફળીમાં ડાળપી બ્લેટ, કોલર રોટ અને જડ બ્લેટ, ડાંગરમાં શહસમારી, બ્લેટમાં પછેતી અંગમારી, પછેતી અંગમારી, કલા કોઢ, ચામાં ફૂગી અંગમારી, ભૂરાપણું અંગમારી, લાલ ગેરૂ, સૂકો રોગ, કાળો સડો, દ્રાક્ષમાં મૃદુરોમિલ છારો, ભૂકી છારો, અંગમારી, કેરીમાં ચૂર્ણી ફૂગ, અંગમારી, મરચામાં પાન ધબ્બા, ફળ સડો, ચૂર્ણી ફૂગ, મકાઇમાં મૃદુરોમિલ છારો, પાનની અંગમારી, અફરજનમાં પામારોગ, ચૂર્ણી ફૂગ, મગફળીમાં ડાળપી બ્લેટ, કપાસમાં આલ્ટરનેરિયા પર્ણીય ડાઘ અને ભૂરાપણું અંગમારી, સોયાબીનમાં આલ્ટરનેરિયા પર્ણીય ડાઘ, મિરોથેશિયમ પર્ણીય ડાઘ, પૌડ અને સ્ટેમ બ્લાઇટ, અંગમારી, મેન્ડરિનમાં ટ્રિચગ બ્લાઇટ, સૂટી મોલ્ડ, અંગમારી ફળ વિલપ્ત, એન્થ્રેક્નોઝ પર્ણીય ચિતી રોગોને પ્રભવશાળી નિયંત્રણ માટે કરાય છે. **સાવધાન:** ઉત્પાદન માછલી અને સમુદ્રિ જીવો માટે ઝેરી છે અને તેનો ઉપયોગ મત્સ્યપાલનની નજીક કરવાની મંજૂરી નથી. **સાવચેતીનું નિવેદન:** 1. લેબલ અને પત્રકો પર ઉલ્લેખિત સિવાયના પાક અને જંતુઓ પર ઉપયોગ નહીં કરો. 2. લણણી પશ્ચાત છંટકાવ માટે ઉપયોગ નહીં કરવો જોઇએ. 3. ઉપયોગ પછી ડબ્બા પત્રકમાં નિર્દેશ અનુસાર નાશ કરો, 4. પોલી હાઉસીસ અને બંધિયાર જગ્યા માટે નિર્દેશ અને માત્રા- પત્રક જુઓ.

पिक्स्मा | પિક્સ્મા

PIXMA®

Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP

पिक्स्मा

कार्बेन्डाजिम १२% + मैनकोजेब ६३% डब्ल्यू. पी.

SYSTEMIC AND CONTACT FUNGICIDE
अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय फफूंदीनाशक

Net Content 100 gm
शुध्द मात्रा १०० ग्राम

ALBAUGH™
your alternative

Regn. No. : CIR-228850/2022-Carbendazim + Mancozeb (WP) (442)-975
पंजी. नं. / રજિ.નં.: सीआयआर-२२८८५०/२०२२-कार्बेन्डाजिम + मैनकोजेब (डब्ल्यू. पी.) (४४२)-९७५
Mfg. Lic No. : ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं. / ઉ.લા.ન.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By :
M/s ALBAUGH INDIA PRIVATE LIMITED
175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Metro Est, Kalina, Mumbai - 400098, Maharashtra.
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

निर्माता और विपणनकर्ता : **मेसर्स अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**
१७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना सांतांक्रुज (पू)बिहांइंड होंडा शोरुम, मुंबई – ४०००९८, महाराष्ट्र
फैक्टरी : जी–१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड फतेहनगर, मावली, जिल्हा उदयपुर – ३१३२०५, राजस्थान , इंडिया

For any Complaint contact Customer care Executive at Registered office, address, Tel. : 180030003335
Email : contactin@albaughllc.com

Batch No. :
बैच नं. :
બેચ નં.:

Mfg. Date :
उत्पादन तिथि :
ઉત્પાદન તારીખ:

Exp. Date :
समापन तिथि :
અવધી સમાપ્તિની તારીખ:

Maximum retail price inclusive of all taxes in Indian currency ₹:
अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में ₹ :
વધુમાં વધુ રીટેલ કિમંત કરવેરા સાથે ભારતીય ચલણમાં ₹ :
Unit sale price ₹ : शुध्द मात्रा :

Net Content : 100 g शुध्द मात्रा : १०० ग्रा

Re-entry: 24 hours पुन-प्रवेश : २४ घंटे
Keep in cool, dry place away from heat and open flame.
सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें ।

®-Registered Trademark

For Agricultural Use Only कृषि उपयोग के लिए केवल

Imitation of label graphics is a punishable offence.

PIXMA®

Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP
(Systemic and Contact Fungicide)

Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP is a systemic and contact fungicide used for seed treatment for the effective control of tikka leaf spot, collar rot and dry root rot diseases of Groundnut, Blast on Paddy, Early blight, Late blight, black scurf on Potato, Blister blight, Grey blight, Red rust, Dieback, Black rot on Tea, Downy mildew, Powdery mildew & Anthracnose on Grape, Powdery mildew & Anthracnose on Mango, Leaf spot, fruit rot and Powdery mildew on Chilli, Downy mildew & leaf blight on Maize, Fruit scab & Powdery mildew on Apple and Tikka leaf spot, Collar rot and Dry root rot on Groundnut.

Caution: Product is toxic to fish and aquatic organism and thus its use may be avoided near aquaculture.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA A.I. (gm)	Formulation (gm)	Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (days)
Apple	Fruit scab & Powdery mildew	0.19%	0.25%	As required depending on crop canopy	20
Chilli	Leaf spot, fruit rot and powdery mildew	563	750	500	3
Cotton	Alternaria leaf spot and grey mildew	180+945	1500	500	71
Grape	Downy mildew, powdery mildew, anthracnose	0.11%	0.15%	As required depending on crop canopy	7
Groundnut	Leaf spot, blast	375	500	500	72
Groundnut	Tikka leaf spot, Collar rot & Dry root rot	1.88	2.5	0	seed treatment
Maize	Downy mildew & Leaf blight	120+630	1000	500	37
Mandarin	Twig blight, Sooty mould, anthracnose fruit rot and anthracnose leaf spot	0.23%	0.30%	500	30
Mango	Powdery mildew, anthracnose	0.11%	0.15%	As required depending on crop canopy	7
Paddy	Blast	563	750	750	57
Potato	Early blight, Late blight, Black scurf	1312.5	1750	500	47
Soybean	Alternaria leaf spot, Myrothecium leaf spot Pod & stem blight, Anthracnose	750+ 787.5	1250	500	31
Tea	Blister blight, Grey blight, Red rust, Die-back, Black rot	937.5	1250	250-500	7

Direction of Use: Spray by using high volume sprayer viz. Knapsack sprayer.

Time of Application: The product should be sprayed immediately on appearance of disease symptoms. As per recommendation, mix the pesticides and water at right dosage and spray. Before spraying the pesticides, It's suspension should be mixed well by a wooden stick.

Precautions: 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

CAUTION FOR WORKERS/USERS: while using fungicide workers/users must wear full protective clothing like long sleeved shirt, long pant, chemical resistant gloves, shoes, goggles hat and mask.

Symptoms of Poisoning: Sweating, headache, lethargy, coughing, sneezing, itching, nausea, vomiting may occur.

First Aid: 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of lukewarm water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity: The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Fish toxicity: toxic to fish.

Antidote: No antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of Used Container: 1. Packages or surplus material and washing from the machines and container shall be disposed off in such a manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages should not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages should be burried away from habitation and source of water.

Storage Conditions: 1. The package containing the fungicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing articles or shall kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of fungicide. 2. The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, dry, well lit and ventilated and sufficient dimension.

Chemical Composition:

Carbendazim Technical (based on 98% w/w a.i.)	12.25% w/w
Mancozeb Technical (based on 85% w/w a.i.)	74.12% w/w
Sodium Salt of alkyl aryl sulfonate	2.00% w/w
Sodium Salt of alkyl naphthyl sulfonate	2.00% w/w
Kaolin	9.63% w/w
Total:	**100.00% w/w**

Caution: 1. Not to Be Used on Crops other than Specified on this Label/Leaflet. 2. Not to be Used for Post-harvest Application. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area-refer to the leaflet.

English

पिक्स्मा

कारबेन्डाजिम 12% + मैनकोजेब 63% धुलनशील पाउडर
(अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

कारबेन्डाजिम 12% + मैनकोजेब 63% डब्लूपी. एक अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय फफूंदीनाशक है। जिसका प्रयोग बीजोपचार के रूप में मूंगफली का तना गलन, कॉलर रॉट और जड़ गलन, धान में ब्लास्टस्, आलू में अगेती अंगमारी, पछेती अंगमारी, काला कोढ़, चाय में फफोला अंगमारी, भूरापन अंगमारी, लाल गरुआ, सूखा रोग, काली सडन, अंगूर में तुलासी, पूर्णी फफूंदी, अंगमारी, आम में पूर्णी फफूंदी, अंगमारी, मिर्च में पत्ती धब्बा, फल सडन, पूर्णी फफूंदी, मक्का में मृदुरोमिल आसिता, पत्ती का अंगमारी, सेब में पामरोग, पूर्णी फफूंदी, मूंगफली में तना गलन, कॉलर रॉट और जड़ गलन रोगों के प्रभावी नियंत्रण के लिए किया जाता है।

सावधान: उत्पाद मछली और जलीय जीवों के लिए जहरीला है और इसका उपयोग मत्स्यपालन के पास करने की अनुमति नहीं है।

उपयोग:

फसल	कीट का नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा स.त. (ग्राम)	संरचना (ग्राम)	पानी की मात्रा (लीटर)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिनों में)
सेब	पाम रोग, पूर्णी फफूंदी	0.19%	0.25%	फसल की संरचना के अनुसार आवश्यक मात्रा	20
मिर्च	पत्ता धब्बा, फल विगलन रोग, पूर्णी फफूंदी	563	750	500	3
कपास	अल्टरनेरिया पर्ण धब्बा, ग्रे आर्मी ब्लाइट आसिता	180+ 945	1500	500	71
अंगूर	पूर्णीफफूंद आसिता ग्रे, पूर्णीफफूंद आसिता, एन्थ्रेक्नोज	0.11%	0.15%	फसल की संरचना के अनुसार आवश्यक मात्रा	7
मूंगफली	पत्ती धब्बा, तना गलन	375	500	500	72
मूंगफली	टिक्का रोग, कॉलर रोट	1.88	2.5	0	बीजोपचार
मक्का	मृदुरोमिल आसिता, पत्ती का अंगमारी	120+ 630	1000	500	37
मैंडारिन	टिप्पा ब्लाइट, सूटी मोल्ड, एन्थ्रेक्नोज फल विगलन, एन्थ्रेक्नोज पर्ण विगलि	0.23%	0.30%	500	30
आम	पूर्णीता आसिता, एन्थ्रेक्नोज	0.11%	0.15%	फसल की संरचना के अनुसार आवश्यक मात्रा	7
धान	ब्लास्टमार्गी	563	750	750	57
आलू	अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट	1312.5	1750	500	47
सोयाबीन	अल्टरनेरिया पर्ण धब्बा, मिरोथेसियम पर्ण धब्बा, पौड एंड स्टेम ब्लाइट, एन्थ्रेक्नोज	750+ 787.5	1250	500	31
चाय	विस्टर ब्लाइट, ग्रे ब्लाइट, रेड रस्ट, डाय बैक, ब्लैक रोट	937.5	1250	250– 500	7

उपयोग के लिये दिशा–निर्देश: पौध पर लाइने वाले छिड़काव यंत्र तथा उच्च आयतन वाले छिड़काव यंत्र का प्रयोग करें।

प्रयोग का समय: इस फफूंदनाशक का प्रयोग रोग के लक्षण दिखने पर तुरंत छिड़काव करें। निर्देश अनुसार फफूंदनाशक एवं पानी का उचित मात्रा में मिश्रण करके छिड़काव करें। फफूंदनाशक के छिड़काव से पहले, इसके घोल को अच्छी तरह एक लकड़ी द्वारा मिला लें।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियां: 1. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं से पाने से दूर रखें। 2. मुंह, आंखों और त्वचा को सम्पर्क से बचाएं। 3. छिड़काव की धाम को हवा द्वारा उड़ाने से बचाएं। इस की दिशा में छिड़काव करें। 4. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। 5. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। 6. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

कार्मकों और उपयोगकर्ता के लिए चेतावनी: फफूंदीनाशक से काम करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े जैसे पूरी बाहू की कमीज, लम्बी पैन्ट, जूते, चश्मे, सुरक्षित, टोप, रसायन रोधी दस्ताने पहनने चाहिए।

विष के लक्षण: पसीना, सिरदर्द, आलस्य, खांसी, छींक, खुजली, मितली, उल्टी हो सकती है।

प्राथमिक चिकित्सा: 1. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराए। यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराये। 2. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़े उतार दें। दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। 3. यदि आंखें दूषित हो जाए तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी में लगभग 10–15 मिनट तक धोएं। 4) यदि लोग द्वारा अंदर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जाये।

पौधविषाक्तता: सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह फफूंदनाशक पौधविषाक्त नहीं है।

विष नाशक: कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा: 1. फफूंदनाशक निर्माताओं या उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि डिब्बे या पात्रों को लापरवाह आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए। 2. खाली डिब्बों को बाहर न रखिए ताकि दुबारा इस्तेमाल न हो सके। 3. डिब्बों या बची हुई फफूंदनाशक या धोवन का निपटारा इस प्रकार कि करें जिससे आस–पास की नीचे, पौधे का पानी दूषित न हो।

संग्रहण की शर्तें: 1. फफूंदनाशक रखे हुए डिब्बों आदि ऐसे कमरे या अन्य वस्तुओं के रखे जाने वाले कमरे या जगह से दूर ही या अलमारी में ताला कुंजी लगाकर प्रमाण व प्रकार के हिसाब से रखें। 2. जिस कमरे या अलमारी में फफूंदनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाशयुक्त हवादार तथा पर्याप्त लम्बा चौड़ा होना चाहिए जिससे कि फफूंदनाशक के भाप से प्रदूषण होने का डर न हो।

रासायनिक संरचना:

कारबेन्डाजिम टेक्निकल (98% स.त. पर आधारित)	12.25% भार/भार
मैन्कोजेब टेक्नीकल (85% स.त. पर आधारित)	74.12% भार/भार
सोडियम सॉल्ट–एलकिल नेफ्थाइल सल्फोनेट	2.00% भार/भार
केओलिन निष्क्रिय पदार्थ	9.63% भार/भार
कुल	**100.00% भार/भार**

सावधानियां कथन: 1. इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। 2. फसल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें। 3. खाली पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बे) को नष्ट कर दें। 4. पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक–नहीं देखें।

Hindi

पिक्स्मा

कार्बेन्डाजिम 12% + मान्कोजेब 63% डब्लूपी.
(अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મેન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યૂપી. એક અંતર્પ્રવાહી અને સ્પર્શીય ફફૂંદીનાશક છે. જિંકલ અસર મંગફળી પાકમાં થડ ગલન, કોલર રોટ અને ડ્રાય રૂટ રોટ; ડાંગરમાં પાકમાં ઘારા બ્લાસ્ટ; બટાકામાં પાકમાં શેલા અર્લી બ્લાઈટ, લેટ બ્લાઈટ, કોલર રોટ અને ડ્રાય રૂટ રોટ; ટામેટામાં પાકમાં શેલા બ્લાસ્ટ; મરચામાં પાકમાં ફળ સડો, પાન ધબ્બા અને પાઉડરી મિલ્ડયૂ; દ્રાક્ષમાં પાકમાં ડાઉની મિલ્ડયૂ અને પાઉડરી મિલ્ડયૂ; આમ્રમાં પાકમાં ડાઉની મિલ્ડયૂ, પાઉડરી મિલ્ડયૂ અને એન્થ્રેક્નોઝ; કેળામાં પાકમાં ફળ સડો અને પાઉડરી મિલ્ડયૂ; મકાઈમાં પાકમાં ડાઉની મિલ્ડયૂ અને લીફ બ્લાઈટ; સફરજનમાં પાકમાં ઘારા ફ્રૂટ સ્કેબ અને પાઉડરી મિલ્ડયૂ તેમજ મરકામાં પાકમાં ઘારા ડીઝ સ્પોટ, કોલર રોટ અને ડ્રાય રૂટ રોટ વગેરે સામે રક્ષણ કરવા વપરાય છે.

સાવધાન: ઉત્પાદન માછલી અને જલીય જીવો માટે ઝહરીલા છે અને ફ્રાયસ ઉત્પાદન મત્સ્યપાલન જે પાસ કરવે કી અનુમતિ નહીં છે।

ઉપયોગ:

પાક	કીટ નામ	પ્રતિ હેક્ટેયર માત્રા સ.ત. (ગ્રામ)	સંરચના (ગ્રામ)	પાણી ની માત્રા (લીટર)	અંતિમ છિડકાવ તથા પાકના કાટવે ની વીચ અંતરાલ (દિનો મે)
સફરજન	ફ્રૂટ સ્કેબ અને પાઉડરી મિલ્ડયૂ	0.19%	0.25%	પાકની કેનોપી અનુસાર જરૂરી માત્રા પ્રયુ ઉપયોગ કરવું	20
મરચાં	ગોલ બ્લાઈટ, ફ્રૂટ સડો અને પાઉડરી મિલ્ડયૂ	563	750	500	3
કપાસ	અલ્ટરનેરિયા પર્ણ ધબ્બા અલ્ટરનેરિયા લીફ સ્પોટ અને ગ્રે મિલ્ડયૂ	180+ 945	1500	500	71
દ્રાક્ષ	અલ્ટરનેરિયા બ્લાઈટ, પાઉડરી મિલ્ડયૂ, એન્થ્રેક્નોઝ	0.11%	0.15%	પાકની કેનોપી અનુસાર જરૂરી માત્રા પ્રયુ ઉપયોગ કરવું	7
મગફળી	પાન ધબ્બા, બ્લાઈટ	375	500	500	72
મગફળી	ટિક્કા રોગ, કોલર રોટ	1.88	2.5	0	બીજોપચાર
મકાઈ	ડાઉની મિલ્ડયૂ અને લીફ બ્લાઈટ	120+ 630	1000	500	37
મેન્ડેરિન	ટિપ્પ બ્લાઈટ, સૂટી મોલ્ડ, એન્થ્રેક્નોઝ ફ્રૂટ સડો અને એન્થ્રેક્નોઝ લીફ સ્પોટ	0.23%	0.30%	500	30
કેરી	પાઉડરી મિલ્ડયૂ અને એન્થ્રેક્નોઝ	0.11%	0.15%	પાકની કેનોપી અનુસાર જરૂરી માત્રા પ્રયુ ઉપયોગ કરવું	7
ડાંગર	બ્લાસ્ટ	563	750	750	57
બટાટા	અર્લી બ્લાઈટ, લેટ બ્લાઈટ અને બ્લેક સ્કર્ફ	1312.5	1750	500	47
સોયાબીન	અલ્ટરનેરિયા પર્ણ ધબ્બા, સ્ટેમ બ્લાઈટ, એન્થ્રેક્નોઝ	750+ 787.5	1250	500	31
ટી	બ્લિસ્ટર બ્લાઈટ, ગ્રે બ્લાઈટ, રેડ રસ્ટ, ડાઈ બેક, બ્લેક રોટ	937.5	1250	250– 500	7

ઉપયોગ કેવી રીતે કરવું: પૌધ પર લાઇને લાઇ છિડકાવ કાલક યંત્ર તથા ઉચ્ચ આયતન વાલે છિડકાવ યંત્ર કા પ્રયોગ કરે।

ઉપયોગ કા સમય: ઇસ ફફૂંદનાશક કા પ્રયોગ રોગ કે લક્ષણ દિખને પર તુરંત છિડકાવ કરે। નિર્દેશ અનુસાર ફફૂંદનાશક એવં પાની કા ઉચિત માત્રા મે મિશ્રણ કરકે છિડકાવ કરે। ફફૂંદનાશક કે છિડકાવ સે પહલે, ઇસકે ઘોલ કો અચ્છી તરહ એક લકડી દ્વારા મિલા લે।

પ્રયોગકર્તાઓં કે લિયે સાવધાનિયાં: 1. ખાદ્યસામગ્રી, ખાદ્ય સામગ્રી કે ખાલી બર્તન ઔર પશુઓં કો પાને સે દૂર રખેં। 2. મુંહ, આંખોં ઔર ત્વચા કી સમ્પર્ક સે બચાએં। 3. છિડકાવ કી ધામ કો હવા દ્વારા ઉડાને સે બચાએં। હવા કી દિશા મેં છિડકાવ કરેં। 4. છિડકાવ કે બાદ દૂષિત કપડોં ઔર શરીર કે અંગોં કો અચ્છી તરહ ધોએં। 5. છિડકાવ કે સમય ધૂમ્રપાન, ખાના, પીના ઔર કુછ ચબાના નહીં ચાહિए। 6. છિડકાવ કરતે યા મિલાતે સમય પૂર્ણ સુરક્ષાત્મક કપડે પહનેં।

કાર્મકર્સ ઔર ઉપયોગ કરનાર કે લિયે ચેતાવની: ફફૂંદીનાશક કે કામ કરતે સમય પૂર્ણ સુરક્ષાત્મક કપડે જૈસે પૂરી બાહુ કી કમીજ, લમ્બી પૈન્ટ, જૂતે, ચશ્મે, સુરક્ષિત, ટોપ, રસાયન રોધી દસ્તાને પહનને ચાહિए।

વિષ કે લક્ષણ: પસીના, સિરદર્દ, આલસ્ય, ખાંસી, છીંક, ખુજલી, મિતલી, ઉલ્ટી હો સકતી હૈ।

પ્રાથમિક ચિકિત્સા: 1) યદિ નિગલ ડાલે તો ગલે કે પીછે ગુદગુદી કરકે ઉલ્ટી કરાए। યહ ક્રિયા તબ તક દોહરાતે રહે જબ તક ઉલ્ટી દ્વારા નિકલા પદાર્થ સાફ ન હો જાए। યદિ મરીજ બેહોશ હો તો ઉલ્ટી ન કરાયેં। 2) યદિ કપડે ઔર ત્વચા દૂષિત હો જાए તો કપડે ઉતાર દેં। દૂષિત ત્વચા કો કાફી માત્રા મે સાબુ ઔર પાની સે ધોએં। 3) યદિ આંખેં દૂષિત હો જાए તો ઉનકો કાફી માત્રા મે સૈલાइન/સાફ પાની મે લગભગ 10–15 મિનટ તક ધોએં। 4) યદિ સાંસ દ્વારા અંદર ગયા હો તો રોગી કો શુદ્ધ હવા મે લે જાયે।

ફાઇટોટોક્સિસિટી: સુઝાવ કી માત્રા કે અનુસાર પ્રયોગ કરને પર યહ ફફૂંદનાશક પૌધવિષાક્ત નહીં હૈ।

ફિશ ટોક્સિક: ઝહરીલા ફ્રાયસ ઉત્પાદન મત્સ્યપાલન કરકર કે પેદા કરીશકતાહૈ ટાઈ ટો।

એન્ટીડોટ: કોઈ જાણ વિરોધ ઉંડ નહીં હૈ। લક્ષણ અનુસાર ઇલાજ કરો।

વપરાયેલ કન્ટેનર નો નિકાલ: 1. ખાલી કરવામાં આવેલ કન્ટેનર અને પ્રવાહી અને ધોવાણ ઝેરી રસાયણ ન ફેલાય તે રીતે નિકાલ કરવો જોઈએ. 2. ફરી વાપરી ન શકાય તે માટે કન્ટેનર ખાલી કરવા જોઈએ. 3. કન્ટેનરને ખુલ્લા વિસ્તારમાં અને પાણીના સ્રોતથી દૂર દફનાવવા જોઈએ.

સંગ્રહ માટે શરતો: 1. ફફૂંદનાશક ધરાવતા પેકેજ અલગ રૂમમાં અથવા ફફૂંદનાશક સંગ્રહ માટે વપરાતા રૂમ અથવા અલમારીમાં તાળા અને ચાવી સાથે રાખવા જોઈએ. 2. ફફૂંદનાશક સંગ્રહ માટે વપરાતા રૂમ અથવા વિસ્તાર સારી રીતે બાંધેલા, સૂકા, પ્રકાશયુક્ત હવાદાર તથા પર્યાપ્ત લંબાઈ-પહોળાઈ ધરાવતો હોવો જોઈએ, જેનાથી ફફૂંદનાશક પ્રદૂષિત ન થાય.

રાસાયણિક સંરચના:

કાર્બેન્ડાઝિમ ટેક્નિકલ (98% સ.ત. પર આધારિત)	12.25% ભાર/ભાર
મેન્કોઝેબ ટેક્નીકલ (85% સ.ત. પર આધારિત)	74.12% ભાર/ભાર
સોડિયમ સોલ્ટ–એલ્કિલ નેપ્થાઇલ સલ્ફોનેટ	2.00% ભાર/ભાર
કેઓલિન નિષ્ક્રિય પદાર્થ	9.63% ભાર/ભાર
કુલ:	**100.00% ભાર/ભાર**

ચેતવણી: 1. લેબલ અને લિફલેટમાં દર્શાવ્યા હોય તે સિવાયના પાકો અને લણણી પછી અને ઉપયોગનો છંટકાવ (ઉપયોગ) કરવો ન જોઈએ. 2. કાપણી પછીના ઉપયોગ (ઉપયોગ) કર્યા પછી ખાલી કન્ટેનરનો વિલ્હેવેટમાં સલામતીપૂર્વક નાશ કરવો. 4. પોલી હાઉસ અથવા સીમિત વિસ્તારો માટેની સૂચના અને માત્રા અંગેની જાણકારી માટે વિભાગ જોવો.

Gujarati

पिक्स्मा

कार्बेन्डाजिम 12% + मैन्कोजेब 63% डब्लूपी.
(अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

ਕਾਰਬੇਨਡਾਜਿਮ 12% + ਮੈਨਕੋਜੇਬ 63% ਡਬਲਯੂਪੀ. ਇਕ ਅੰਤਰਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ੀਯ ਫਫੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬੀਜੋਪਚਾਰ ਲਈ ਕਰਕੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਤਨਾ ਗਲਨ, ਕੋਲਰ ਰੋਟ ਅਤੇ ਜੜ ਗਲਨ, ਪਾਨ ਦੇ ਬਲਾਸਟ, ਆਲੂ ਦੇ ਅਗੇਤੀ ਅੰਗਮਾਰੀ, ਪਛੇਤੀ ਅੰਗਮਾਰੀ, ਕਾਲਾ ਕੋਢ, ਚਾਹ ਦੇ ਫਫੋਲਾ ਅੰਗਮਾਰੀ, ਭੂਰਾਪਨ ਅੰਗਮਾਰੀ, ਲਾਲ ਗਰੁਆ, ਸੂਖਾ ਰੋਗ, ਕਾਲੀ ਸਡਨ, ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਤੁਲਸੀਰਾ, ਪੂਰੀ ਫਫੂੰਦੀ, ਅੰਗਮਾਰੀ, ਆਮ ਦੇ ਪੂਰੀ ਫਫੂੰਦੀ, ਅੰਗਮਾਰੀ, ਮਿਰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾਬਾ, ਫਲ ਸਡਨ, ਪੂਰੀ ਫਫੂੰਦੀ, ਮਕਾਈ ਦੇ ਮ੃ਦੂਰੋਮਿਲ ਆਸਿਤਾ, ਪਤੀ ਦਾ ਅੰਗਮਾਰੀ, ਸੇਬ ਦੇ ਪਾਮਰੋਗ, ਪੂਰੀ ਫਫੂੰਦੀ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਤਨਾ ਗਲਨ, ਕੋਲਰ ਰੋਟ ਅਤੇ ਜੜ ਗਲਨ ਰੋਗਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇ ਲਿਏ ਕਿਆ ਜਾਤਾ ਹੈ।

ਸਾਵਧਾਨ: ਉਤਪਾਦ ਜਲਜੀਵ ਅਤੇ ਜਲੀਯ ਜੀਵੋਂ ਕੇ ਲਿਏ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕਾ ਉਪਯੋਗ ਮਤਸਯਪਾਲਨ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਕੀ ਅਨੁਮਤਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਪਯੋਗ:

ਫਸਲ	ਕੀਟ ਦਾ ਨਾਮ	ਪ੍ਰਤਿ ਹੇਕਟੇਯਰ ਮਾਤਰਾ ਸ.ਤ. (ਗ੍ਰਾਮ)	ਸੰਰਚਨਾ (ਗ੍ਰਾਮ)	ਪਾਣੀ ਕੀ ਮਾਤਰਾ (ਲੀਟਰ)	ਅਖਿਰੀ ਛਿਡਕਾਅ ਤਥਾ ਫਸਲ ਕਾਟਨੇ ਕੇ ਬੀਚ ਅਂਤਰਾਲ (ਦਿਨਾਂ ਮੇਂ)
ਸੇਬ	ਪਾਮ ਰੋਗ, ਧੂਸੀ ਫਫੂੰਦੀ	0.19%	0.25%	ਫਸਲ ਕੀ ਕੇਨਾਪੀ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਵਸਯਕ ਮਾਤਰਾ	20
ਮਿਰਚ	ਛਿਲਕਾ ਧੱਬਾ, ਫਲ ਵਿਗਲਨ ਰੋਗ, ਧੂਸੀ ਫਫੂੰਦੀ	563	750	500	3
ਕਪਾਸ	ਅਲਟਰਨੇਰਿਆ ਪੱਤੇ ਧੱਬਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇ ਆਰਮੀ ਬਲਾਇਟ ਆਸਿਤਾ	180+ 945	1500	500	71
ਅੰਗੂਰ	ਧੂਸੀਫਫੂੰਦ ਆਸਿਤਾ ਗ੍ਰੇ, ਧੂਸੀਫਫੂੰਦ ਆਸਿਤਾ, ਐਂਥਰੇਕਨੋਜ	0.11%	0.15%	ਪਕੀ ਕੇਨਾਪੀ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਵਸਯਕ ਮਾਤਰਾ	7
ਮੂੰਗਫਲੀ	ਪਤੇ ਧੱਬਾ, ਤਨਾ ਗਲਨ	375	500	500	72
ਮੂੰਗਫਲੀ	ਟਿਕਾ ਰੋਗ, ਕਾਲਰ ਰੋਟ	1.88	2.5	0	ਬੀਜੋਪਚਾਰ
ਮਕਾਈ	ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਧੱਬਾ	120+ 630	1000	500	37
ਮੈਂਡਾਰਿਨ	ਟਿਪ ਬਲਾਇਟ, ਸੂਟੀ ਮੋਲਡ, ਐਂਥਰੇਕਨੋਜ ਫਲ ਸੜਨ ਅਤੇ ਐਂਥਰੇਕਨੋਜ ਲੀਫ ਸਪਾਟ	0.23%	0.30%	500	30
ਆਮ	ਪੂਰੀਤਾ ਆਸਿਤਾ, ਐਂਥਰੇਕਨੋਜ	0.11%	0.15%	ਫਸਲ ਕੀ ਕੇਨਾਪੀ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਵਸਯਕ ਮਾਤਰਾ	7
ਧਾਨ	ਬਲਾਸਟਮਾਰੀ	563	750	750	57
ਆਲੂ	ਅਰਲੀ ਬਲਾਇਟ, ਲੇਟ ਬਲਾਇਟ	1312.5	1750	500	47
ਸੋਯਾਬੀਨ	ਅਲਟਰਨੇਰਿਆ ਪੱਤੇ ਧੱਬਾ, ਮਿਰੋਥੇਸਿਆਮ ਪੱਤੇ ਧੱਬਾ ਪੋਡ ਅਤੇ ਸਟੇਮ ਬਲਾਇਟ, ਐਂਥਰੇਕਨੋਜ	750+ 787.5	1250	500	31
ਚਾਹ	ਵਿਸਟਰ ਬਲਾਇਟ, ਗ੍ਰੇ ਬਲਾਇਟ, ਰੇਡ ਰਸਟ, ਡਾਇ ਬੈਕ, ਬਲੈਕ ਰੋਟ	937.5	1250	250– 500	7

ਵਰਤੋਂ ਕੀਤਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼: ਹਾਈ ਵਾਲਯੂਮ ਸ੍ਰੈਂਯਰ, ਅਰਥਾਤ ਨੈਪਸੈਕ ਸ੍ਰੈਂਯਰ ਦਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਛਿਡਕਾਅ ਕਰੋ।

ਛਿਡਕਾਅ ਕਿਸ ਸਮੇਂ: ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਲਛਣ ਦਿਖਣ ਤੇ ਇਸ ਫਫੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਛਿਡਕਾਅ ਕਰੋ। ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਛਿਡਕਾਅ ਕਰੋ। ਛਿਡਕਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਵੋ।

ਪ੍ਰਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: 1. ਖਾਣਾ ਤਯਾਰ ਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। 2. ਮੂੰਹ, ਅੱਖਾਂ ਔਰ ਚਮੜੀ ਕੇ ਸਾਥ ਸੰਪਰਕ ਕੇ ਬਚਾਏ। 3. ਸਪਰੇ ਕੀ ਧੰਧ ਕੋ ਹਵਾ ਦ੍ਵਾਰਾ ਉਡਾਨੇ ਸੇ ਬਚਾਏ। ਇਸ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੇਂ ਛਿਡਕਾਅ ਕਰੋ। 4. ਛਿਡਕਾਅ ਕੇ ਬਾਦ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਪੜੋਂ ਔਰ ਸਰੀਰ ਕੇ ਅੰਗੋਂ ਕੋ ਅਚਾਂਤ ਤਰਾਂ ਧੋਏ। 5. ਛਿਡਕਾਅ ਕੇ ਸਮੇਂ ਧੂਮਪਾਨ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਯਾ ਕੁਛ ਚਬਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿए। 6. ਛਿਡਕਾਅ ਔਰ ਮਿਲਾਤੇ ਸਮਯ ਪੂਰਨ ਸੁਰਕਸ਼ਾਤਮਕ ਕਪੜੇ ਪਹਨੇਂ।

ਕਾਰਮਕੋਂ ਔਰ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਓਂ ਕੇ ਲਿਏ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਫਫੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕ ਕੇ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਸਮਯ ਪੂਰਨ ਸੁਰਕਸ਼ਾਤਮਕ ਕਪੜੇ ਜੈਸੇ ਪੂਰੀ ਬਾਹੂ ਕੀ ਕਮੀਜ, ਲਮ੍ਬੀ ਪੈਂਟ, ਜੂਤੇ, ਚਸ਼ਮੇਂ, ਸੁਰਕਸ਼ਿਤ, ਟੋਪ, ਰਸਾਇਣ ਰੋਧੀਕੀ ਦਸ੍ਤਾਨੇ ਪਹਨਨੇ ਚਾਹਿए।

ਵਿਸ ਕੇ ਲਕਸ਼ਣ: ਪਸੀਨਾ, ਸਿਰਦਰਦ, ਆਲਸ, ਖਾਂਸੀ, ਛੀਂਕ, ਖੁਜਲੀ, ਮਿਤਲੀ, ਉਲਟੀ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ।

**ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਚਿਕਿਤਸਾ: