🟥 PANTONE 193 C 🟦 PANTONE 5473 C

⬜ ‘A’ watermark 10% of base colour

1 Kg - 358 x 115 mm - Sheet Form



TOLEDO® S **Tebuconazole 10% + Sulphur 65% WG (Systemic and Contact Fungicide)**

Chemical Composition: Tebuconazole a.i. 10.00% w/w, Sulphur a.i. 65.00% wlw, Potassium polycarboxylate 2.50% w/w, Phenolsulfonic acid phenol formaldehyde urea condensate, Na salt 5.00% w/w, Carboxy methyl cellulose 1.15% w/w, Sodium lignosulfonate 5.50% w/w, Polydimethyl siloxane 0.10% w/w, China clay Q.S.%, **Total : 100.000% w/w. Direction of Use:** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions:** 1. Keep away from foofstuffs empty foodstuff containers and animal food. 2. The user should use appropriate protective clothing like hat, long shirt, long pant and shoes. 3. Avoid contact with eyes and skin while handling the product. 4. Avoid inhalation. 5. Do not drink, eat or smoke during application. 6. Remove contaminated clothes and wash before re-use. 7. Do not re-use empty containers. 8. Wash thoroughly the contaminated clothes & parts of the body with soap and water after work. **Antidote:** No specific antidote. Treat symptomatically. **First Aid:** Please read enclosed leaflet before use. **Symptoms:** Headache, dizziness, weakness, nausea, sore throat, chest pain, lightheadedness, sneezing, coughing and may cause irritation of skin mucous membranes. **Recommendations:** Tebuconazole 10% + Sulphur 65% WG (water dispersible granule) is a effective fungicide with protective, creative and eradicative action. It controls powdery mildew of mango, fruit rot, powdery mildew of chilli and leaf spot, pod blight disease of soybean. **Warning:** 1) Not to be used on crops other than those mentioned on label and leaflets. 2) Not to be used for Post-Harvest Application. 3) Destroy the container after use as directed on leaflet. 4) Directions and dosage for poly houses and confined area -Refer the leaflet.

टोलेडो एस **टेबुकोनाजोल १०% + सल्फर ६५% डब्ल्यू. जी. (अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय फफूंदीनाशक)**

रासायनिक संरचना: टेबुकोनाजोल स.त. १०.००% भा/भा, सल्फर स.त. ६५.००% भा/भा, पोटेशियम पोलिकार्बोक्सिलेट २.५०% भा/भा, फेनालसल्फोनिक एसिड फेनाल फॉर्मलडीहाईड यूरिया कंडेनसेट एनए साल्ट ५.००% भा/ भा, कार्बोक्सी मिथाईल सेलुलोस १.१५% भा / भा, सोडियम लिग्नोसल्फोनेट ५.५०% भा / भा, पोलीडायमिथिलीन सिलोक्सेन ०.१०% भा/भा, चायना रेत पर्याप्त मात्रा %, **योग : १००.०००% भा/ भा। उपयोग के लिये निर्देश:** इस्तेमाल से पहले साथ में दिया हुआ पर्चा पढ़ लें। **प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ:** १. खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. इसका इस्तेमाल करने वाले कर्मचारी टोपी, लम्बी पैंट, शर्ट और जूते पहने। ३. प्रयोग करते समय त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचें। ४. इसको सुघें नहीं। ५. उपयोग के समय खान–पान और धुम्रपान मना है। ६. सम्पर्क में आये हुए कपड़ों को निकाल कर साबुन और पानी से धो लें। ७. खाली डिब्बे को दोबारा इस्तेमाल न करें। ८. उपयोग के काम के बाद हाथों और चर्म को साबुन और पानी से धो लें। **विषनाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षण के अनुसार डॉक्टरी उपचार करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** इस्तेमाल से पहले साथ में दिया हुआ पर्चा पढ़ लें। **लक्षण:** सिरदर्द, चक्कर आना, कमजोरी, मितली, गले में खराश, सीने में दर्द, छींकना और खांसना तथा त्वचा, श्लेष्मा झिल्ली में जलन पैदा कर सकते हैं। **उपयोग :** टेबुकोनाजोल १०% + सल्फर ६५% डब्ल्यू. जी. (पानी में घुलने वाले दानें) एक असरदार रोगरक्षक, रोगनिवारक एवं रोगनाशक फफूंदीनाशक है। यह आम का चूर्णी फफूंदी, मिर्च के फल सड़न, चूर्णी फफूंदी तथा सोयाबीन का पूर्ण धब्बा एवं फली के झुलसा को नियंत्रित करता है। **चेतावनी:** १) लेबल और सूचना पत्रक पर सूचित फसलों और कीटों के अलावा अन्य किसी के फसल या कीटों पर इस्तेमाल ना करें. २) फ़सल कटाई के बाद के कामों के लिए इस्तेमाल ना करें. ३) पत्रक पर दिए गए निर्देशों के अनुसार कंटेनर नष्ट करें. ४) पॉली हाउसेस और बंद इलाका और मात्रा के बारे में निर्देशों के लिए–पत्रक देखें.

ટોલેડો એસ **ટેબુકોનાઝોલ 10% + સલ્ફર 65% ડબલ્યુ. જી. (આંતરપ્રવાહી અને સ્પર્શીય ફૂગનાશક)**

રાસાયણિક સંયોજનઃ ટેબુકોનાઝોલ સ.ત. 10.00% ભાર/ભાર, સલ્ફર સ.ત. 65.00% ભાર/ભાર, પોટેશિયમ પોલીકાર્બોક્સિલેટ 2.50% ભાર/ભાર, ફેનોલસલ્ફોનિક એસિડ ફેનોલ ફોર્મલડિહાઇડ યુરિયા કન્ડેન્સેટ એન.એ. સોલ્ટ 5.00% ભાર/ભાર, કાર્બોક્સિ મિથાઇલ સેલ્યુલોઝ 1.15% ભાર/ભાર, સોડિયમ લિગ્નોસલ્ફોનેટ 5.50% ભાર/ભાર, પોલીડાયમિથાઇલ સિલોક્સેન 0.10% ભાર/ભાર, ચીનાઈ માટી પુરતી માત્રા %, **કુલઃ 100.000% ભાર/ભાર. ઉપયોગ માટેના નિર્દેશઃ** ઉપયોગ કરતાં પહેલાં આ સાથેના લિફ્લેટને કાળજીપૂર્વક વાંચો. **ઉપયોગકર્તાઓ માટે સાવચેતીઓઃ** 1. આ દવાને ખાણીપીણીની વસ્તુઓ, ખાણીપીણીની વસ્તુઓના ડબ્બાઓ તેમજ પશુ આહારથી દૂર રાખો. 2. આ દવાના ઉપયોગકર્તાએ છંટકાવ સમયે શરીર પર હેટ, લાંબો શર્ટ, લાંબો પેંટ અને બૂટ વગેરે યોગ્ય સુરક્ષાત્મક કપડાં પહેરવાં જોઈએ. 3. આ દવાને ચામડી અને આંખો સાથે સંપર્કથી બચાવો. 4. આ દવાને સૂંઘશો નહીં. 5. આ દવાના છંટકાવ સમયે કશું પણ ખાવાપીવાની, ધૂમ્રપાન કરવાની અને તમાકુ ચાવવાની મનાઈ છે. 6. આ દવાના સંપર્કમાં આવેલ કપડાંને કાઢીને સાબુ અને ખૂબ પાણીથી ધોઈ નાખો. 7. ખાલી ડબ્બાઓનો ફરી વાર ઉપયોગ ન કરો. 8. આ દવાના ઉપયોગ પછી ચામડી અને આંખોને સાબુ અને ખૂબ પાણીથી ધોઈ નાખો. **વિષનાશકઃ** કોઈ વિષનાશક જણાતું નથી. લક્ષણો મુજબ સારવાર કરો. **પ્રાથમિક સારવારઃ** ઉપયોગ કરતાં પહેલાં આ સાથેના લિફ્લેટને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ઝેરનાં લક્ષણોઃ માથામાં દુખાવો, ચક્કર આવવા, શરીરમાં નબળાઈ, ઉબકા, ગળમાં બરાશ, છાતીમાં દુખાવો, છીંક અને ઉધરસ આવવી, ચામડીમાં બળતરા, નાક વહેવું વગેરે. **ભલામણઃ** ટેબુકોનાઝોલ 10% + સલ્ફર 65% ડબલ્યુ જી (પાણીમાં ઓગળી જાય તેવા દાણા) એક અસરદાર રક્ષાત્મક, રોગનિવારક અને રોગનાશક ફૂગનાશક છે. તે કેરીનો ભૂકી છારો, મરચામાં ફળના સડાના રોગ, ભૂકી છારો, સોયાબીનમાં પાન ડાઘ, ફળી અંગમારીના રોગને કાબૂમાં લે છે. **સાવચેતીનું નિવેદનઃ** 1. લેબલ અને પત્રકો પર ઉલ્લેખિત સિવાયના પાક અને જંતુઓ પર ઉપયોગ નહીં કરો. 2. લણણી પશ્ચાત છંટકાવ માટે ઉપયોગ નહીં કરવો જોઈએ. 3. ઉપયોગ પછી ડબ્બા પત્રકમાં નિર્દેશ અનુસાર નાશ કરો, 4. પોલી હાઉસીસ અને બંધિયાર જગ્યા માટે નિર્દેશ અને માત્રા– પત્રક જુઓ.

ટોલેડો એસ | ಟೊಲೆಡೊ ಎಸ್

TOLEDO® S

Tebuconazole 10% + Sulphur 65% WG

टोलेडो एस

टेबुकोनाज़ोल १०% + सल्फर ६५% डब्ल्यू जी

FUNGICIDE
फफूंदीनाशक

Net Content 1kg
शुध्द मात्रा १ किग्रा

ALBAUGH®
your alternative

Read enclosed the leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े।
ઉપયોગ કરતા પહેલા જોડાયેલ પત્રિકા વાંચો.

Regn. No. : CIR-229996/2022-Tebuconazole + Sulphur (WG) (442)-641

रजि. नं.: सीआईआर–२२९९९६/२०२२–टेबुकोनाज़ोल + सल्फर (डब्ल्यू.जी.) (४४२)–६४१

Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187

उत्पादन लाइसेंस नं. / ઉ.લા.ન. : एमएल/जेडीपीपी/२०२२–२३/१८७

Manufactured & Marketed By: M/s Albaugh India Private Limited,
175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E),
Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.

निर्माता और विपणनकर्ता : मे. अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.), होंडा शोरुम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र – ४०००९८।

Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी : जी–१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया, सनवाड–फतेहनगर, तेहसिल–मावली, जीला–उदयपूर – ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address,Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Re-entry: 24 hours **पुनःप्रविष्टी :** २४ घंटे

® - Registered Trademark

Keep in cool, dry place away from heat and open flame
सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।
For Agricultural Use Only.
केवल कृषि उपयोग के लिये।
Imitation of label graphics is a punishable offence.

Keep out of the reach of children
बच्चों की पहुँच से दूर रखिए
खतरा
DANGER
ભય
બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

Batch No. :
बैच नं. :
બેચ નં.:
Mfg. Date :
उत्पादन तिथि :
ઉત્પાદન તારીખ:
Exp. Date :
समापन तिथि :
અવધી સમાપ્તિની તારીખ:
Maximum retail price
inclusive of all taxes
in Indian currency ₹:

अधिकतम खुदरा मूल्य
सभी करों सहित
भारतीय मुद्रा में ₹ :

વધુમાં વધુ રીટેલ કિમંત
કરવેરા સાથે
ભારતીય ચલણમાં ₹:

Unit sale price : ₹

Net Content : 1 kg **शुध्द मात्रा : १ किग्रा**

500 gm - 295 x 94 mm - Sheet Form



Net Content 500g
शुध्द मात्रा ५०० ग्रा.

Net Content : 500g **शुध्द मात्रा : ५००ग्रा**

250 gm - 245 x 74 mm - Sheet Form



Net Content 250g
शुध्द मात्रा २५० ग्रा.

Net Content : 250g **शुध्द मात्रा : २५०ग्रा.**

100 gm - 194 x 58 mm - Sheet Form



Net Content 100g
शुध्द मात्रा १०० ग्रा.

Net Content : 100g **शुध्द मात्रा : १००ग्रा.**

Shipper Label - 180 x 110 mm - CMYK



ટોલેડો એસ | ಟೊಲೆಡೊ ಎಸ್

TOLEDO® S

Tebuconazole 10% + Sulphur 65% WG

टोलेडो एस

टेबुकोनाज़ोल १०% + सल्फर ६५% डब्ल्यू जी

FUNGICIDE
फफूंदीनाशक

ALBAUGH®
your alternative

PACKING

THIS SIDE UP

Read enclosed the leaflet before use उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढें। ઉપયોગ થી પહેલાં સંલગ્ન પત્રિકા વાંચો.

Regn. No.: CIR-229996/2022-Tebuconazole + Sulphur (WG) (442)-641

रजि. नं.: सीआईआर–२२९९९६/२०२२–टेबुकोनाज़ोल + सल्फर (डब्ल्यू.जी.) (४४२)–६४१

Mfg. Lic. No.: ML/JDPP/2022-23/187

उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By :M/s Albaugh India Private Limited, 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.

निर्माता और विपणनकर्ता : मे. अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.), होंडा शोरुम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र – ४०००९८।

Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area,Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी : जी–१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया, सनवाड–फतेहनगर, तेहसिल–मावली, जीला–उदयपूर – ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaint contact Customer Care Executive at Registered office address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. / बैच नं. / બેચ નં.:
Mfg. Date / उत्पादन तिथि :
ઉત્પાદન તારીખઃ
Exp. Date / समापन तिथि :
અવધી સમાપ્તિની તારીખઃ
Maximum retail price ₹:
inclusive of all taxes
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
सभी करों सहित
વધુમાં વધુ રીટેલ કિમંત ₹:
કરવેરા સાથે
Unit sale price:₹

®-Registered Trademark

Re-entry: 24 hours **पुनःप्रविष्टी :** २४ घंटे

Keep in dry place away from open heat or open flame
सूखी और ठंडी जगह में आग से दूर रखें
For Agricultural Use Only. केवल कृषि उपयोग के लिये।
Imitation of label graphics is a punishable offence.

Keep out of the reach of children.
बच्चों की पहुँच से दूर रखिये।
खतरा
DANGER
ભય
બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

টলেডো এছ

টেবুক'নাজল 10% + ছালফাৰ 65% W.G.

(অন্তৰ্প্ৰৱাহী আৰু স্পৰ্শীয় ভেঁকুৰনাশক)

টেবুক'নাজল 10% + ছালফাৰ 65% WG (ৱাটাত ডিছপাৰ্ছিবল গ্ৰেনিউল) হৈছে সুৰক্ষাত্মক, সৃজনীশীল আৰু নিৰ্মূলকৰণ কাৰ্যৰ সৈতে এবিধ প্ৰভাৱশালী ভেঁকুৰনাশক। ই জলকীয়াৰ পাউডাৰী মিলডিউ, ফ্ৰুট ৰ'ট ৰোগ; ছয়াবিনৰ লীফ স্পট, প'ড ব্লাইট ৰোগ, আমৰ পাউডাৰী মিলডিউ ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে।

टोलेडो-एस

टेबुकोनाझोल 10% + सल्फर 65% डब्लू.जी.

(अंतर्प्रवाही आणि स्पर्शीय बुरशीनाशक)

टेबुकोनाझोल 10% + सल्फर 65% डब्लू.जी. (पाण्यात विरघळणारे दाणे) एक प्रभावी रोगसंरक्षक, रोगनिवारक आणि रोगनाशक बुरशीनाशक आहे. मिर्चीवरील पावडरी मिल्ड्यू, फळ कूज रोग, सोयाबीनवरील पानांवरील डाग, शेंगावरील करपा रोग, आंब्यावरील पावडरी मिल्ड्यू यांचे नियंत्रण करते.

वापराच्या पद्धतिः

पीक	रोगाचे सामान्य नाव	प्रति हेक्टर मात्रा		पाण्याचे प्रमाण (ली.)	अंतिम फवारणी आणि पीक कापण्याच्या काळात अंतर (दिवसात)
		स.तत्व (ग्रॅ./ हेक्टर)	संरचना (ग्रॅ./ हेक्टर)		
मिरची	पावडरी मिल्ड्यू आणि फ्रूट रॉट	937.50 (125 + 812.5)	1250	500	5
आंबा	पावडरी मिल्ड्यू	0.15+ 0.975	1.5	1000	97
सोयाबीन	लीफ स्पॉट आणि पॉड ब्लाईट	937.50 (125 + 812.5)	1250	500	26

वापरण्यासाठी निर्देशः उत्पादन आवश्यक प्रमाणात मोजून घ्या आणि थोड्या पाण्यात चांगले मिसळा. उर्वरित पाणी निर्देशानुसार मिसळा आणि सुयोग्य स्प्रेयरद्वारे संपूर्ण पिकाच्या आच्छादनासाठी ढवळत राहून मिसळा. वापरात येणारी उपकरणेः नेपसेक स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर, कम्प्रेशन नेपसेक स्प्रेयर, कम्प्रेशन नेपसेक बॅटरी स्प्रेयर, बॅटरीने चालणारे पॉवर स्प्रेयर आणि एएसपीइइ–एचटीपी पॉवर स्प्रेयर.

वापरण्याची वेळः रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यानंतर.

दक्षताः

1. खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थांचे रिकामे डबे आणि पशुखाद्यापासून लांब ठेवा.
2. वापरणाऱ्याने हेट, लांब बाह्यांचा शर्ट, लांब पेंट आणि बूट यासारखे योग्य संरक्षक कपडे घालावे.
3. उत्पादन हाताळताना डोळे आणि त्वचेशी संपर्क होऊ देऊ नका.
4. श्वासावाटे आत जाऊ देऊ नका.
5. फवारणी करताना खाऊपिऊ नका आणि धूम्रपान करू नका.
6. दूषित कपडे काढून टाका आणि पुन्हा वापरण्यापूर्वी ते धुवा.
7. रिकामे डबे पुन्हा वापरू नका.
8. काम झाल्यावर दूषित कपडे आणि शरीराचे दूषित भाग साबण आणि पाण्याने व्यवस्थित धुवा.

विषबाधेची लक्षणेः डोकेदुखी, गरगरणे, थकवा, मळमळ, घसा खवखवणे, छातीत दुखणे, शिंका, खोकला आणि स्किन म्युकस मेम्ब्रेन मध्ये जळजळ अशी लक्षणे दिसू शकतात.

प्रथमोपचारः डोळ्यात गेले असल्यास भरपूर पाण्याने धुवा. दूषित कपडे काढून टाका आणि शरीराचे दूषित भाग भरपूर पाणी आणि साबणाने धुवा. रसायन श्वासावाटे आत गेले असल्यास रुग्णाला मोकळ्या हवेत न्या. श्वास घ्यायला त्रास होत असल्यास कृत्रिम श्वासोच्छ्वास द्या. बेशुद्ध असलेल्या रुग्णास तोंडावाटे काहीच देऊ नका. रुग्ण शुद्धीत असल्यास चूळ भरायला सांगा. उल्टी करवू नका. 1–2 ग्लास पाणी प्यायला द्या. त्वरित डॉक्टरांना बोलवा.

झाडांना विषबाधाः निर्धारित प्रमाणात प्रयोग केलात तर झाडाला विषबाधा होत नाही.

विषनाशकः कोणतेही विष प्रतिरोधक नाही. लक्षणानुसार उपचार करावा.

डबे खोक्यांची विल्हेवाटः

1. पॅकेजिस किंवा जादा उरलेले द्रावण तसेच साधनसाहित्य आणि डबे यांची विल्हेवाट सुरक्षित प्रकारे आणि पर्यावरण किंबा पाणी प्रदूषित होणार नाही याची काळजी घेऊन करावी.
2. रिकामी पॅकेजिस फाडून–तोडून, वस्तीपासून दूर जागी पुरून टाकावीत.
3. वापरून रिकामी झालेली पॅकेजिस पुनः वापली जाऊ नयेत म्हूणून उघड्यावर ठेवू नयेत.

सांठवणः

1. बुरशीनाशक असणारी पॅकेजिस, इतर माल विशेषतः खाद्यपदार्थ साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या, जागा यापासून दूरच्या खोल्यात, जागेत साठवण करून ठेवावीत. किंवा तीं त्यांचे प्रमाण आणि स्वरूप लक्षात घेऊन वेगळ्या कपाटातही कडीकुलपात ठेवावीत.
2. बुरशीनाशकच्या साठवणीकरता असलेल्या खोल्या, जागा चांगल्या उजेडाच्या, चांगल्या बांधलेल्या, कोरड्या, थंड, हवा खेळती राहाणाऱ्या आणि पुरेशा क्षेत्रफळाच्या असाव्यात.

रासायनिक रचनाः

पॉलिडीमिथाईल सिलोक्सेन	0.10% भार / भार
टेबुकोनाझोल स.त.	10.00% भार / भार
सल्फर स.त.	65.00% भार / भार
पोटेशियम पॉलिकार्बोक्सीलेट	2.50% भार / भार
फेनोसल्फोनिक एसिड फेनोल फॉर्मल्डीहाइड युरिया कंडेन्सेट एन ए सॉल्ट	5.00% भार / भार
कार्बोक्सी मिथाईल सेल्युलोज	1.15% भार / भार
सोडियम लिग्नोसल्फोनेट	5.50% भार / भार
चायना क्ले	पुरेसे प्रमाण %
एकूणः	**100.00% भार / भार**

इशाराः 1. लेबल आणि निर्देश पत्रिकेत उल्लेख असलेल्या कीटक आणि पिकांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कीटक आणि पिकासाठी याचा वापर करू नये. 2. कापणी नंतर वापरू नये. 3. वापरल्यानंतर रिकामे डबे निर्देश पत्रिकेत सांगितल्याप्रमाणे नष्ट करावे. 4. पॉलि हाउसेस आणि निर्धारित क्षेत्रासाठी निर्देश आणि प्रमाण–निर्देश पत्रिका बघा.

ટોલેડો–એસ

ટેબુકોનાઝોલ 10% + સલ્ફર 65% ડબલ્યુ.જી.

(આંતરપ્રવાહી અને સ્પર્શીય ફૂગનાશક)

ટેબુકોનાઝોલ 10% + સલ્ફર 65% ડબલ્યુ જી (પાણીમાં ઓગળી જાય તેવા દાણા) એક અસરદાર રક્ષાત્મક, રોગનિવારક અને રોગનાશક ફૂગનાશક છે. તે મરચાંના પાકમાં પાવડરી મિલ્ડ્યુ અને ફ્રૂટ રોટ; સોયાબીનના પાકમાં થતા લીફ સ્પોટ અને પોડ બ્લાઈટ તેમજ કેરીના પાકમાં થતા પાવડરી મિલ્ડ્યુના રોગો પર અંકુશ રાખે છે.

ਟੋਲੇਡੋ–ਐਸ

ਟੇਬੁਕੋਨਾਜ਼ੋਲ 10% + ਸਲਫਰ 65% ਡਬਲਿਯੂ.ਜੀ.

(ਅੰਤਰਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ)

ਟੇਬੁਕੋਨਾਜ਼ੋਲ 10% + ਸਲਫਰ 65% ਡਬਲਿਯੂ.ਜੀ. (ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਰਸਿਬਲ ਗ੍ਰੈਨਯੂਲ) ਬਚਾਅਕਾਰੀ, ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸਰਦਾਰ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਰਚ ਵਿੱਚ ਧੂੜੇਹਾਰ ਉੱਲੀ, ਫਲ ਸੜਨ; ਸੋਇਆਬੀਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤੀ ਦਾਗ, ਪੌਡ ਬਲਾਇਟ ਬੀਮਾਰੀ; ਅੰਬ ਵਿੱਚ ਧੂੜੇਹਾਰ ਉੱਲੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

टोलेडो–एस

टेबुकोनाजोल 10% + सल्फर 65% डब्ल्यू.जी.

(अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

टेबुकोनाजोल 10% + सल्फर 65% डब्ल्यू.जी. (पानी में घुलने वाले दाने) एक असरदार रोगरक्षक, रोगनिवारक एवं रोगनाशक फफूंदीनाशक है, यह मिर्च के चूर्णी फफूंदी, फल सड़न, सोयाबीन का पूर्ण धब्बा एवं फली के झुलसा, आम का चुर्णी फफूंदी को नियंत्रित करता है।

उपयोगः

फसल	रोग के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लीटर)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिन)
		स. तत्व (ग्राम/ हेक्टे.)	संरचना (ग्राम/ हेक्टे.)		
मिर्च	चूर्णी फफूंदी और फल सड़न	937.50 (125 + 812.5)	1250	500	5
आम	चुर्णी फफूंदी	0.15+ 0.975	1.5	1000	97
सोयाबीन	पूर्ण धब्बा एवं झुलसा	937.50 (125 + 812.5)	1250	500	26

उपयोग के लिये दिशा–निर्देशः उत्पाद का लिखित मात्रा लीजिए, उसे थोड़े पानी के साथ अच्छी तरह मिलाइए तथा किसी भी योग्य स्प्रेयर से पूरी फसल में कीजिए। निर्दिष्ट मात्रा का बाकी पानी भी अच्छी तरह से हिलाकर मिला लीजिए। पौध सुरक्षा उपकरणः नैपसैक स्प्रेयर, बैटरी–चालित स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर, कम्प्रेशन नैपसैक स्प्रेयर और एएसपीईई–एचटीपी पॉवर स्प्रेयर आदि।

अनुप्रयोग का समयः रोग दिखने के समय।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँः

1. खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें।
2. इसका इस्तेमाल करने वाले कर्मचारी टोपी, लम्बी पैंट, शर्ट और जूते पहनें।
3. प्रयोग करते समय त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचें।
4. इसको सुघें नहीं।
5. उपयोग के समय खान–पान और धुम्रपान मना है।
6. सम्पर्क में आये हुए कपड़ों को निकाल कर साबुन और पानी से धो लें।
7. खाली डिब्बे दोबारा इस्तेमाल न करें।
8. उपयोग के काम के बाद हाथों और चर्म को साबुन और पानी से धो लें।

विष के लक्षणः सिरदर्द, चक्कर आना, कमजोरी, मितली, गले में खराश, सीने में दर्द, छींकना और खांसना तथा त्वचा, श्लेष्मा झिल्ली में जलन पैदा कर सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्साः आँखों में जाने पर खूब सारे पानी से धो लें। दूषित कपड़ों को निकाल दें और शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबुन और पानी से धो लें। यदि फफूंदीनाशक श्वास द्वारा अंदर गया हो तो तुरंत शुद्ध हवा में ले जायें। यदि श्वास अवरोध हो तो कृत्रिम स्वासोंपचार करें। बेहोश व्यक्ति को मुँह से कुछ भी खिलाने–पिलाने की कोशिश न करें। यदि व्यक्ति बेहोशी की हालत में न हो तो चेहरे को पानी से धो लें। उल्टी कराने की कोशिश न करें। 1–2 गिलास पानी पिलायें, तुरंत डॉक्टर को बुलाइए।

पौधविशाक्तताः सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह फफूंदीनाशक पौधविशाक्त नहीं है।

विषनाशकः कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है, लक्षण के अनुसार डॉक्टरी उपचार करें।

खाली डिब्बों का निपटाराः

1. डिब्बे या बची हुई फफूंदनाशक तथा धोवन का निपटारा इस प्रकार करें कि जिससे पीने का पानी तथा पर्यावरण दूषित न हो।
2. उपयोग किए गये डिब्बों को दोबारा उपयोग के लिए बाहर न छोड़ें।
3. खाली डिब्बों या पात्रों को तोड़कर आबादी से दूर जमीन में दबा देना चाहिये।

संग्रहण की शर्तेंः

1. फफूंदीनाशक डिब्बों का संग्रहण अलग कमरे या स्थान पर अन्य वस्तुओं विशेषकर खाद्य पदार्थों के संग्रहण कक्ष या स्थान से दूर किया जाना चाहिये तथा फफूंदीनाशक की मात्रा और स्वभाव पर निर्भर करते हुए इसका संग्रहण अलग अलमारी में ताला चाबी लगाकर रखें।
2. फफूंदीनाशक डिब्बों का संग्रहण कक्ष रोशनीदार, मजबूत, सूखा, ठंडा, हवादार तथा पर्याप्त लम्बाई चौड़ाई का होना चाहिये।

रासायनिक संरचनाः

पोलीडायमिथिलीन सिलोक्सेन	0.10% भार / भार
टेबुकोनाजोल स.त.	10.00% भार / भार
सल्फर स.त.	65.00% भार / भार
पोटेशियम पोलिकर्बोक्सिलेट	2.50% भार / भार
फेनालस्लफोनिक एसिड फेनाल फॉर्मलडीहाईड यूरिया कंडेनसेट एनए साल्ट	5.00% भार / भार
कार्बोक्सी मिथाईल सेलुलोस	1.15% भार / भार
सोडियम लिग्नो सल्फोनेट	5.50% भार / भार
चायना रेत	पर्याप्त मात्रा %
योगः	**100.00% भार / भार**

सावधानियां कथनः 1. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। 2. फसल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें। 3. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बे) को नष्ट कर दें। 4. पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक–पर्ची देखें।

TOLEDO®-S

Tebuconazole 10% + Sulphur 65% WG (Systemic and Contact Fungicide)

Tebuconazole 10% + Sulphur 65% WG (water dispersible granule) is a effective fungicide with protective, creative and eradicative action. It controls powdery mildew, fruit rot diseases of Chilli; leaf spot, pod blight disease of Soybean; powdery mildew of mango.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Disease	Dosage/HA		Dilution in Water (Liter)	Waiting Period between last spray to harvest (days)
		AI (gm/ Ha)	Formu-lation (gm/Ha)		
Chilli	Powdery mildew and fruit rot	937.50 (125+ 812.5)	1250	500	5
Mango	Powdery mildew	0.15 + 0.975	1.5	1000	97
Soybean	Leaf spot and pod blight	937.50 (125 + 812.5)	1250	500	26

Direction of Use: Measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crop with suitable sprayer. P.P. Equipment:- Knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack sprayer, Compression knapsack battery sprayer, Battery operated power sprayer and ASPEE-HTP power sprayer.

Time of application: At early appearance of disease.

Precautions:

1. Keep away from foodstuffs empty foodstuff containers and animal food.
2. The user should use appropriate protective clothing like hat, long shirt, long pant and shoes.
3. Avoid contact with eyes and skin while handling the product.
4. Avoid inhalation.
5. Do not drink, eat or smoke during application.
6. Remove contaminated clothes and wash before re-use.
7. Do not re-use empty containers.
8. Wash thoroughly the contaminated clothes & parts of the body with soap and water after work.

Symptoms of Poisoning: Headache, dizziness, weakness, nausea, sore throat, chest pain, lightheadedness, sneezing, coughing and may cause irritation of skin mucous membranes.

First Aid: If splashed into eyes, wash with plenty of water. Remove contaminated clothing and wash affected parts with soap and water. If the chemical is inhaled, get the victim into fresh air. Apply artificial respiration in case of difficult to breathing. Do not give anything by mouth to unconscious persons. If person is conscious rinse the face with water. Do not induce vomiting. Allow the patient to consume 1-2 glass of water. Call the physician immediately.

Phytotoxicity: The products are not phytotoxic when used as per recommendations.

Antidote: No specific antidote. Treat symptomatically.

Disposal of Used Container:

1. Packages or surplus material and washings of fungicide and containers shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3. Package shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions:

1. The packages containing the fungicide shall be stored in separate room or premises away from the room or premises used for storing other articles particularly food articles or shall be kept in separate almirah under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicide.
2. The store room should be well lit, well built, ventilated and off sufficient dimensions. The condition of the store should be dry & cool.

Chemical Composition:

Polydimethyl siloxane	0.10% w/w
Tebuconazole a.i.	10.00% w/w
Sulphur a.i.	65.00% w/w
Potassium polycarboxylate	2.50% w/w
Phenolsulfonic acid phenol formaldehyde urea condensate, Na salt	5.00% w/w
Carboxy methyl cellulose	1.15% w/w
Sodium lignosulfonate	5.50% w/w
China clay	Q.S. %
Total:	**100.00% w/w**

Cautionary Statement: 1. Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet. 2. Not to be Used for Post-harvest Application. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area-refer to the leaflet.

READ ENTIRE LEAFLET BEFORE USE.

प्रयोग से पहले पूरी पत्रिका ध्यानपूर्वक पढ़े।

TOLEDO®-S

Tebuconazole 10% + Sulphur 65% WG
(Systemic and Contact Fungicide)

टोलेडो®–एस

टेबुकोनाजोल 10% + सल्फर 65% डब्ल्यू.जी.
(अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

Manufactured & Marketed by:
M/s Albaugh India Private Limited,
175, Kagalwala House, 2nd Floor,
Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E),
Behind Honda Showroom,
Mumbai-400098, Maharashtra, India.
निर्माता एवं विपणनकर्ता:
मैसर्स अलबाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
१७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल,
विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.),
होंडा शोरुम के पीछे,
मुंबई-४०००९८, महाराष्ट्र, भारत।
Factory:
G-155, RIICO Industrial Area,
Sanwad-Fatehnagar, Tal.-Mavli,
Dist.-Udaipur-313205, Rajasthan, India.
फैक्टरी:
जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया,
सनवाड़-फतेहनगर, तेहसिल-मावली,
जिला-उदयपूर-३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaint contact Customer Care Executive at Registered office address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

For Agricultural Use

कृषि उपयोग के लिए

ALBAUGH®

your alternative

ടോളിഡോ എസ്

ടെബുകൊനാസോൾ 10% + സൾഫർ 65% ഡബ്ല്യുജി

(അന്തർവ്യാപനസമ്പർക്ക കുമിൾനാശിനി)

ടെബുകൊനാസോൾ 10% + സൾഫർ 65% ഡബ്ല്യുജി (വെള്ളത്തിൽ ചിതറുന്ന തരി) സംരക്ഷണം നൽകുന്നതും ദേദപ്പെടുത്തുന്നതും നിർമ്മാർജനം ചെയ്യുന്നതുമായ പ്രവർത്തനമുള്ള കാര്യക്ഷമമായ ഒരു കുമിൾനാശിനിയാണ്. ഇത് മുളകിലെ പൊടിരൂപത്തിലുള്ള പൂപ്പൽ, കായ ചീയൽ രോഗങ്ങൾ, സോയബീനിലെ ഇലപ്പുള്ളി, തൊണ്ടു വാട്ട രോഗങ്ങൾ, മാവിലെ പൊടിരൂപത്തിലുള്ള പൂപ്പൽ ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

టొలెడో-ఎస్

టెబుకొనజోల్ 10 శాతం + సల్ఫర్ 65 శాతం డబ్ల్యూ.జీ.

(అంతర్వాహ మరియు స్పర్శనీయ శిలీంధ్రనాశిని)

டோலேடோ-எஸ்

டெபுகோனஸோல் 10% + சல்பர் 65% WG

(உள்பரவிக் கொல்லும் மற்றும் தொடு நஞ்சு பூஞ்சாளக் கொல்லி)

டெபுகோனஸோல் 10% + சல்பர் 65% WG (தண்ணீரில் கரையும் துகள்கள்) பாதுகாப்பாகவும், உருவாக்கும் முறையிலும், அழிப்பதாகவும் செயல்படக்கூடிய பயனுள்ள பூஞ்சாளக் கொல்லி மருந்தாகும். இது மிளகாயில் மாவு மில்டியூ, பழ அழுகல் நோய்களையும்; சோயா மொச்சையில் இலைப்புள்ளி, நெற்று பிளைட் நோய்களையும்; மாமரத்தில் மாவு மில்டியூ நோயையும் கட்டுப்படுத்துகிறது.

ಟೊಲೆಡೊ-ಎಸ್

ಟೆಬ್ಯುಕೋನಾಜೋಲ್ 10% + ಸಲ್ಫರ್ 65% WG

(ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

ଟୋଲେଡୋ-ଏସ୍

ଟେବୁକୋନାଜୋଲ 10% + ସଲଫର 65% ଡବ୍ଲୁ.ଜି.

(ଅନ୍ତପ୍ରବାହୀ ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶୀୟ ଫଙ୍ଗନାଶକ)

টোলেডো-এস

টেবুকোনাজল 10% + সালফার 65% দবলু.জি

(অন্তর্প্রবাহী ও স্পর্শীয় ছত্রাকনাশক)

ٹولیڈو - ایس

ٹیبوکونازول 10% + سلفر 65% ڈبلوجی

(اندرسرایت کرکےاور لگنےپر اثرکرنےوالا پھپھوند کش)