

Label 1Ltr (Size: 282mm x 140mm)

282mm

12mm

12mm

V-MYCIN™

Validamycin 3% L
(Systemic Antibiotic)

Chemical Composition: Validamycin AL.: 3.000% w/w, Polyoxy ethylene nonyl phenyl ether (NP-85): 2.000% w/w, Silicone-KM-72: 0.010% w/w, Potassium Sorbate: 0.050% w/w, Acid green dye : 0.010% w/w, Water : QS to make 100, **Total: 100.000% w/w.** **Direction of Use:** P.P. Equipment : Knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack sprayer, compression knapsack battery and ASPEE-HTP power sprayer etc. Validamycin is compatible with most common insecticides. **Precautions:** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote:** No specific antidote is known. Treat Symptomatically. **First Aid:** 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. **Symptoms:** Headache, giddiness, nausea, vomiting and anxiety may occur. **Recommendations:** It is an antibiotic for the control of rice sheath blight only. **Warning:** 1) Not to be used on crops other than those mentioned on label and leaflets. 2) Not to be used for Post-Harvest Application. 3) Destroy the container after use as directed on leaflet. 4) Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

वि-माइसिन

रासायनिक संघटन: वालीडामाईसिन सक्रिय तत्व : ३.०००% भा/भा, पोलिऑक्सी ईथरनोनिल फेनिल ईथर (एच.पी.-८५) : २.०००% भा/भा, सिलिकोन के. एस-७२: ०.०१०% भा/भा, पोट्रियम सोरबेट : ०.०५०% भा/ भा, एस्डि हरी डाई: ०.०१०% भा / भा, पानी : पर्याप्त मात्रा, बाँध : १००.०००% भा/भा। **उपयोग के लिये निर्देश:** पीप सुखा वन : पीप पर तार कर छिड़काव करने वाला वन पर से चलने वाला छिड़काव वन, पीप पर तार कर वन से चलने वाला छिड़काव वन ए. एस. पी. ई. ई-एच.टी.पी. शक्ति चालित छिड़काव वन आदि। संयोजन - अधिकतर सामान्य प्रयोग में आने वाले कीटनाशक के साथ मिला कर प्रयोग किया जा सकता है। **प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ:** १. खाद्यमाग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुँह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचावें। ३. छिड़काव की वायु को साँस द्वारा अन्दर जाने से बचावें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूधित कराई और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धुपान, खाना, पीना और कुछ चराना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कराई रहें। **विषनाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे मुलुट्टी करके उल्टी कराये यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकल पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराये। २. यदि कराई और त्वचा दूधित हो जाए तो दूधित कराई उतार दें और त्वचा काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आँखें दूधित हो जायें तो उनको काफी मात्रा में क्लोरान/साफ पानी से लगायें १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि साँस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। **लक्षण:** सिरदर्द, चक्कर आना, भिन्नता, उल्टी, पकटाहट हो सकते हैं। **उपयोग:** केवल धान पर अच्छर अंगमारी रोग के निर्वहण के लिये प्रभावकारी प्रतिबैक्टीक है। **चेतावनी:** १) लेबल और सुचना पत्रक पर सूचित फसलों और कीटों के अलावा अन्य किसी के फसल या कीटों पर इस्तेमाल ना करें. २) फसल कटाई के बाद के कामों के लिए इस्तेमाल ना करें. ३) पत्रक पर दिए गए निर्देशों के अनुसार कटेल नेट करें. ४) पॉली हाउस और बंद इलाका और मात्रा के बारे में निर्देशों के लिए - पत्रक देखें.

वालीडामाईसिन ३% एल
(अंतःप्रवाही प्रतिबैक्टीक)

वि-माइसिन

रासायनिक संयोजन: वालीडामाईसिन सक्रिय तत्व: 3.000% भार/भार, पोलिओक्सी ईथाईलीन नोनिल किनार्थ एथर (ओ.पी.-85): 2.000% भार/भार, सिलिकोन डे.ओ.एम.-72: 0.010% भार/भार, पोट्रियम सोरबेट: 0.050% भार/भार, एसिड ग्रीन डाई: 0.010% भार/भार, पाणी: परती मात्रा, **कुल: 100.000% भार/भार.** **उपयोग मोटेला निर्देश:** छोट सुखा उपकरण: नेपेसि स्प्रयर, बूट स्प्रयर, कोमोशन नेपेसि स्प्रयर, कोमोशन नेपेसि स्प्रयर और अन्य-नेपेसि पीपर स्प्रयर. वैलिडामाईसिनले उपयोग सामान्य रीते पधरायामां आयतों मोठामाग्री संजुनाशकाली साथी मिलावली करी शकय छे. **वापनार माटे सावधानी:** 1. जाध पहाई, जाध सामग्रीला पासी वासलो अने पशुआला सावधी दूर राबो. 2. मुज, त्वचा अने आंख ला संपर्कही नसावो. 3. छंटावला खास मां जवाही नसावो. 4. छंटावला पा पछी दूधित कडा अने चामडीले छोई नावो. 5. छांटाव वानते, जावा पीपानु, तंवाडु-नीडी सीगरेट पीपानु नंध करो. 6. वापरनारे संपूर्णपछे सुरक्षात्मक कपास पहरेवा जोओओ. हवाली दिशा मां छंटाव करो. **विषनाशक:** ओई विषनाशक ज्वालु नथी. लसोला मुजून सायारव करो. **प्राथमिक सायारव:** 1. जो ग्री जवावा तो गगला पाखल भागमां गलासिया करीले उल्टी करो. उल्टी द्वारा साह ना थाय त्यां सुधी तेले पुनरावर्तन करो. जो दही नोबान हवा तो उल्टी न करावो. दोस्टनी मट्ट लो. 2. जो कपास अने चामडी दूधित होय तो कपास दूर करो अने दूधित त्वराने साबुन अने पाणीही धुवो. 3. जो आंखो दूधित थाय छे, तो लगभग 10 बी 15 मिनिट माटे स्पृच्छ पाणीही पुखण क्लश करो. 4. जो खास लेयामां आवे, तो दहीले ताजु हवामां रावो. **जेरना लसोला:** माथामां दुवावो, सडर आयवा, उलाड, उल्टी अने गलाहट वगेरे धई शडे छे. **उपयोग:** मात्रा डांगरना पाडमां शीथ पलाटनीला रोगमां अंडुरा करे अमरकलर अँटीग्रायोडि के. **सावधानीनु निर्देशन:** 1. लेबल अने पत्रको पर छेपित सितायना पाड अने शतुको पर उपयोग नई करो. 2. लाटाली पक्षात छंटाव माटे उपयोग नई करवो जोओओ. 3. उपयोग पछी डकन पत्रकमां निर्देश अनुसार नाश करो. 4. पोली हाउसीस अने नदियार जग्गा माटे निर्देश अने मात्रा- पत्रक बुको.

Keep in cool, dry place away from heat and open flame

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

वि-माइसिन

వి - మైసిన్

V-MYCIN™

Validamycin 3% L

वि-माइसिन

वालीडामाईसिन ३% तरल



FUNGICIDE

फफूंदीनाशक

Net Content 1 Ltr.
शुद्ध मात्रा १ ली.



Regn. No. : CIR-229487/2022-Validamycin (L) (442)-613
पंजी. नं. / रजि.नं.: सीआयआर-२२९४८७/२०२२-वालीडामाईसिन (एल) (४४२)-६१३
Mfg. Lic No. : ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं. / 6.ता.नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By : M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd.,
175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E),
behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.

निर्माता एवं विपणनकर्ता : मे. रोटम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्लेट लिमिटेड, १७५, कामलवाला हाऊस,
दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांतक्रुज (पू.), बिहाइंड होंडा शोरूम, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८.

Factory : G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad-Fatehnagar, Tal.- Mavli,
Dist.-Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली,
जीला-उदयपूर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत.

Batch No. / बैच नं. / બેચ નં.:

Mfg. Date / उत्पादन तिथि :
ઉત્પાદન તારીખ:

Exp. Date / समापन तिथि :

अवधि समाप्तिनी तारीख:

Maximum retail price ₹:

inclusive of all taxes

अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :

सभी करों सहित

वधुमां वधु शीटल डिमंत र:

કચ્છેશ સાથે

Unit Sale price per ml

Net Content : 1 Ltr.

शुद्ध मात्रा : १ ली.

For any Complaint contact Customer Care Executive at Registered office
address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

SHAKE WELL BEFORE USE

TM - Trademark

Read enclosed leaflet before use.

Re-entry:

उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।

24 hours

ઉપયોગ થી પહેલાં સંલગ્ન પત્રિકા વાંચો.

For agriculture use only. કૃષિ ઉપયોગ के लिए।

QR Code
18 x 18 mm



PANTONE 5473 C

PANTONE 110 C

