

PRETIL

FUNGICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

MECCANISMO D'AZIONE FRAC: 9

PRETIL - Registrazione Ministero della Salute n. 18163 del 14/11/2022

Composizione

Pyrimethanil puro g 37,74 (=400
g/l) Coformulanti q.b. ag 100

INDICAZIONI DI PERICOLO: H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208 Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il contenuto / recipiente in accordo alla normativa vigente.

ALBAUGH TKI d.o.o.

Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Slovenia - Tel.: +386 2 60 90 211 — www.albaugh.eu

Informazioni Tecniche: 800 986 776

Informazioni di emergenza CARECHEM (24h): +44 (0) 1235 239 670 (chiamate gestite in lingua italiana)

Stabilimenti di Produzione:

Industrias Afrasa, S.A., Calle Ciudad de Sevilla 53, Polígono Industrial Fuente del Jarro, 46988 Paterna, Valencia, Spagna

Albaugh TKI d.o.o. - Grajski Trg 21, SI-2327 - Rače, Slovenia

BAC d.o.o. - Grajski Trg 21, SI-2327 - Rače, Slovenia

Laboratorios Sirga S.A. - Polígono Industrial del Mediterráneo, Calle de Jaime I, nº 7 46560 Masalfasar (Valencia), Spain

Distribuito da:

Jebagro GmbH - Hanseatic Trade Center - Kehrrieder 11- 20457 Hamburg (Germania) - Tel +49 (0) 40 / 30 14 12

Agrimix S.r.l. - Via Campobello, 1 - 00071 Pomezia (Roma) - Tel. +39 06.529.62.21

Taglia: 60-100-150-250-500 ml; 1-5-10-20 l

Partita n. vedi corpo della confezione



prodotto. Per le attività su pomacee/drupacee rispettare un tempo di rientro di 3 giorni dall'applicazione del prodotto.

INFORMAZIONI MEDICHE - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE GENERALI

PRETIL è un fungicida contenente pyrimethanil. Il pyrimethanil è un Anilino pirimidina (AP), appartenente al gruppo 9 del FRAC (Fungicide Resistant Action Committee). I fungicidi AP sono altamente attivi contro una vasta gamma di funghi. La modalità di azione include l'inibizione della biosintesi della metionina e la secrezione di enzimi idrolitici. Grazie a questo particolare meccanismo d'azione PRETIL risulta attivo anche verso ceppi fungini scarsamente sensibili ad altri antibotritici. Il prodotto ha un'attività protettiva, translaminare e sistemica contro muffa grigia (*Botrytis cinerea*) su vite, fragola, pomodoro, melanzana, peperone e lattuga; contro ticchiolatura (*Venturia* spp.) su pomacee; contro monilia (*Monilia* spp.) su drupacee; contro botrite (*Botrytis* spp.) e sclerotinia (*Sclerotium* spp.) su cipolla.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Applicare con irrorazioni fogliari assicurando una completa copertura della vegetazione. Le applicazioni devono essere effettuate durante il periodo favorevole allo sviluppo della malattia secondo le modalità e le tempistiche sotto indicate.

VITE DA TAVOLA E DA VINO: contro muffa grigia (*Botrytis cinerea*) applicare alla dose di 2,5 l/ha distribuiti con 500-1000 l di acqua per ha, effettuando 1 applicazione all'anno a fine fioritura, pre-chiusura grappolo, invaiatura 21 giorni prima della raccolta (intervallo pre-raccolta)

POMACEE (melo, pero): contro ticchiolatura (*Venturia* spp.) applicare alla dose di 1,5 l/ha distribuiti con 400-1000 l di acqua per ha, effettuando 3 applicazioni l'anno, distanziate di 7 giorni, a partire da dopo la fioritura

DRUPACEE (pesco e nettarino, albicocco): contro monilia (*Monilia* spp.) applicare alla dose di 2,0 l/ha distribuiti con 400-1000 l di acqua per ha, effettuando 1 applicazione l'anno durante la maturazione del frutto.

Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

Per la vendemmia manuale e altre attività su vite rispettare un tempo di rientro di 3 giorni dall'applicazione del

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di:

10 metri di fascia vegetata per applicazioni precoci su vite.

10 metri oppure 5 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 50% nel caso di applicazioni tardive su vite;

10 metri di fascia vegetata su fragola e per applicazioni singole su pomodoro, melanzana e peperone in serra;

10 metri di fascia vegetata per applicazioni tardive multiple su pomacee.

20 metri o 5 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 90% per applicazioni singole precoci su pomacee.

20 metri di cui 10 m vegetati per applicazioni precoci multiple su pomacee.

15 metri o 10 metri di fascia vegetata per applicazioni tardive su drupacee.

15 metri o 5 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 75% in applicazioni tardive singole su pomacee.

20 metri di fascia vegetata per applicazioni multiple su Pomodoro, Melanzana e Peperone in serra;

20 metri di fascia vegetata su lattuga e cipolla. Non applicare su suoli drenati artificialmente nelle applicazioni autunnali.

25 metri o 5 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 90% per applicazioni precoci su drupacee. -

Non applicare durante la fioritura. Non usare il prodotto durante il periodo in cui le api sono in attività. Non applicare durante la fioritura delle infestanti. Rimuovere le infestanti prima della fioritura.

Per proteggere residenti e astanti, utilizzare ugelli con riduzione della deriva del 50%.

Durante l'applicazione, miscelazione, carico del prodotto e la manipolazione delle colture, indossare guanti e indumenti

protettivi adatti (maglietta a maniche lunghe e pantaloni lunghi).

CIPOLLA: contro botrite (*Botrytis* spp.) e sclerotinia (*Sclerotium* spp.) applicare alla dose di 2,0 l/ha distribuiti con 400- 1000 l di acqua per ha, effettuando 2 applicazioni l'anno, distanziate di 10-12 giorni, dall'inizio dello sviluppo fogliare e fino alla fine dello sviluppo della parte edule. Per le applicazioni manuali e in serra, ridurre il volume massimo di acqua a 800 l/ha.

FRAGOLA (in campo e serra): contro muffa grigia (*Botrytis cinerea*) applicare alla dose di 2,0 l/ha distribuiti con 400-1000 l di acqua per ha, effettuando 2 applicazioni l'anno, distanziate di 10-12 giorni (12 giorni per serra), tra l'inizio della fioritura e fino a 3 giorni prima della raccolta (BBCH 60-89). Per le applicazioni manuali e in serra, ridurre il volume massimo di acqua a 800 l/ha.

POMODORO, MELANZANA, PEPERONE (in serra): contro muffa grigia (*Botrytis cinerea*) applicare alla dose di 2,0 l/ha distribuiti con 400-800 l di acqua per ha, effettuando 2 applicazioni l'anno, distanziate di 10-12 giorni, tra l'inizio della fioritura e fino a 3 giorni prima della raccolta (BBCH 60-89).

LATTUGA (in campo): contro muffa grigia (*Botrytis cinerea*) e marciume del colletto (*Sclerotinia spp.*) applicare alla dose di 2,0 l/ha distribuiti con 500-1000 l di acqua per ha, effettuando 2 applicazioni l'anno, distanziate di 10-12 giorni, tra l'inizio dello sviluppo fogliare e il completo sviluppo della parte edule (BBCH 10-49). Per le applicazioni manuali e in serra, ridurre il volume massimo di acqua a 800 l/ha.

LATTUGA (in serra): contro muffa grigia (*Botrytis cinerea*) applicare alla dose di 2,0 l/ha distribuiti con 500-1000 l di acqua per ha, effettuando 2 applicazioni l'anno, distanziate di 10-12 giorni, tra l'inizio dello sviluppo fogliare e il completo sviluppo della parte edule (BBCH 10-49). Per le applicazioni manuali e in serra, ridurre il volume massimo di acqua a 800 l/ha.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

- Quando vengono utilizzati prodotti contenenti sostanze appartenenti al gruppo delle Anilinopirimidine nella stessa stagione, il numero cumulativo di applicazioni con prodotti contenenti ciprodinil, pirimetanil o mepanipyrim non deve superare il numero massimo di trattamenti sopraindicato.
- Per una corretta gestione della resistenza, si raccomanda di impiegare il prodotto in alternanza con altri fungicidi aventi un diverso meccanismo d'azione.
- Quando vengono effettuati fino a tre trattamenti antibotritici per stagione, il numero di applicazioni dei prodotti a base di Anilinopirimidine deve essere limitato a uno.
- In situazioni in cui vengono effettuati da quattro a sei trattamenti antibotritici per stagione, si consigliano un massimo di due applicazioni con prodotti contenenti Anilinopirimidine.
- In situazioni specifiche in cui sono richiesti sette o più trattamenti antibotritici per stagione, si consigliano un massimo di tre applicazioni con prodotti contenenti Anilinopirimidine e non più di due applicazioni consecutive.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DI IRRORAZIONE

Riempire la metà del serbatoio dell'irroratrice con acqua e aggiungere la quantità desiderata di PRETIL. Mettere in funzione l'agitatore e completare il riempimento mantenendo la soluzione in agitazione fino alla fine dell'applicazione. Preparare solo la quantità di miscela necessaria all'applicazione.

COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta di fragola, pomodoro, melanzana e peperone; 7 giorni prima della raccolta di lattuga, pesche, nettarine, albicocche; 14 giorni prima della raccolta di cipolla; 21 giorni prima della raccolta su vite; 56 giorni per la raccolta di melo e pero.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO