



RSCO-INAC-0146-X0499-003-90.0

1. Propiedades físico - químicas

Ingrediente activo: Metomilo 90%, 900 g de i.a/Kg.

Números identificadores: (CAS) 16752-77-5, (CE) 240-815-0, (Índice) 006-045-00-2.

Formulación: Polvo Soluble.

Grupo químico: Carbamato (IRAC 1A).

Fórmula química: C₅H₁₀N₂O₂S

Categoría toxicológica: 2, Peligro, Franja roja.

2. Mecanismo y modo de acción

Mecanismo de acción. Metomilo es un potente inhibidor de la colinesterasa que bloquea la transmisión de los impulsos nerviosos en los insectos causando su colapso.

Modo de acción. El Metomilo es un insecticida sistémico con acción por contacto y estomacal. Se le usa para el control de un amplio rango de insectos plagas de los cultivos.

Riesgo de resistencia. Clasificado como IRAC 1A, pertenece al grupo insecticida 1, subgrupo A. El uso repetido y exclusivo de este ingrediente activo o algún otro insecticida del grupo 1A puede llevar al desarrollo de poblaciones resistentes de insectos en algunos cultivos. Se ha reportado resistencia al Metomilo en varias especies de algunos géneros de lepidóptera como *Spodoptera* sp., *Heliothis* sp. y *Helicoverpa* sp., en diferentes cultivos en el mundo.

3. Generalidades

Es un insecticida sistémico con alto poder de derribo, que actúa por contacto e ingestión por su efecto de choque, controla larvas de lepidópteros de diferentes estadios, causando en el insecto un ataque nervioso que puede llevar a la insuficiencia respiratoria y a la muerte de este, su aplicación en diversos cultivos hace de este producto que sea apto para un amplio espectro de control insecticida.

4. Recomendaciones de uso

Cultivo	Plaga	Dosis g/ha
Alfalfa (7)	Chicharrita (<i>Aceratagallia curvata</i>), Chinche apestosa café (<i>Euschistus servus</i>), Chinche rápida (<i>Creontiades sp.</i>), Chinche ligus (<i>Lygus sp.</i>), Chinche verde (<i>Nezara viridula</i>), Periquito (<i>Spissistilus festinus</i>), Pulga saltona negra (<i>Spanagonichus albofasciatus</i>), Pulgón del algodón (<i>Aphis gossypii</i>), Pulgón manchado (<i>Theroaphis maculata</i>), Pulgón mizus (<i>Myzus persicae</i>), Pulgón del chícharo (<i>Acyrthosiphon pisum</i>), Gusano verde de la alfalfa (<i>Colias eurytheme</i>), Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>).	300 - 350
	Chapulín (<i>Brachystola sp.</i>), Chinche rápida (<i>Creontiades rubrinervis</i>), Chicharrita (<i>Empoasca sp.</i>), Chapulín (<i>Melanoplus sp.</i>), Chapulín (<i>Sphenarium sp.</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>).	250 - 350
Algodonero (10)	Chinche ligus (<i>Lygus lineolaris</i> , <i>Lygus sp.</i>), Chinche de encaje del aguacatero (<i>Pseudacysta perseae</i>), Chinche rápida (<i>Creontiades debilis</i> , <i>Creontiades sp.</i>), Gusano bellotero (<i>Helicoverpa zea</i>), Gusano del fruto (<i>Heliothis sp.</i>), Gusano falso medidor de la col (<i>Trichoplusia ni</i>), Gusano peludo (<i>Estigmene sp.</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera sp.</i>), Mosquita blanca de los invernaderos (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), Medidor de la hoja del algodonero (<i>Alabama argillacea</i>).	300 - 400
	Gusano de la yema del tabaco (<i>Heliothis virescens</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>), Pulga saltona negra (<i>Spanagonichus albofasciatus</i>), Pulga saltona del algodonero (<i>Pseudatomoscelis seriatus</i>), Pulga saltona negra (<i>Chlamydatus associatus</i>), Chinche rápida (<i>Creontiades rubrinervis</i>), Perforador de la hoja del algodonero (<i>Bucculatrix thurberiella</i>), Pulgón del algodón y del melón (<i>Aphis gossypii</i>), Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>), Trips de la cebolla (<i>Thrips tabaci</i>), Trips (<i>Frankliniella sp.</i>), Trips negro (<i>Caliothrips phaseoli</i>).	250-400
Avena, Cebada, Centeno, Trigo (7)	Pulgón de la espiga (<i>Macrosiphum avenae</i>).	400
Betabel (3)	Gusano falso medidor de la col (<i>Trichoplusia ni</i>), Pulgón de la col (<i>Brevicoryne brassicae</i>).	300-400
Brócoli (3)	Falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>), Mariposa blanca de la col (<i>Artogeia rapae</i> , <i>Artogeia sp.</i>), Pulgón de la col (<i>Brevicoryne brassicae</i>), Gusano del corazón de la col (<i>Copitasia consueta</i> , Chinche arlequín de la col (<i>Murgantia histrionica</i>), Palomilla dorso de diamante (<i>Plutella xylostella</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>).	300-400
	Mayatito del frijol (<i>Colaspis hypochlora</i>).	350-400
Cacahuate (21)	Diabrótica o Doradilla (<i>Diabrotica sp.</i>), Gusano peludo (<i>Estigmene acrea</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i> , <i>Spodoptera sp.</i>), Gusano falso medidor de la col (<i>Trichoplusia ni</i>), Gusano terciopelo (<i>Anticarsia gemmatalis</i>), Gusano bellotero (<i>Helicoverpa zea</i>), Falso medidor de la soya (<i>Pseudoplusia includens</i>), Trips (<i>Frankliniella sp.</i>), Chinche verde (<i>Nezara viridula</i>), Chinche ligus (<i>Lygus sp.</i>), Chinche apestosa café (<i>Euschistus servus</i>), Pulga saltona negra (<i>Epitrix sp.</i>).	300-400
Calabaza (3)	Barrenador del pepino (<i>Diaphania nitidalis</i>), Gusano bellotero (<i>Helicoverpa zea</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>), Pulgón mizus (<i>Myzus persicae</i>), Mosquita blanca de los invernaderos (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), Minador de la hoja (<i>Liriomyza sp.</i>).	250- 500
	Barrenador del melón (<i>Diaphania hyalinata</i>), Barrenador del fruto (<i>Diaphania sp.</i>), Gusano falso medidor de la col (<i>Trichoplusia ni</i>), Gusano peludo (<i>Estigmene acrea</i>), Diabrótica o Doradilla (<i>Diabrotica sp.</i>), Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Bemisia argentifolii</i>), Pulgón del algodón y del melón (<i>Aphis gossypii</i>).	300-400
Cebolla (7)	Trips del cogollo (<i>Frankliniella occidentalis</i>), Chinche ligus (<i>Lygus sp.</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera sp.</i>), Gusano falso medidor de la col (<i>Trichoplusia ni</i>).	300
	Gusano bellotero (<i>Helicoverpa zea</i>).	300-400
Cítricos (1)	Gusano perro del naranjo (<i>Papilio cresphontes</i>), Trips (<i>Frankliniella insularis</i>), Trips de los cítricos (<i>Scirtothrips citri</i>).	27-36 g/100 L de agua

INSECTICIDAS

Cultivo	Plaga	Dosis g/ha
Chícharo (10)	Chicharrita (<i>Emoasca</i> sp.), Diabrotica o Doradilla (<i>Diabrotica</i> sp.), Catarinita o mayate franjeado del pino (<i>Diabrotica balteata</i>), Minador de la hoja (<i>Liriomyza</i> sp.), Chicharrita del frijol (<i>Emoasca fabae</i>), Conchuela del frijol (<i>Epilachna varivestis</i>), Gusano falso medidor de la col (<i>Trichoplusia ni</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>), Picudo del ejote (<i>Apion godmani</i>).	300-350
	Gusano bellotero (<i>Helicoverpa zea</i>), Pulgón del chícharo (<i>Acyrthosiphon pisum</i>).	250-500
Chile (3)	Chicharrita (<i>Emoasca</i> sp.), Mosquita blanca de los invernaderos (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), Trips negro (<i>Caliothrips phaseoli</i>).	250-500
	Barrenillo del chile (<i>Anthonomus eugenii</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i> , <i>Spodoptera</i> sp.), Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Bemisia</i> sp.), Trips (<i>Frankliniella</i> sp.), Gusano bellotero (<i>Helicoverpa zea</i>).	300-400
	Gusano falso medidor de la col (<i>Trichoplusia ni</i>).	300-500
	Chicharrita del betabel (<i>Eutettix tenellus</i>).	400
Col (1) Coliflor (3)	Gusano del corazón de la col (<i>Copitarsia consueta</i>), Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>), Mariposita blanca de la col (<i>Artogeia rapae</i> , <i>Artogeia</i> sp.), Pulgón de la col (<i>Brevicoryne brassicae</i>), Chinche arlequín de la col (<i>Murgantia histrionica</i>), Palomilla dorso de diamante (<i>Plutella xylostella</i>).	300-400
Espárrago (1)	Chicharrita (<i>Emoasca</i> sp.), Chicharrita del frijol (<i>Emoasca fabae</i>), Gusano bellotero (<i>Helicoverpa zea</i>).	300-350
	Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>), Diabrotica o Doradilla (<i>Diabrotica</i> sp.), Gusano falso medidor de la col (<i>Trichoplusia ni</i>).	350-400
Fresa (15)	Gusano bellotero (<i>Helicoverpa zea</i>), Mosquita blanca de los invernaderos (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>), Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>).	350-400
	Gusano del fruto (<i>Heliothis</i> sp.).	400
Frijol (14)	Catarinita o mayate franjeado del pino (<i>Diabrotica balteata</i>), Pulgón lanigero del manzano (<i>Eriosoma lanigerum</i>), Trips negro (<i>Caliothrips phaseoli</i>), Chicharrita del frijol (<i>Emoasca fabae</i>), Picudo del ejote (<i>Apion godmani</i>), Pulgón (<i>Aphis</i> sp.).	250-500
	Diabrotica o Doradilla (<i>Diabrotica</i> sp.), Conchuela del frijol (<i>Epilachna varivestis</i>), Gusano bellotero (<i>Helicoverpa zea</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i> , <i>Spodoptera</i> sp.), Trips (<i>Frankliniella</i> sp.), Gusano peludo (<i>Estigmene acrea</i>).	300-400
	Chicharrita (<i>Emoasca fabae</i>), Gusano falso medidor de la col (<i>Trichoplusia ni</i>).	400
	Diabrotica o Doradilla (<i>Diabrotica</i> sp.), Gusano peludo (<i>Estigmene acrea</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i> , <i>Spodoptera</i> sp.), Trips (<i>Frankliniella</i> sp.), Conchuela del frijol (<i>Epilachna varivestis</i>).	300-400
Frijol ejotero (1)	Gusano falso medidor de la col (<i>Trichoplusia ni</i>), Chicharrita del frijol (<i>Emoasca fabae</i> , <i>Emoasca</i> sp.), Picudo del ejote (<i>Apion godmani</i>), Catarinita o mayate franjeado del pino (<i>Diabrotica balteata</i>), Gusano bellotero (<i>Helicoverpa zea</i>), Falso gusano de alambre (<i>Alphitobius</i> sp.).	300-350
	Gusano bellotero (<i>Helicoverpa zea</i>), Gusano alfiler (<i>Keiferia lycopersicella</i>), Gusano del cuerno (<i>Manduca quinquemaculata</i>), Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>), Mosquita blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), Chicharrita del betabel (<i>Eutettix tenellus</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>), Gusano terciopelo (<i>Anticarsia gemmatalis</i>), Diabrotica o Doradilla (<i>Diabrotica</i> sp.).	300-400
Jitomate (1)	Chicharrita (<i>Emoasca</i> sp.), Pulga saltona negra (<i>Epitrix</i> sp.), Trips (<i>Frankliniella</i> sp.), Gusano peludo (<i>Estigmene acrea</i>), Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>).	250-500
	Diabrotica o Doradilla (<i>Diabrotica</i> sp.), Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>), Pulgón de la col (<i>Brevicoryne brassicae</i>), Mariposita blanca de la col (<i>Artogeia rapae</i>).	350-400
	Gusano del corazón de la col (<i>Copitarsia consueta</i>).	300-400
Lechuga (7)	Diabrotica o Doradilla (<i>Diabrotica</i> sp.), Barrenador (<i>Diatraea</i> sp.), Barrenador del tallo (<i>Chilo</i> sp.).	300-350
	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>), Gusano soldado (<i>Mythimna unipuncta</i>), Gusano bellotero (<i>Helicoverpa zea</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i> , <i>Spodoptera</i> sp.), Gusano defoliador (<i>Spodoptera sunia</i>), Chapulín (<i>Melanoplus</i> sp.), Frailecillo (<i>Macrodactylus</i> sp.).	300-400
Maíz (3)		

INSECTICIDAS

Cultivo	Plaga	Dosis g/ha
Melón (3)	Mosquita blanca de los invernaderos (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Trialeurodes sp.</i>), Pulgón mizus (<i>Myzus persicae</i>).	250-500
	Gusano bellotero (<i>Helicoverpa zea</i>), Gusano falso medidor de la col (<i>Trichoplusia ni</i>), Barrenador del fruto (<i>Diaphania sp.</i>), Gusano peludo (<i>Estigmene acrea</i>).	300-400
	Barrenador del pepino (<i>Diaphania nitidalis</i>), Minador de la hoja (<i>Liriomyza sp.</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>), Diabrotica o Doradilla (<i>Diabrotica undecimpunctata</i> , <i>Diabrotica sp.</i>), Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>), Pulgón del algodón y del melón (<i>Aphis gossypii</i>), Barrenador del melón (<i>Diaphania hyalinata</i>).	250-500
Papa (14)	Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>), Pulgón mizus (<i>Myzus persicae</i>), Falso medidor de la soya (<i>Pseudoplusia includens</i>).	250-500
	Pulga saltona negra (<i>Epitrix sp.</i>), Palomilla de la papa (<i>Phthorimaea operculella</i>), Catarinita de la papa (<i>Leptinotarsa undecimlineata</i>), Pulga saltona de la papa (<i>Epitrix cucumeris</i>), Chapulín (<i>Sphenarium sp.</i>), Chicharrita de la papa (<i>Empoasca solana</i>).	300-400
	Gusano falso medidor de la col (<i>Trichoplusia ni</i>), Chicharrita de la papa (<i>Empoasca sp.</i>).	300-500
Pepino (3)	Palomilla de la papa (<i>Phthorimaea operculella</i>), Chapulín (<i>Sphenarium sp.</i>)	300-400
Pepino (3) Sandía (3)	Barrenador del melón (<i>Diaphania hyalinata</i>), Barrenador del pepino (<i>Diaphania nitidalis</i>), Barrenador del fruto (<i>Diaphania sp.</i>), Diabrotica o Doradilla (<i>Diabrotica sp.</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i> , <i>Spodoptera sp.</i>), Mosquita blanca de los invernaderos (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Trialeurodes sp.</i>), Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>), Pulgón del algodón y del melón (<i>Aphis gossypii</i>), Gusano bellotero (<i>Helicoverpa zea</i>), Gusano falso medidor de la col (<i>Trichoplusia ni</i>), Gusano peludo (<i>Estigmene acrea</i>), Minador de la hoja (<i>Liriomyza sp.</i>),	300-400
Sandía (3)	Pulgón mizus (<i>Myzus persicae</i>).	250-500
Sorgo (14)	Chapulín (<i>Melanoplus sp.</i>), Gusano bellotero (<i>Helicoverpa zea</i>), Frailecillo (<i>Macrodactylus fulvescens</i>), Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i> , <i>Spodoptera sp.</i>), Gusano soldado (<i>Mythimna unipuncta</i>), Gusano telarañero (<i>Nola sorghiella</i>), Mosca midge (<i>Contarinia sorghicola</i>).	300-400
	Pulgón verde del follaje (<i>Schizaphis graminum</i>).	350-400
Soya (14)	Diabrotica o Doradilla (<i>Diabrotica sp.</i>), Catarinita mexicana de la hoja del frijol (<i>Cerotoma ruficornis</i>), Gusano telarañero de los jardines (<i>Loxostege similalis</i>), Pulgón (<i>Macrosiphum sp.</i>), Chicharrita (<i>Empoasca sp.</i>).	250-500
	Gusano bellotero (<i>Helicoverpa zea</i>), Gusano peludo (<i>Estigmene acrea</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>), Gusano terciopelo (<i>Anticarsia gemmatalis</i>), Gusano saltarin (<i>Elasmopalpus lignosellus</i>), Gusano falso medidor de la col (<i>Trichoplusia ni</i>), Falso medidor de la soya (<i>Pseudoplusia includens</i>), Chinche ligus (<i>Lygus sp.</i> <i>Lygus lineolaris</i>), Chinche apestosa café (<i>Euschistus servus</i>), Chinche verde (<i>Nezara viridula</i>), Trips negro (<i>Caliothrips phaseoli</i>), Trips (<i>Frankliniella sp.</i>), Conchuela del frijol (<i>Epilachna varivestis</i>).	300-400
Tabaco (Exento)	Mosquita blanca de los invernaderos (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>), Picudo del tallo del tabaco (<i>Trichobaris mucorea</i>), Picudo del tallo de la papa (<i>Trichobaris trinotata</i>), Picudo (<i>Trichobaris championi</i>).	250-500
	Diabrotica o Doradilla (<i>Diabrotica sp.</i>), Gusano de cuerno del jitomate (<i>Manduca quinquemaculata</i>).	300-350
	Gusano de cuerno del tabaco (<i>Manduca sexta</i>), Gusano de bolsa (<i>Malacosoma sp.</i>).	300-400
	Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>), Gusano falso medidor de la col (<i>Trichoplusia ni</i>), Gusano peludo (<i>Estigmene acrea</i>), Gusano de la yema del tabaco (<i>Heliothis virescens</i>).	300-450
	Descarnador o presidiario de la vid (<i>Harrisina americana</i> , <i>Harrisina sp.</i>), Trips (<i>Frankliniella sp.</i>).	27-36 g/100 L de agua

(): Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. Período de reentrada al área tratada: 24 horas después de la aplicación del producto.

Época y frecuencia de aplicación.

Se sugiere hacer una a dos aplicaciones al follaje con intervalo de 7 días entre cada una, importante iniciar la primera aplicación cuando se observen los primeros individuos de la plaga.

Selectividad y Compatibilidad. No debe mezclarse con otros productos agroquímicos.

5. Medidas de cuidado al medio ambiente

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
- EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO DQUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMAS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.
- REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.
- CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: "ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES)". "ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS)", "ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO".

El envase vacío deséchelo depositándolo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin o llévelo a un centro de acopio.

6. Almacenamiento y manejo adecuado del producto

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN.
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.

- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.
- NO MEZCLE O PREPARÉ EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
- NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA

7. Información toxicológica

Frases específicas toxicológicas: Mortal en caso de ingestión., Mortal si se inhala.
Pictogramas de precaución:

Categoría Toxicológica: 2, Peligro, Franja roja

Pictogramas de precaución:



PELIGRO



Teléfonos de Emergencia:

SINTOX: 01(55) 5611 2634; 01 (55) 5598 9095 lada sin costo, 01-800-009-2800, las 24 horas/365 días al año.

ALBAUGH MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. (614) 442-5250
CHEMTRAC día o noche 800-681-9531.

Elaborado por: Departamento técnico Albaugh
Fecha actualización: Noviembre 14, 2025.